Machine Translated by Google

MMS Health Recovery Guidebook

FIRST EDITION

Jim Humble *with Cari Lloyd*

Machine Translated by Google

Bölüm

MMS Sağlık
Kurtarma Kılavuzu

Jim Humble ,
Cari Lloyd ile

Machine Translated by Google

MMS Health Recovery Guidebook, Cari Lloyd ile Jim Humble'ın
İlk Baskısı

Telif hakkı © 2016 James V. Humble ve Cari Lloyd'a aittir.

Tüm hakları Saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü, yazarlarının yazılı izni olmaksızın, fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama alma sistemi dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz veya iletilemez. Bunun tek istisnası, bir dergiye, gazeteye, web sitesine, bloga veya yayına dahil edilmek üzere yazılmış bir incelemeyle bağlantılı olarak kısa pasajlardan alıntı yapmak isteyen bir hakemdir. Tek sayfalar, Yazarlara verilen kredi ile kopyalanabilir veya gerektiğinde, birinin sağlığına kavuşmasına yardımcı olmak için birkaç sayfa kopyalanabilir. Yukarıda sayılan yazarlardan birinin ölümü (veya 2 aydan fazla bir süre içinde ortadan kaybolması) durumunda, telif hakkı tamamen geri kalan yazara aittir. Yukarıda bahsedilen her iki yazarın da ölümü veya kaybolması durumunda, bu kitap kamu malı olur ve herkes onu kopyalayabilir, satabilir veya başkasına verebilir. Her iki yazarın da ölümü halinde, MMS'den yararlanan herkesin mümkün olduğu kadar çok kopyasını satın alması, yazdırması, kopyalaması veya bir şekilde arkadaşları ve ailesiyle paylaşması teşvik edilir.

Yayınlayan James
V. Humble
sales@jhbooks.org

ISBN: 978-0-9908945-2-0

İlk Yayın Öncesi Sürümü: Haziran 2015'te yayınlandı
İkinci Yayın Öncesi Sürümü: Ekim 2015'te Yayınlandı
İlk baskı: Ekim 2016'da yayınlandı

İletişim E-postası: healthrecovery@jimhumble.is

Kapak Tasarımı: Rev. Paul Beaudry ve Cindy Stoe

Bu kitap boyunca, siz okuyucular için kolaylık sağlamak amacıyla sunduğumuz harici web sitelerine bağlantılar bulacaksınız.
Bu bağlantıların doğru, güncel ve alakalı olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermiş olsak da, harici sağlayıcılar tarafından sağlanan sayfaların sorumluluğunu alamayız.

Machine Translated by Google

sorumluluk reddi

Bu kitap, dünya çapında birçok insanın taban çabalarının deneyimlerinden işe yaradığı tespit edilen alternatif sağlık restorasyon protokolleriyle doludur. Her birey, bu bilgileri kullanıp kullanmayacağına veya nasıl kullanacağına veya resmi olarak tanınan tıbbi yardım isteyip istemediğine ilişkin kararından kişisel olarak sorumludur.

Bu kitapta yer alan bilgiler kesinlikle eğitim amaçlıdır.
Bu kitaptaki hiçbir şey tıbbi tavsiye veya tedavi oluşturmayı amaçlamamaktadır. Burada açıklanan protokoller, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmamıştır. Bu protokoller, Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesi'nin resmi sakramentleridir. Bu kitaptaki protokolleri uygulamak istiyorsanız, eylemlerinizin tüm sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Buradaki herhangi bir bilginin her türlü kullanımı için %100 sorumluluk kabul ediyorsunuz.

Bu protokollerin insan vücudunu iyileştirdiğini iddia etmiyoruz, buna da inanmıyoruz. MMS1, MMS2, bentonit kili (Aztek kili), Aloe vera, DMSO ve bu kitapta bahsedilen doğal veya başka türlü diğer tüm maddeler hiçbir şekilde vücudu iyileştirmez veya iyileştirmez. MMS1 ve MMS2, zehirleri yok eden ve patojenleri oksidasyon yoluyla öldüren oksitleyicilerdir. MMS2 (hipokloröz asit [HOCl]), insan bağışıklık sisteminin patojenleri ve zehirleri yok etmek için ürettiği aynı oksitleyicidir. Bentonit kil iyileştirici bir madde değildir, aksine zehirleri ve patojenleri emer ve vücuttan dışarı atar. FDA, EPA ve çeşitli endüstriyel şirketler tarafından verilen çok sayıda kanıt, MMS1'in (klor dioksit) gıda, kamu su sistemleri, hastaneler ve hatta mezbahalardaki patojenleri ve zehirleri öldürdüğünü ve/veya oksitlediğini bilimsel olarak kanıtlıyor. Aynı şeyin insan vücudunda da olabileceğine ve gerçekleştiğine inanıyoruz.

Dünya çapında binlerce insandan elde edilen anekdotsal kanıtlar, MMS1'in (klor dioksit) ve MMS2'nin (suda çözüldüğünde hipokloröz aside [HOCl] dönüşür) patojenleri öldürme ve/veya zehirleri oksitleme yeteneğine sahip olduğuna dair çok az şüphe olduğunu göstermektedir. insan vücudu. FDA düzenlemeleri, suyu arıtmak için kamu su sistemlerinde klor dioksit (MMS1) ve kalsiyum hipoklorit (MMS2) kullanılabileceğini ve sebze, et ve diğer öğeleri korumak için klor dioksit kullanıldığını belirtir.
İnsan vücudunun ortalama %60-75'i sudur. Klor dioksitin genel su sistemlerinde olduğu gibi vücuttaki suyu da arıtabilmesi mantıklıdır. Vücudun suyu arıtıldığında ve zehirlerin çoğu oksitlendiğinde, vücut vücudu iyileştirebilir.

Machine Translated by Google

Buradaki iddialardan herhangi birinin doğru olduğuna dair tıbbi kanıt olduğunu iddia etmiyoruz . Ancak, kontrol etmek ve gözlemlemek isteyenler için kanıt var. Anekdotsal kanıtlarımız olduğu gerçeğini ima ediyoruz. Bilimsel olarak eğitilmiş bazı insanlar, kanıtlarımızı önemsiz olduğu için göz ardı etmeye çalışıyor. Birinin biraz şüpheli olabilen üç veya dört anekdot teyidi olduğunda, ancak teyitler binler üzerine binler olduğunda, o zaman bu durum değişir. Bilim bile bize, binlerce anekdot kanıtı vakası olduğunda bazı korelasyonların olabileceğini söylüyor.

MMS almak ya da almamak kişisel bir karardır. Her birey kendi sağlığı için sorumluluk almalıdır. Bu kitabın yazarı ve ortak yazarı, bu sayfalarda açıklanan herhangi bir öneri veya prosedürün kullanılmasından kaynaklanan olumsuz detoksifikasyon etkileri veya sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Lütfen “MMS Almak Güvenli mi?” bölümünü okuyun. 12. sayfada.

Yine, bu kitaptaki protokollerin hiçbiri bir hastalığı tedavi edemez, hatta insan vücudunu iyileştirmek için besin sağlayamaz. Bu yöntemlerin tedavi ettiğini iddia etmiyoruz. Bu kitapta özetlenen protokoller, çoğu hastalık patojenini öldürecek ve insan vücudundaki çeşitli zehirleri oksitleyecektir. O zaman vücut kendini iyileştirebilir.

Machine Translated by Google

This book is dedicated to the
many suffering people
of this world.
Jim Humble

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teşekkür

Bilerek ya da bilmeyerek bu kitaba bir şekilde katkıda bulunan herkese içten şükranlarımı yeterince ifade etmek sayfalar alır. Yeterli takdiri yeterince ifade edecek kelimeleri bulamıyorum, ancak her birinin bir şekilde bir şekilde bir şekilde geri ödeneceğinden eminim. Doğru olanı yaptığınızda, her zaman size geri döner. Bununla birlikte, burada özel teşekkürü hak eden birkaç kişiyi vurgulamak istiyorum.

Sağlığına kavuşması gereken binlerce, binlerce insan bu bilgiyi belgelememem için itici güç oldu. Seminerlere katılan, enerjiniz ve coşkunuza, bilgi ve tecrübenize, ilhamınıza katkıda bulunan herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Aynı teşekkür, dünyanın dört bir yanından sorular, öneriler, fikirler ve yaptıklarınızın işe yaradığına dair tanıklıklar ile yazıp gönderen sayısız insana da gider; hepinize en derin şükran ve takdirlerimi sunarım.

Bu kitabı satış öncesi durumunda okuyup önerilerde bulunanlara çok teşekkürler. Ve ana düzeltmenlere çok özel teşekkürler: DD, Jan Wallace, Daniel Bender, Manuel Catedra ve Charlotte Lackney. Harcadığınız tüm saatler için teşekkür ederiz - her biriniz kendi benzersiz yönteminizle önemli katkılarda bulundunuz.

Başpiskopos Mark Grenon ve oğulları, Piskopos Jon Grenon ve Piskopos Joe Grenon, aşı yaralanmalarının üstesinden gelmek için Aşı Prosedürüne katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca Mark, MMS1/DMSO Yama Protokolünü de geliştirdi. Muazzam çalışmanız için bu hayatta ve öbür dünyada ödüllendirilmeye devam edeceksiniz.

Machine Translated by Google

Andreas Ludwig Kalcker, MMS kullanımı için bir dönüm noktası olan Başlatma Prosedürünü geliştirmemde bana ilham veren çok düşük MMS dozuyla başlama fikrini benimle paylaştığınız için teşekkür ederim.

Clara Beltrones, ilk olarak kızını hayatını almış olabilecek bir apandisit ameliyatından kurtarmak için şimdi Protokol 6 ve 6 olarak bilinen şeyi yarattı. Bu deneyimden sonra, yüzlerce insana yardım etmek için Proto col 6 ve 6'yı kullandı. Şimdi dünyanın her yerinden başkaları da Protokol 6 ve 6'yı kullanarak binlerce kişiye yardım etti. Bu muazzam katkı için teşekkürler Clara.

Kitap kapağını oluşturan Rev. Paul Beaudry ve Cindy Stoe'ya özel teşekkürler. Ve bu kitabı istediğimiz şekilde ortaya koyduğu için Cindy Stoe'ya ekstra özel teşekkürler. Umarım senden fazla talepte bulunmamışızdır Cindy. Bize katlandığınız için teşekkürler.

Daniel Bender ve Rev. Paul Beaudry, bu kitaptaki resimlerin kullanımına katkıda bulundukları için teşekkür ederiz.

Tüm teknik desteğiniz için Matt'e teşekkürler.

Ve son olarak, ama kesinlikle en az değil, söylemek istediklerimin açık ve anlaşılır bir şekilde sunulduğundan emin olmak için sonsuz saatler gibi görünen ortak yazarım Cari'ye büyük bir “zikomo kwambiri”. tüm ince ayarları ve pek çok ayrıntıyı ele alıyor! Cari olmasaydı bu kitap olmazdı. Bundan yıllar sonra binlerce insanın sağlığına kavuşacağından eminim - ve Cari olmasaydı bu olmazdı.

Machine Translated by Google

İçindekiler

Teşekkür.....VII

Önsöz XV

Giriiş..... 1

Bölüm 1 - Başlarken.....5 Terimlerin
Tanımı.... 5
Açıklama... ....8 Bu Kitapta Kullanılan
Ölçüler 10
CDS ve CDH..... 12
MMS Almak Güvenli midir?.....12 Nedir? MMS
Değil ....13 Oksidasyonu
Anlamak 15
Oksidasyon.... ....15 MMS ve
Oksidasyon..... ...15
Diğer Oksitleme İşlemleri.....16 Bilgelere Bir
Söz..... 17

Bölüm 2 - Güvenlik Önlemleri.....19 MMS/
MMS1..... .....19 Kalsiyum Hipoklorit
(MMS2).....22 Sitrik Asit/Hidroklorik Asit (HCl)..... 24
DMSO..... 25

Bölüm 3 - MMS Temel Temelleri .....29 MMS'i
Etkinleştirme ....30 Sitrik Asit ve
Hidroklorik Asit (HCl)..... .....30 Bazı Alternatif
Asitler..... .....30 MMS1'in Temel Dozunu
Karıştırma .....32 Saatlik
Dozlar. ....34 Ardışık Dozların
Önemi.....35 Günlük Doz Şişesi..... 36
MMS'inizin İyi Olduğunu Test Etme..... .....39 Su—Bir MMS1 Dozunu
Karıştırmak için İdeal Sıvı....41 Tat Faktörü/MMS1'in Tadı Nasıl İyileştirilir 42
Bir Kapsülde MMS1 (Tadı Ortadan Kaldırmak İçin) .....45 Bir
Damla Daha Damla Alamamak 47

Machine Translated by Google

MMS'i kaydetme..... .....49 Hasta
Hissetmek ....50 Hamile
Kadınlar ve MMS..... .....50 MMS Protokollerinde Yemek
Yeme .....51 Besin Takviyeleri ve HRP.....53 MMS
Protokolü Kullanıldığında Kaçınılması Gereken Yiyecek ve İçecekler...56

Bölüm 4 - DMSO (Dimetil Sülfoksit).....57 DMSO—Nereden ve Ne Satın
Alınır..... .....58 DMSO—Alerji
Testi ....59 DMSO—Güvenlik
Önlemleri..... ...60 Bölüm 5 - Sağlığı İyileştirme Planı
(HRP).....63 Arka Plan..... .....63 Nasıl
Çalışır 63

Temel Protokollere/Sağlık İyileştirme Planına Genel Bakış.....64 Temel
İlkeler..... .....66 Sağlık İyileştirme Planı için
Protokollerin Sıralanması.....67 Kural İstisnası..... 70
Desteklenen Protokoller—Ne Zaman Eklenmeli?.....71 Ek
Protokoller.....72

İHP için İki Temel Sağlık Prosedürü.....73

1. Dişlerinizi Fırçalama.....73 2. Cildinize
Püskürtme 76

Bölüm 6 - Anahtar Protokoller.....79 Prosedürü
Başlatma..... .....79 MMS'in Üç Altın
Kuralı 83
Protokol 1000..... 84
Protokol 1000 Plus ..... 87 Protokol
2000..... .....89 Protokol
3000..... .....95 Küf/Mantar
Protokolü..... .....99 Önemli Bir
İnceleme 108

Bölüm 7 - HRP ve Çeşitli Hastalıklar.....109 HRP'nin Çeşitli Hastalıklar
için Destekleyici Protokollerle Bağlantılı Olarak Kullanılması.... 109
Genellikle Tedavisi Olmayan Hastalıklar 117

Machine Translated by Google

Bölüm 8 - Gerçeklik Kontrolü.....121 Tamamlayamamanızın
Nedenleri MMS ile Başarı.....121

Bölüm 9 - Destekleyici Protokoller.....131 Öksürük
Protokolü..... .....131 MMS1/DMSO Yama
Protokolü ....135 Gözler, Kulaklar ve Burun
Protokolleri..... .....136 Banyo ve Ayak Banyosu
Protokolü.....142 Lavman
Protokol..... .148
Koloniler ....152 Douche
Protokolü 153
MMS Çanta Protokolü..... 156 Akciğer
Protokolü (Kupa).....159

Bölüm 10 - Hint Bitkisi – Nihai Sağlık İyileştirme
Çabası ....165 Kara
Merhem 167

Bölüm 11 - Ek Protokoller.....169 Protokol 6 ve
6..... 169
Protokol 4000 171
Aşı Prosedürü.....173 Sıtma
Protokol..... .180 Ek Eylemler/Temel Sıtma
Dozu.....182 Kitlelerin Sıtmadan Kurtulmasına Yardımcı
Olmak.....185 Mikroskop... .....
.185 Sıtmanın Normal Suşlarından Daha Zayıf.....187

Normal Sıtma Suşlarından Daha Güçlü.....188 Çocuklar
(ve Sıtma)..... .....189 Chikungunya ve Dang
humması .....190 Ebola
Virüsü ....195 Zika
Virüsü..... 195
Sivrisinek ısırıkları..... ...196 MRSA
Protokolü..... .....196 Günlük MMS1 Bakım
Dozu.....200 Bölüm 12 - Acil Durum

Protokolleri .. ..203 Sokmalar ve
Isırmalar..... 204

Machine Translated by Google

Akrep Sokmaları ....204 Arı ve Yaban Arısı
Sokmaları .....206 Örümcek
Isırıkları..... .....210 Brown Recluse
Protokolü 213
Kara Dul Protokolü.....217
Yılan Isırığı Protokolü.....219 Yiyecek Zehirlenme
Protokolü.....223 Sarsıntı
Protokolü..... .....226 Strok
Protokolü 227
Kalp Krizi Protokolü.....236
Yakma Protokolü..... 245
Bir Hafta Yaşama Protokolü 249

Bölüm 13 - Çocuklar İçin Dozajların Ayarlanması.....255 Ebeveynlere Bir
Söz..... .....255 Çocuklar için Başlatma
Prosedürü .....256 Protokol Çocuklar için
1000.....257
Çocuklar için Protokol 1000 Plus.....258
Çocuklar için Protokol 2000.....258 Çocuklar için
Protokol 3000..... .....260 Çocuklar için Protokol 6 ve
6 ....264 Bebekler, Çocuklar ve Hassas Ciltli Kişiler
için Yama Protokolü..... 265

Çocuklar için Günlük MMS1 İdame Dozu.....266 Çocuklar İçin Destekleyici
ve Ek Protokoller Nasıl Ayarlanır 266

Bölüm 14 - Ek Önemli Bilgiler...273 Biyofilmler..... 273
MMS2—Ayrıntılar 274

Sıvıların MMS1 ile Uyumlu olup olmadığının Test Edilmesi .....278 Ağrı
Giderici..... 282
Parazitler ....283 MMS ile Su
Arıtma.... 287

Bölüm 15 - Hayvanlar .....289 Protokol
Hayvanlar.....289 Oral MMS Dozu bir Hayvan
için 290

Machine Translated by Google

Genel Halsizlik/Hastalık.....291 Hayvana Teşhis
Konduysa.... .....292 Dozların Hesaplanması/Ölçümlerin
Açıklaması...293 Hayvanlar için Protokol Efsanesi..... 294
Dozaj Tablolarının Nasıl Kullanılacağına İlişkin Açıklama.....294 Hayvan
Protokolü Dozaj Tabloları.... .....300 İçme Suyu..... 302
Protokol 3000 303
Gözler..... .....303 Ağız ve
Dişler..... 303

Cilt problemleri..... ..304
Destekleyici ve Ek Protokoller.....304 Hayvanlar İçin Üç Altın
Kural..... 305

Sonuç olarak..... 306

Ek A - CDS/CDH.....307 Ek B - Genesis II
Kilisesi 313

Ek C - Asit-Alkali Diyeti 315

İlgilenilen Linkler 319

Yazar hakkında..... ..325

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

önsöz

Master Mineral Solution'ın keşfinden bu yana, MMS bilinci dünya çapında artmaya devam etti. Bunun çok basit bir nedeni var: Sağlık çok değerli bir varlıktır. Giderek daha fazla insan, başka hiçbir şey işe yaramadığında MMS'in bir sağlık sorununa çözüm olabileceğini keşfetti. Bu nedenle, MMS ile olumlu sonuçlar alan kişilerin hikayelerini arkadaşlarıyla, aileleriyle ve hatta halka açık olarak paylaşmaları şaşırtıcı olmamalıdır.

Yani, kelime dolaşıyor.

Ne yazık ki MMS ile ilgili çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Bu yanlış bilgilerin çoğu, MMS'e ve diğer alternatif yöntemlere kasıtlı olarak saldıran sahte medya hikayelerinden gelir.

Ancak, bazı yanlış bilgiler de iyi niyetli insanlardan geliyor. Bu, birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Bazı gayretli insanlar haberi yaydılar, ancak yeni gelişmelerden haberdar olmadılar; bu nedenle eski bilgileri aktarıyorlar.

Diğer olası yetkililer ve/veya web sitelerinin sahipleri, herhangi bir nedenle, basitçe yanlış anlarlar.
Durum ne olursa olsun, MMS'i çevreleyen yeterince karışıklık ve yanlış bilgi var ve bu beni bu kitabı yazmaya zorlayan önemli bir faktör oldu.

Bu kılavuzu, Ana Mineral Çözümünün (MMS) temellerini açık ve özlü bir şekilde öğrenmenize yardımcı olmak için yazdım. Tecrübelerime göre, çoğu insanın var olan herhangi bir hastalıktan kurtulabileceğini biliyorum. MMS'in nasıl çalıştığına dair her küçük ayrıntıyı bilmenize gerek yok. Sadece MMS'i nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Machine Translated by Google

Örneğin bu kitap size kendi MMS'inizi nasıl yapacağınızı öğretmeyecek. Biraz elektrik gibi. Elektrikten yararlanmak için elektriğin nasıl çalıştığının arkasındaki tüm bilimi bilmek gerekmez. Tüm bilmeniz gereken bir anahtarı nasıl çevireceğinizdir ve işte - ışık yanar. Amacım, MMS'e yeni başlayan herhangi bir kişinin kendi sağlığına kavuşması için sorumluluk almasını, yani iyileşmesini ve iyi kalmasını mümkün olduğunca basit hale getirmektir.

Burada temel bir ilkeyi anlamak çok önemlidir ve bu şudur: basit , işin olmaması ile eş anlamlı değildir. Çok açık olmak istiyorum, sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız, bu sizin açınızdan biraz çaba gerektirecektir. Kendi sağlığınız ve iyiliğiniz için sorumluluk almanızı gerektirecek .

Sağlığınız kötüyse, oraya gitmenizin muhtemelen biraz zamanınızı, belki de yıllarınızı aldığını düşünün.
Bu nedenle, sağlığınıza geri dönmenin biraz zaman alacağını ve elbette biraz çalışacağını bekleyebilirsiniz. Bazen MMS'in sihirli bir mermi gibi olabileceğini söylüyorum ama o mermiyi harekete geçirmek için gerekli adımları atmanız gerekiyor. Çok değerli bir meta olan sağlık yolunu seçerseniz, onu işsiz değil, olabildiğince basit hale getirmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı garanti edebilirim. Bu sayfalarda özetlendiği gibi Sağlık İyileştirme Planını takip edecekseniz , bugün bu kitaptaki talimatları izlemeye başlayabilir ve muhtemelen yarından itibaren olumlu sonuçlar almaya başlayabilirsiniz.

Ek olarak, bu kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi, bu rehber kitabın başlı başına sağlığı iyileştirmeye yönelik olmasına rağmen, aynı zamanda önleme ve dolayısıyla uzun ömür ile ilgili olduğunu belirtmek isterim. İşte düşünmek için bazı yiyecekler: Bugünün dünyasında günlük olarak toksinlerle bombalanıyoruz -

Machine Translated by Google

ondan kaçan yok denecek kadar az. Yıllar içinde birçok insanın sağlık departmanında “iyi” olduğunu düşündüklerini keşfettim. Önemli bir hastalıkları ve farkında oldukları endişe edilecek özel bir sağlık durumları yoktur. Yine de, MMS'i günlük rutinlerine dahil ettiklerinde, genellikle yepyeni bir esenlik dünyasını keşfederler! İstenmeyen ağırlıklardan kurtulmaya başladıklarını ve düşüncelerinin geliştiğini fark ederler - beyin sisi, belirsiz düşünme ve zayıf konsantrasyon kapıdan dışarı çıkar. Daha fazla enerjiye sahipler, ciltleri daha pürüzsüz hale geliyor ve özel bir yeni ışıltı kazanıyor. Kısacası, yıllarca birlikte yaşamayı öğrendikleri çeşitli dırdırcı küçük problemler ortadan kalkar. Sağlık açısından “Tamam” olmalarına rağmen, şimdi çok daha iyisini yapıyorlar! Görüyorsunuz, MMS düşünülenden çok daha fazlasını sunuyor.

İyileşmeniz gereken şu ya da bu türden ciddi bir sağlık sorununuz varsa, bu kitap tam size göre. Aynı şekilde, sağlığınız “iyi” görünüyorsa ancak yine de optimum sağlığa ulaşmak istiyorsanız, bu kitap da sizin için. Hangi kategoriye girerseniz girin - MMS ile devam eden temel bir rutin, sağlıklı olmanıza, sağlıklı kalmanıza ve altın yıllarınızda iyi bir yaşam kalitesini korumanıza yardımcı olabilir.

Halihazırda MMS'den biraz anlayanlarınız için, diğer kitaplarımda yayınlanmış veya web sitelerimde yayınlanmış olanların bazı varyasyonları olduğunu fark edebilirsiniz. Bu cilt, en son güncel bilgilerin yanı sıra oldukça yeni bilgiler içerir. MMS'in dünya çapında sürekli kullanımıyla benim ve başkalarının belirlediği son gelişmeleri içerir. MMS dünyası çok geniştir ve her zaman yeni şeyler öğreniyoruz, bu nedenle güncellemeleri düzenli olarak şu adresten kontrol ettiğinizden emin olun:

http://www.mmswiki.is

Machine Translated by Google

Online sipariş vermek yerine kendi MMS'inizi yapmak istiyorsanız , ayrıntılı talimatları ve diğer birçok formülü içeren The Master Mineral Solution of the 3rd Millenium kitabımı satın alın. Bununla birlikte, sağlığınızı iyileştirme talimatlarınız için bu kitabı kullanın.

Sağlığına,

Jim Mütevazı

Machine Translated by Google

giriiş

Bu kitap, zamanımızın en şaşırtıcı sağlık veren mineral çözümlerinden biri olan Master Mineral Solution veya kısaca MMS'in kullanımı için bir kılavuzdur. Bir mineralden alınan basit bir madde, birkaç gıda sınıfı asitten herhangi biri ile karıştırıldığında üretilir. İkisi uygun şekilde birleştirildiğinde, vücuttaki toksinleri ve hastalık patojenlerini ortadan kaldırmada oldukça etkili olan MMS1 üretir.

1996'da Güney Amerika'da bir altın madenciliği gezisindeyken, MMS'in sıtma kurbanlarının sağlığına hızla geri döndüğünü keşfettim. O zamandan beri, kanser, diyabet, hepatit A, B, C, Lyme hastalığı, MRSA, multipl skleroz, Parkinson, Alzheimer dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklardan muzdarip yüz binlerce insanı kısmen veya tamamen iyileştirdiği kanıtlanmıştır. , HIV/AIDS, sıtma, otizm, her türlü enfeksiyon, artrit, asit reflü, böbrek veya karaciğer hastalığı, ağrılar, alerjiler, idrar yolu enfeksiyonları, sindirim sorunları, yüksek tansiyon, obezite, parazitler, tümörler ve kistler, depres sinüs sorunları, göz hastalıkları, kulak enfeksiyonları, dang humması, cilt sorunları, diş sorunları, prostat sorunları (yüksek PSA), erektil disfonksiyon ve diğerleri.

Bu kitaptaki MMS protokolleri ayrıca alkol ve eroin ve diğerleri gibi uyuşturucu bağımlılıklarının üstesinden gelmek için yan etkileri olmaksızın kullanılmıştır ve liste böyle devam etmektedir. Bu şimdiye kadar kapsamlı bir liste değil. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geldiğini biliyorum, ancak dünyanın dört bir yanından gördüğümüz sonuçlara göre, doğru kullanıldığında MMS'in insanoğlunun bildiği çoğu hastalığın üstesinden gelme potansiyeline sahip olduğunu söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum.

Machine Translated by Google

Bu kitapta verilen sağlık kurtarma prosedürleri, insanlara sağlıklarını iyileştirmek için MMS'i nasıl kullanacaklarını 20 yıl boyunca öğretmenin sonucudur. Dünya çapında çok sayıda insan, ilk kitaplarımda ana hatlarıyla verilen veya seminerlerde öğretilen ilkeleri kullandı ve uyguladı. Sonuç olarak, yıllar içinde, çoğu bu kitaba katkıda bulunan çok sayıda geri bildirim aldım. Başarılar, başlangıçta bile, şimdiye kadar duyduğum her şeyin çok ötesindeydi.

Bununla birlikte, yol boyunca başardıklarımız, o kadar harika bir şeye ulaşmamıza yardımcı oldu ki, ilk başta buna çok az kişi inanabilir, ancak deneyenler çok geçmeden kendileri keşfederler.

Anahtar, MMS'i doğru kullanmaktır. Bu zamandan önce , MMS protokollerinin birçok spesifik hastalıktan herhangi biri için nasıl kullanılacağına ilişkin tavsiyelerle birlikte çeşitli hastalık listelerinin dolaştığına dikkat çekmek istiyorum. Bu çeşitli listelerdeki bilgiler yetersiz, güncelliğini yitirmiş ve bazen yanlıştır.

Yılların verdiği tecrübeyle, MMS ile, bazen söylediğim gibi, aslında sadece bir MMS protokolü olduğu sonucuna vardım. Bu protokol, bu kitapta verilen Sağlık Kurtarma Planıdır (HRP) . Bu, MMS kullanımı için bir dönüm noktası keşfi ve yeni bir kavramdır. Bu kitapta özetlenen 50 tek protokolün doğru bir şekilde bir araya getirilmesi ve uygun sırada kullanılması durumunda en iyi sonuçların elde edileceğini anladım. Bu, bu kitaptaki tüm protokollerin kullanılması gerektiği anlamına gelmez . Sağlığı İyileştirme Planı (bkz. Bölüm 5) , sağlığı iyileştirmek için izlenecek adımları ve uygun sırayı açıklar ve bu hemen hemen tüm hastalık ve rahatsızlıklar için geçerlidir. MMS siyah veya beyaz değildir. Ancak İHP'de ana hatlarıyla belirttiğim ilkeleri öğrenir ve uygularsanız, sağlığınıza kavuşmak için iyi bir şansınız olduğuna eminim. Sorununuz ne olursa olsun, Sağlık Kurtarma Planına geçin. Bu yönergeleri takip ederseniz ve vücudunuzun size verdiği sinyallere çok dikkat ederseniz, sağlığınızın iyileşmesi mümkündür.

Machine Translated by Google

Bu kitapta önemli olan bir şey, MMS'in Üç Altın Kuralı listesidir (bkz. sayfa 66, 83, 84, 130). Bu kurallar Sağlık Kurtarma Planı için kesinlikle gereklidir ve şunu da ekleyebilirim, bu aynı kurallar denenebilecek diğer herhangi bir sağlık kurtarma programına da uygulanabilir. Sağlığı İyileştirme Planı, MMS'in Üç Altın Kuralı ile birlikte, MMS dünyasında herkesin dikkat etmesi gereken yeni kavramlardır.

Çok önemli bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Pek çok insan doğal olarak "MMS bunu ya da bunu tedavi eder" der. Ben de aynı ifadeyi zaman zaman, bazı durumlarda, yerinde söylendiğinde veya kelimeler ağzıma konduğunda veya başkalarının kullandığı terminoloji akışına göre hareket ederek yaptım. Konuşmamızda ve küresel toplumumuzda, sözcükleri ve anlamlarını sık sık bulandırıyoruz. Ancak kayıtlara geçmek için burada açıklığa kavuşturmak istiyorum, MMS hastalığı tedavi etmez. MMS patojenleri öldürür ve zehirleri yok eder (okside eder). Vücuttaki patojenler ve zehirler azaltıldığında veya ortadan kaldırıldığında, vücut düzgün çalışabilir ve böylece iyileşebilir. Sık sık "Vücut vücudu iyileştirir" derim. MMS, vücudun tam da bunu yapabilmesi için işleri sıraya koymaya yardımcı olur.

Bu kitabın öğrettiklerini uygulamaya karar verirseniz, sağlığınızın düzeldiğini duymayı umuyorum. İyileştiğin zaman ifadeni duymaktan memnun olurum (ve insanlık da eder). Başkalarının da faydalanabilmesi için lütfen deneyiminizi paylaşın. Git:

http://mmstestimonials.is

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Bölüm 1
Başlarken

MMS Sağlık Kurtarma Kılavuzuna hoş geldiniz . Sağlık durumunuz ne olursa olsun, bu kitabın size gerçekten yardımcı olacağını umuyorum. Bu bilgiyi doğru sıraya ve anlaşılır bir dile yerleştirmek için uzun saatler harcadık. Başlamadan önce, MMS dünyasını anlamak için bilmeniz gereken bazı terimler var. Lütfen aşağıdaki terimlerin tanımlarını öğrenin ve sağlığınızı iyileştirme yolculuğunuzda gerektiği kadar bu listeye bakın.

Kuralların tanımı

Aktivasyon: Bir tür kimyasal değişim (reaksiyon) meydana getirmek için bir maddenin ikinci bir maddeye eklenmesi. Sodyum klorite, klor dioksiti serbest bırakmak için bir gıda asidi eklendiğinde aktif hale geldiği söylenir.

Kehribar Rengi: Sodyum klorite sitrik veya hidroklorik asit eklendiğinde (bu kitapta belirtilen yüzdelerde), 30 saniye sonra damlalar kehribar rengine dönmelidir. Bu kitapta kehribar dediğimizde kahverengi bir renkten bahsediyoruz. Bu, açıktan koyu kahverengiye kadar herhangi bir yerde olabilir, ancak sarı olamaz. MMS ile aktive edilen su eklemeden önce düşen kehribar rengi, ışığa tutulduğunda bir cam kehribar şişenin (uçucu yağlar, çeşitli tıbbi iksirler veya bira şişeleri için kullanıldığı gibi) rengine çok benzer.

Machine Translated by Google

Klor Dioksit: Doğal olarak oluşan bir mineralden alınan kimyasal bir bileşik (ClO2) . Bu kitabın sağlık iyileştirme programında patojenleri yok etmek ve zehirleri etkisiz hale getirmek için kullanılır.

DMSO (Dimetil Sülfoksit): Odun hamurundan elde edilen doğal bir madde. Kan pıhtıları da dahil olmak üzere suyun çözemediği birçok şeyi çözen bir çözücüdür ve bu nedenle felçleri durdurduğu bilinmektedir. MMS'in etkinliğini artırarak dokuların daha derinlerine taşınmasına yardımcı olmasının yanı sıra, kendine ait birçok iyileştirici özelliği olduğu bilinmektedir.

Herxheimer Reaksiyonu: Vücutta, ölü patojenlerin ürettiği toksinleri vücudun ortadan kaldırabileceğinden daha hızlı bir şekilde büyük miktarlarda patojen öldürüldüğünde, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal veya aşırı yorgunluk gibi diğer rahatsızlıklara neden olabilir. .
Buna Herxheimer reaksiyonu denir ve bu kitaptaki protokolleri takip etmek gibi bir detoksifikasyon programından geçerken yaygındır. Bu deneyim sizi özellikle iyi hissettirmese de, bir Herxheimer reaksiyonu yaşamanın genellikle iyileşmenin gerçekleştiğinin bir işareti olduğunu unutmayın. Bu kitap, detoksifikasyon sürecinin nasıl kolaylaştırılacağına dair yönergeler içerir ve kişinin Herxheimer reaksiyonunun etkilerini en aza indirmeye tam olarak yardımcı olmasını umar.

Master Mineral Solution (MMS): Hasta kişilerin sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için kullanılan bir mineral/ kimyasal çözeltinin adı.

Mineral: Bu kitapta kullanılan mineral kelimesinin tanımı, Random House Dictionary'deki üçüncü tanımdan ve Merriam Webster Dictionary'deki dördüncü tanımdan alınmıştır ve her ikisi de benzerdir. Mineral, “hayvansal veya bitkisel olmayan herhangi bir maddedir”.

Machine Translated by Google

MMS: Suda %22.4'lük bir sodyum klorit (NaClO2) çözeltisi olan aktifleştirilmemiş MMS . (Bu, %80 sodyum klorit tozu veya pullarından yapılmıştır.)

MMS1: Etkinleştirilmiş MMS olarak da anılır . (MMS'ye eklenen "1"e dikkat edin.) MMS (sodyum klorit) artı bir aktivatördür (gıda asidi). İkisi birlikte karıştırıldığında MMS1 (klor dioksit [ClO2]) üretirler.

Not: Klorun kimyasal formülü "Cl" olmasına rağmen, Cl kimyasal formülü klor dioksitin (ClO2) kimyasal formülünde de bulunur ve ayrıca sofra tuzu (NaCl) kimyasal formülünde de bulunur. Klor dioksit, toksik olan ve kansere neden olduğu bilinen yaygın ev tipi ağartıcıdan (kimyasal formülünde Cl de bulunan sodyum hipoklorit, NaClO) tamamen farklıdır. Klor dioksit (ClO2) kansere neden olmaz ve insan vücudunda veya içinde olabilecek hastalığa neden olan mikroorganizmaları vücuda zarar vermeden (oksidasyon yoluyla) yok etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Klor dioksitin kimyasal yapısı nedeniyle, bu mikroorganizmaları öyle bir şekilde yok eder ki, aynı zamanda yok olur, geride sadece birkaç tane sade sofra tuzu, boşalmış oksijen atomları ve vücudun temizlediği ölü mikroorganizmalar bırakır. sistemden kolayca yıkanabilir.

MMS1 Doz Düşüşleri: Bu kitapta MMS1'in (aktive edilmiş MMS) "damlalarından" bahsettiğimiz her zaman, sadece gerçek MMS (sodyum klorit) damlalarını sayıyoruz. Bu nedenle, bir MMS1 dozuna ilave aktivatör damlaları eklesek de, dozdaki damlalardan bahsederken eklenen aktivatör damlalarını saymıyoruz. Örneğin, 3 damlalık bir MMS1 dozu, 3 damla MMS ve 3 damla aktivatör asit içerir ve aslında toplam 6 damla sıvı oluşturur, ancak yine de bunun sadece 3 damlalık bir doz olduğunu söylüyoruz.

Machine Translated by Google

MMS2: Kalsiyum hipoklorit, Ca(ClO)2, suyla karıştırıldığında, insan bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği, hastalık mikroplarını yok etmek ve sistemdeki zehirleri temizlemek için ürettiği bir oksitleyici asit olan hipokloröz asit çözeltisine dönüşür.

Patojenler: Konağında hastalığa neden olan her türlü mikroorganizma. Konak insan, hayvan, bitki, mantar ve hatta başka bir mikroorganizma olabilir.

Sodyum Klorit: Dünya çapında büyük tortularda bulunan doğal bir mineral olan sodyum klorürden (NaCl, sade tuz) alınan bir kimyasaldan üretilir.

Sodyum klorit (NaClO2) yapmak için birçok farklı işlem vardır . Mutfağınızda yapılamaz. Bir fabrikada yapılmalıdır. Bu endüstriyel işlem tamamlandığında, MMS yapmak için hammadde olan sodyum klorit (NaClO2) elde etmiş olursunuz. MMS, su içinde %22.4'lük bir sodyum klorit çözeltisidir.

WPS: Su Arıtma Çözümü, bu MMS ile aynı formüldür. Arıtılmış veya damıtılmış suda %22.4 sodyum klorit (NaClO2)'dir .

Açıklama

MMS, sudaki bir sodyum klorit çözeltisinin farklı kullanımlarının çoğunu belirtmek için dünya çapında kullanılan genel kısaltma terimidir. Sodyum klorit, gıda sınıfı bir asitle karıştırıldığında klor dioksit oluşturan bir mineral/ kimyasaldır. Klor dioksit, insan vücudunun içindeki ve dışındaki hastalıkları öldürür ve protokollerimizin çoğunda kullanılan aktif bileşen olan klor dioksittir.

Bu yüzden bazen şu soru sorulur: MMS nedir? Sodyum klorit mi? Yoksa klor dioksit mi? Cevap:

Machine Translated by Google

İkisi de! Yukarıda söylediğim gibi, MMS terimi genellikle geçmişte Mucize Mineral Çözümü dediğim şeyi ve şimdi Ana Mineral Çözümü dediğim şeyi tanımlamak için genel bir terim olarak kullanılır. Bu bağlamda, "Eh, bu mineral solüsyon, dolayısıyla klor dioksit" denebilir. Evet, ama yine de, %22.4'lük bir sodyum klorit çözeltisi de genellikle MMS adıyla satılır ve bu ve diğer kitaplarda ve web sitelerinde MMS olarak adlandırılır.

Kitaplarımızda ve yukarıda tanım listesinde belirtildiği gibi, MMS'den sudaki %22,4'lük sodyum klorit çözeltisi olarak bahsediyoruz ve MMS'ye bir klor dioksit çözeltisi oluşturan bir gıda asidinin eklendiğini belirtmek için MMS1 kısaltmasını kullanıyoruz. . Teknik olarak MMS, sodyum klorittir (suda %22.4'lük bir çözelti) ve MMS1, MMS artı klor dioksit üreten bir aktivatördür. Ancak, günlük konuşmada her ikisine de genellikle basitçe MMS denir. Biri, "MMS dozumun zamanı geldi" (yani aktifleştirilmiş MMS'lerinin suya düştüğü anlamına gelir) veya "Bana MMS'i verin, böylece dozumu karıştırabilirim" diyebilir, yani bana %22,4'lük sodyum klorit çözeltisi şişesini ver. daha sonra klor dioksit üretmek için gıda sınıfı asit ile karıştırılacaktır. Ya da daha ileri götürerek, "Biraz MMS sipariş etmem gerekiyor" diyebilir, bu da muhtemelen bir şişe %22.4 sodyum klorit artı bir şişe gıda sınıfı asit sipariş edeceği anlamına gelir.

MMS'den klor dioksit için basitçe “CD” diye bahsedenler var. Şahsen ben bu terimden hoşlanmıyorum çünkü konuya daha fazla kafa karıştırıyor. Bu uzun açıklamaya kafa karıştırmak amacıyla değil, ama umarım açıklığa kavuşturmak için giriyorum, çünkü MMS terimi çok geniş bir alana yayıldı ve dünya çapında bu genel şekilde kullanılmaktadır - bence bunu durdurmak mümkün değil. Sadece akışla gitmemiz gerektiği sonucuna vardım.

Bunu şöyle düşünün - MMS'i genellikle kahve için kullanılan genel terime benzetirim. Kahve içmeyi sevdikleri söylenebilir. Fakat

Machine Translated by Google

soru ortaya çıkıyor: Ne tür kahve? Sonuçta, birçok kahve türü ve varyasyonu ve bunu yapmanın yolları vardır.
Damla/filtre kahve, Fransız presinden yapılmış kahve veya süzgeçten veya espresso makinesinde veya hızlı ve kolay hazır kahve vardır. Çeşitli kahve çekirdekleri ve hatta daha fazla kahve karışımı çeşidi vardır. Kahve hazırlamanın ve içmenin her türlü yolu vardır. Biri Cappuccino, diğeri Mocha Late, diğeri sade Espresso, Americano, Türk Kahvesi, İrlanda Kahvesi, Viyana Kahvesi, Café Cubano, Caffe Latte veya iyi bir Juan Valdez fincanı sevebilir. Mesele şu ki, tüm bu ve daha pek çok kahve çeşidinden bahsederken, arkadaşlarınızla dışarı çıkıyor olsaydınız, muhtemelen "hadi kahve içelim" diyeceksiniz, ancak kafeye gittiğinizde çeşitli kahve çeşitleri. kahve sipariş edilecekti. Bu anlamda kahve geniş bir terimdir ve aynı şey MMS terimi için de söylenebilir.

Bu nedenle, iş MMS dozlarını karıştırmak ve bu kitaba göre kişinin sağlığını iyileştirmek için kullanmak söz konusu olduğunda, lütfen yukarıdaki tanımlarda listelendiği gibi MMS terimlerini özenle takip edin ve bilin ki genel terimlerle konuşurken, MMS kısaltmasının MMS olduğunu bilin. çeşitli şekillerde kullanılır.

Bu Kitapta Kullanılan Ölçüler

Bu kitapta kullanılan birincil ölçüler damlalar, sıvı onslar, mililitreler ve bardaklardır. Bu ölçümler ülkeden ülkeye biraz farklılık göstermektedir. Örneğin, bir İngiliz sıvı onsu = 28,41 mililitre, bir Amerikan sıvı onsu = 29,57 mililitre.

Birçok pişirme işlemi ve hatta laboratuvarlar yukarıdaki rakamları tamamlıyor ve ben de aynısını yapıyorum. Basitlik adına ve bu kitap küresel bir okuyucu kitlesine yazıldığından, aşağıdakileri tamamladık:
1 akıcı

Machine Translated by Google

ons ila 30 mililitre; 1/2 fincan ila 4 sıvı ons veya 120
mililitre. (Her yerde ons veya ons yazılı bulunursa
Bu kitap, sıvı onstan veya sıvı onstan bahsediyoruz.)

Ek olarak, aynı durum damla ölçmek için de geçerlidir. Orası
bir düşüşün ölçülmesinde etkili olan değişken faktörlerdir. İçinde
bu kitap genel bir genel kurala uymayı seçtim
(metrik sisteme göre) 20 damla 1'e eşittir
mililitre. Damla boyutunun farklı olabileceğini unutmamak önemlidir.
farklı damlalıklar arasında, damlalıklı şişeler vb.
Genel olarak, damlaların düştüğü iyi şişeler kullanıyorsanız
kolay, her seferinde bir damla ve şişeler sızdırmıyor,
ya da size kaçak damlalar verme eğiliminde - her şey
iyi. Damlalık şişeleriniz iyi çalışmıyorsa, düşünün
MMS'iniz ve etkinleştiriciniz için başka bir tedarikçi bulmak.

MMS Sağlık Kurtarma Kılavuz Efsane	
MMS	etkinleştirilmemiş MMS
MMS1	etkinleştirilmiş MMS
MMS2	kalsiyum hipoklorit
HCl	hidroklorik asit
ml	mililitre
1 ml	20 damla
1 ons	30 ml
1 yemek kaşığı	15 ml
1 çay kaşığı	5ml
1/2 bardak	4 ons/120 ml
cc	santimetre küp
1 ml	1 cc

Machine Translated by Google

CDS ve CDH

MMS1 dışında, MMS'nin diğer iki biçimi daha vardır: CDS (Klor Dioksit Çözeltisi) ve CDH (Klor Dioksit Tutma). Her üç form da biraz farklı şekillerde çalışsa da, üçü de insanların sağlıklarını geri kazanmalarına yardımcı olmada başarılı olmuştur. Bununla birlikte, bu Kılavuz Kitapta yalnızca orijinal MMS'e atıfta bulunacağız - bu, bugüne kadar en çok denenmiş ve daha uzun bir süre boyunca kanıtlanmış formüldür. Bu kitabın bir amacı, siz okuyucuya Master Mineral Solution'ın kullanımında iyi bir temel sağlamaktır. Bu temel anlayış, tüm MMS biçimlerini kullanmak için gereklidir. Bu temel bilgileri alırsanız, daha iyi sağlık yolunda ilerlemiş olursunuz. Bu kitaptaki aynı ilkeler diğer MMS biçimlerine de uygulanabilir. (Bkz. Ek A.)

MMS Almak Güvenli mi?

20 yıl içinde, MMS'in keşfinden bu yana, MMS (çözelti içindeki klor dioksit, dünya genelinde zamanın %99'unda kullanıldığı şekilde) kullanımı sonucunda ölen ya da kalıcı yaralanan hiç kimsenin farkında değiliz.). MMS keşfedilmeden yıllar önce klor dioksit gazının neden olduğu yalnızca bir kayıtlı ölüm (endüstriyel kaza) biliyoruz. Bu, klor dioksitin yüzlerce başka kullanımla birlikte suyu arıtmak, hastane zeminlerini dezenfekte etmek, mezbahaları dezenfekte etmek ve sebzeleri arıtmak için yaygın olarak kullanılmasına rağmen. Bu ve diğer yollarla diğer tek bir mineral/kimyasaldan daha fazla klor dioksit, dünya çapında yüz milyonlarca insanın sağlığını ve yaşamını iyileştirdi ve hala 100 yılda klor dioksit kullanımından kaynaklanan ölüm veya kalıcı yaralanma kaydedilmedi. . Bu aynı zamanda sağlık restorasyonu amacıyla ağızdan MMS alan milyonlarca insanı da içerir. Ölüm yok karşılaştırın,

Machine Translated by Google

MMS ile ilgili olmayan tek bir endüstriyel kaza dışında, yalnızca ABD'de her yıl farmasötik ilaçların neden olduğu yaklaşık 950.000 ölüm veya Ibuprofen ve Aspirin'in neden olduğu 15.000 ölüm. Her şey düşünüldüğünde, klor dioksit bilinen en güvenli kimyasal olmasa da en güvenli olanlardan biridir. Daha fazla ayrıntı için bakınız:

http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

Bazı protokollerimizde DMSO (dimetil sülfoksit) de kullanılmaktadır. DMSO'nun ABD'de piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 60 yıl içinde, DMSO'nun neden olduğu kalıcı bir hasar veya ölüm raporu hiç olmadı. DMSO'nun, MMS'nin etkinliğini arttırmanın yanı sıra kendi iyileştirici niteliklerine sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

MMS Ne Değildir?

MMS'i "ağartıcı" veya çamaşır suyu kaynaklı olduğunu söyleyerek itibarsızlaştırmaya çalışan eleştirmenler oldu, bu yüzden burada bazı temel bilgileri açıklamak istiyorum. Bu konuyu tam olarak ele almak için kimyayı oldukça derinden araştırmak gerekir . Ancak, temel bilgiler oldukça basittir ve burada değineceğim şey bu. Klor dioksit (ClO_2) ve sofra tuzu (NaCl) her ikisinin de bileşiminde klor elementi bulunmasına rağmen (yine her iki formüldeki “Cl”nin klor anlamına geldiğini unutmayın), bu durumda klor tehlikeli olmayan bir formdadır ve aslında yararlıdır. Öte yandan, sodyum hipoklorit (NaClO) olan ev tipi ağartıcının da formülünde Cl bulunur, ancak bu durumda klor (Cl) farklı bir formdadır ve bazı durumlarda çok tehlikeli olabilir. (Lütfen bu üç maddenin formülde bir şekilde “Cl” içermesine rağmen hepsinin tamamen farklı olduğunu unutmayın.)

Machine Translated by Google

Bu bilgi için internetten MSDS'ye (Malzeme Güvenlik Veri Sayfası) bakabilirsiniz. Bu güvenlik bilgi formu, "Kararlılık Verileri" altında, yine ev tipi çamaşır suyu olan sodyum hipokloritin (NaClO), klozet temizleyicileri, pas sökücüler, sirke, asitler ve amonyak ürünleri ile reaksiyona girerek hastaneye yatışa neden olan tehlikeli gazlar üretebileceğini göstermektedir. ve hatta ölüm. İngiliz deneklerle her yıl 2.200 kadar hastaneye yatış olayı meydana geliyor. Çeşitli çeşme suları ile karıştırıldığında ve insan vücudu ile temas ettirildiğinde klor dioksit ve sofra tuzunun yapamadığı kansere neden olan kimyasallar üretebilir.

Klor dioksit, doğal olarak oluşan mineral, aslında sofra tuzu olan sodyum klorürden (NaCl) alınan minerallerden ve kimyasallardan birkaç farklı işlemden birinde üretilir. Böylece, yaygın sofra tuzu, sodyum klorür (NaCl) çeşitli üretim süreçlerinden geçerek sodyum klorit (NaClO2) haline gelir. Kimyasal olarak bu , sodyum klorit olan (NaClO2) üretmek için her bir tuz molekülüne (NaCl) iki atom oksijen (O2) eklenerek yapılır . Daha sonra bu sodyum klorit, zayıf bir gıda asidi ile karıştırıldığında , bu kitapta tartışılan protokollerde ana aktif bileşen olan klor dioksit (ClO2) olur.

Klor dioksitin endüstride yüzlerce kullanımı vardır ve bu kitaptaki MMS Health Recovery çözümünden 1000 kat daha güçlü olarak kullanılmaktadır. 4 ons/120 ml (1/2 su bardağı) suda 3 damla sodyum klorit çözeltisi (suda %22.4 sodyum klorit) standart dozumuz, bir şeye atıfta bulunarak “ağartıcı” olarak adlandırılabilecek herhangi bir çözelti yapmaz. tuvaleti temizleyecek kadar güçlü, vb. MMS'in çamaşır suyu olduğunu söyleyen eleştirmenler, yalnızca insanları gereksiz yere korkutmakta ve korktukları kişilerin acı çekmesine ve hatta ölmesine neden olmakta başarılı olmaktadır. Sadece formüle bakın—NaClO2 (sodyum klorit/MMS)

Machine Translated by Google

NaClO'dan (sodyum hipoklorit) farklı—farklı formül, farklı maddeler. O yüzden akıllı ol, başkalarının seni kandırmasına izin verme!

Oksidasyonu Anlamak

Oksidasyon

Evrenin küçük parçacıkları, onları çevreleyen elektronlar tarafından bir arada tutulur. Maddeyi bir arada tutan elektronların değişmesiyle sonuçlanan herhangi bir eylem oksidasyon olarak kabul edilir. Oksitlenmenin bir şekilde oksitlenene oksijen eklediğini düşünmüş olabilirsiniz, ama öyle değil. Temel olarak, oksidasyon, şeyleri bir arada tutan elektronların konumunu ya kaldırır ya da değiştirir. Bu, maddeleri ya tamamen yok eder ya da başka bir şeye dönüştürür.

MMS ve Oksidasyon

MMS1 (klor dioksit) patojenleri (hastalığa neden olan mikroorganizmaları) oksijen kullanarak değil, oksitleyerek yok eder. MMS1, patojenleri bir arada tutan elektronların bir kısmını çekerek onların yok olmasına neden olur. MMS1 de yıkıcı süreçte tamamen yok edilir ve geride sadece çok az miktarda sofra tuzu (sodyum klorür [NaCl]) ve vücuttan basitçe yıkanan nötralize oksijen bırakır. Patojenler tarafından oluşturulan çeşitli zehirler de oksidasyon işlemi ile yok edilir. Gerçek şu ki, MMS1 vücudu hastalıktan iyileştirmez. Patojeni öldürmenin oksidasyon süreci gerçekleşirken, vücudu iyileştiren toksinlerden arınmış vücuttur. Faydalı bakteriler oksidasyona karşı oldukça dirençlidir ve bu nedenle klor dioksitten zarar görmezler.

Machine Translated by Google

Diğer Oksitleme İşlemleri

Oksijen, birçok önemli özelliğinden dolayı doğanın insan vücudunda kullanılmak üzere belirlediği oksitleyicidir. Mevcut oksijen terapileri sadece nefes almaktan fazlasını içerir. Bir tür oksijen terapisinde, denek saf oksijenle dolu basınçlı bir hiperbarik odaya girer. Basınç altındaki saf oksijen, basınçsız oksijenden çok daha etkilidir. Bunun birçok faydası vardır ve bazı durumlarda mucizeler yaratmıştır. Ne yazık ki, artan basınç aynı zamanda oksijenin olumsuz özelliklerini çoğaltır, yani oksijenin iyi hücreleri olduğu kadar kötü hücreleri de oksitleme (yok etme) yeteneğini arttırır.

Bu tedavi de çok pahalıdır ve genellikle birden fazla tedavi gerekir; bu nedenle, insanlığın çoğunluğu basitçe maliyeti karşılayamaz.

Bazen vücutta kullanılan diğer iki çok güçlü oksitleyici hidrojen peroksit ve ozondur. Bunların her ikisi de hastalıkları ortadan kaldırmak için kullanılmış olsa da, aynı zamanda yanlış kullanıldığında vücuda zarar verebilirler. Her ikisi de oksijen veya MMS1'den (klor dioksit) daha güçlüdür. Hidrojen peroksit ve ozon, insan vücudu dokuları da dahil olmak üzere birçok şeyi yok edebilir ve edebilir.

Patojenler vücut dokularının derinliklerinde saklanır. Hidrojen peroksit ve ozon da klor dioksit gibi bir şeyi oksitlediklerinde yok edildiklerinden, genellikle dokularda saklanan patojenlere ulaşmadan vücut dokularını oksitleyerek yok edilirler. Ayrıca kan ve dokulardaki zehirler ve safsızlıklar tarafından da yok edilebilirler. Ozon ve hidrojen peroksit bazen faydalı olabilir, ancak kullanımı konusunda eğitimli olmayan biri tarafından asla kullanılmamalıdır.

Bu dört oksitleyicinin oksidasyon potansiyelleri aşağıda verilmiştir. Herhangi bir belirli oksitleyicinin gücü ölçülür

Machine Translated by Google

volt cinsinden ve gördüğünüz gibi, klor dioksit (MMS1)
dört oksitleyiciden en az güçlü olanıdır. MMS1 seçici olduğundan
(vücut dokularını değil patojenleri oksitler) ,
hem patojenleri oksitlemede daha etkilidir, hem de
bu diğer oksitleyicilerden daha güvenli olmak.

Klor Dioksit	0,95 volt
Oksijen	1.30 volt
Hidrojen peroksit	1.80 volt
Ozon	2,07 volt

Not: Anlamanın daha ayrıntılı bir açıklaması için
MMS ve oksidasyon süreci, The Master Mineral Solution of the
3rd Millenium Bölüm 21 kitabını okuyun,
Oksitleyiciler ve Oksidasyon ve Ek, Anlama
MMS. ayrıntılı bir anlayış için kitabın tamamını okuyun
MMS'in tüm yönleri ve işlevi.

Bilgece bir söz

Benim tecrübeme göre bazı insanlar ara sıra
Genesis II Kilisesi'nin tekniklerini ve protokollerini değiştirmek
için nedenler bulmak (bkz. Ek B). Bu genellikle
protokollerin çalışmasını veya çalışmasını engeller
ellerinden geldiğince iyi. Bu kitaptaki bilgiler,
20 yıllık bir süre boyunca MMS alan milyonlarca insanın sonucu
yıllar. Sağlık Bakanlarımız bu protokollerin en iyi şekilde takip
edildiğinde işe yaradığını tecrübeleriyle öğrenmiştir.
burada veriliyorlar. Bu yüzden lütfen, kitaba göre gidin, takip edin
talimatları dikkatli bir şekilde ve optimum sonuçlar için lütfen
prosedürleri değiştirmeyin.

Bu kitap, sağlığı iyileştirmek için bilinmesi gereken önemli
ayrıntılarla dolu. değilsen
bu hayati ayrıntılardan bazılarının farkında olmak,
kurtarma, aynı şekilde, diğer önemli noktalar sigortaya yardımcı olabilir

Machine Translated by Google

iyileşmen. Bu kitabı baştan sona baştan sona okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum ! MMS'i öğrenirken köşeleri kesmek istemezsiniz.

Sizi kitabın tamamını okumaya teşvik etmeme rağmen , Sağlığı İyileştirme Planına (Bölüm 5) başlamadan önce kitabı bitirmeniz gerekmediğini bilmek önemlidir . Bölüm 1'den Bölüm 6'ya kadar okuduktan ve anladıktan sonra, Başlangıç Prosedüründen başlayarak sağlığın geri kazanılmasına giden yola başlayabilirsiniz (bkz. sayfa 79). Başlamak için tüm kitabı baştan sona bilmeniz gerekmez, ancak okumaya devam edin ve MMS Sağlık Kurtarma Planı hakkında kendinizi eğitin. Hepsini okuyarak, MMS'in kullanılabileceği çeşitli yolları anlayacaksınız ve sağlığın iyileşmesi için yapılması ve yapılmaması gereken çok önemli bazı şeyleri öğreneceksiniz.

Hafıza Geri Yüklendi: Eskiden New Plymouth'ta faaliyet gösteren ve Ajan Orange ve diğer birçok zehirli spreyi yapan kimya şirketinden (kapatıldığından beri) hayatta kalan son kişi olduğunu iddia eden yaşlı bir adam (80-90'lı yaşlarında). Orada 50 küsur yıl çalıştıktan sonra, toksinlerle o kadar dolu olduğunu ve bir gün önce yaptığı şeyleri ve vücutta toksin birikmesiyle ilgili diğer sağlık etkilerini hatırlayamadığını söyledi. Birisi ona denediği MMS'den bahsetti. İkinci gün beni heyecanla aradı, önceki gün yaptıklarını hatırladığını söyledi. MMS'de yaklaşık bir hafta içinde %100 daha iyi olduğunu iddia etti. Artık MMS'in bir savunucusu ve dinlemeye istekli olan herkese söylüyor. -P

Machine Translated by Google

Bölüm 2
Güvenlik önlemleri

Klor dioksit, hastanelerde, yemek hazırlamada, su arıtmada ve daha birçok şeyde yüz yıldır güvenle kullanılmaktadır. Son zamanlarda milyonlarca insan tarafından sağlıklarını harika sonuçlarla iyileştirmek için çok güvenli bir şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte, dikkatli olunması gereken birkaç durum vardır. Sağlığınızı geri kazanırken mümkün olan en keyifli deneyimi yaşamanızı istiyoruz. Bu önlemlerden vazgeçmeyin, ancak optimum sağlık yolculuğunuza başlamadan önce bunların farkında olun.

Aşağıda listelenen bazı güvenlik önlemleri, bu kitabın diğer bölümlerinde, ilgili oldukları çeşitli konular altında yer almaktadır. Bu derlenmiş listeyi kolay başvurunuz için size vermek için burada tekrarlıyoruz. Aşağıda listelenen bazı önemli güvenlik önlemlerinin yalnızca bu listede yer aldığını lütfen unutmayın.

MMS/MMS1

Ü MMS'i çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bugüne kadar herhangi bir ölüm vakası olmadı, ancak birkaç çocuk yanlışlıkla çok yüksek dozda (bir çocuk için tasarlanmamıştır) MMS içtikten sonra çok hastalandı.

Ü MMS'nin (sodyum klorit çözeltisi) işaretlenmemiş bir şişe veya bardağa asla oturmasına izin vermeyin. Kokusu yoktur ve MMS arasındaki farkı söylemek genellikle zor veya imkansızdır.

Machine Translated by Google

ve su. Bazı insanlar su içmediklerini fark etmeden önce 1/2 bardak kadar içmişlerdir.
Bu aşırı dozda seyreltilmemiş, konsantre MMS ve birkaç hafta hastanede kaldılar! Doz aşımı durumunda, bir kişi yanlışlıkla veya bilerek çok fazla MMS içerse, kusturmak için hemen mümkün olduğu kadar tuzlu su içmelidir (1 litre/çeyrek suya 1 yemek kaşığı tuz kullanın); sonra daha fazla tuzlu su için ve tekrar kusmaya çalışın ve bunu birkaç kez yapın. Bu süreçten sonra hala kendilerini kötü hissediyorlarsa hastaneye gitmeleri gerekir.

Ü Tüm MMS, asit vb. şişelerinin içinde ne olduğunu kolayca anlayabilmeniz için açık bir şekilde etiketlendiğinden emin olun. İdeal olarak, etiketlerin ayırt edilmesini kolaylaştırmak için farklı renklerde olması gerekir. Kağıt etiketler kullanılıyorsa, zamanla üzerlerine sızıntı olursa dağılmalarını ve dağılmalarını önlemek için scotch bant ile kaplanması yardımcı olur.

Ü Gözler için olduğu kadar vücudun diğer bölgeleri için de topikal kullanım için bir sprey şişesinin kullanılmasını önerdim. Bununla birlikte, gözlerde kullanım formülü, topikal cilt kullanımı formülünden önemli ölçüde farklıdır. Bu iki farklı sprey solüsyonunu çok iyi işaretlenmiş halde tutmaya özellikle dikkat edin. Gözdeki cilt için tasarlanmış sprey şişesini asla kullanmayın.

Ü Çok fazla MMS1 alıyorsanız ve ciddi Herxheimer reaksiyonunuz varsa (bulantı, kusma, aşırı ishal) panzehir olarak C vitamini alınız. Bir seferde 2 gram (2.000 mg) C Vitamini alın. Semptomlar devam ederse, ertesi saat 1 gram daha ve üçüncü saatte 1 gram daha C vitamini alabilirsiniz. Bu miktarda C vitaminini aşmayın. Panzehir olarak kullanabileceğiniz diğer iki seçenek: Taze bir elma yiyin. Isırıp yutmayın, çok iyi çiğnenmelidir. Veya 1 çay kaşığı karbonat sodayı 1/4 fincan (2

Machine Translated by Google

ons/60 ml) su. İsterseniz bundan sonra birkaç yudum daha sade su için.

Ü Evinizde fosseptik varsa, tankınızdaki bakterileri öldürebileceğinden MMS atıklarını tahliye etmeyin. Bu bir karışıklık yaratır ve onarımı pahalıdır.

Ü MMS şişeden çıkan tam kıvamlı sıvı (%22.4 sodyum klorit solüsyonu) cildi tahriş edebilir. Cilde doğrudan temas ederse, temiz su ile durulayın. Konsantre solüsyon renklerini bozabileceğinden, giysilerinize bulaştırmamaya çalışın. Seyreltik bir çözelti, konsantrasyona ve kumaşa bağlı olarak bazı kumaşların rengini bozabilir. (Cildinize tam güçte MMS koyma kuralının iki istisnası vardır, bunu yanıklara ve sivrisinek ısırıklarına yardımcı olmak için kısa sürelerle yapabilirsiniz, uygun talimatlar için 245 ve 196. sayfalara bakın.)

Ü Sodyum klorit ve bir asit aktivatörünün karışımından oluşan yüksek konsantrasyonlu klor dioksit gazını solumaktan kaçının. Klor dioksit gazı, MMS ve aktivatör karıştırıldığında ve kapalı bir kapta olmadığında kolayca kaçar. Öksürmeye neden olabileceğinden, doğrudan kokusunu almaktan kaçınmak en iyisidir. Dozunuzu doğrudan burnunuzun veya ağzınızın altında karıştırmayın. Torba Protokolü yapıyorsanız (bkz. sayfa 156) dumanları doğrudan solumamaya özellikle dikkat edin. Gazı küçük kontrollü miktarlarda solumanın istendiği zamanlar vardır (bkz. sayfa 159) ve akciğerler ve sinüsler için çok iyileştirici olabilir, ancak bunu gerektiren belirli bir protokole tabi değilseniz ve ne olduğunuzu bilmiyorsanız bundan kaçının. çok fazla nefes almak kolay olduğu için yapıyor.

Ü MMS protokollerinin doğum kontrol haplarının etkisini ortadan kaldırdığı bilinmektedir.

Ü MMS, aktivatör asit ve aşağıdaki protokolleri yapmak için gerekli diğer malzemelerle seyahat ederken veya bunları taşırken

Machine Translated by Google

Bu kitapta, tüm farklı sıvı ve toz türlerini ayırdığınızdan emin olun. MMS (sodyum klorit) ve asit aktivatörü, dökülmeleri ve olası erken aktivasyonları önlemek için asla aynı torbada değil, ayrı olarak paketlenmelidir. DMSO asla ve asla MMS2 ile aynı kapta veya bavulda paketlenmemelidir (26. sayfadaki önemli uyarıya bakın). Tüm bunların, dökülmemeleri için uygun şekilde paketlendiğinden emin olun. (Öneri: Plastik poşet, bant ve ardından çift Ziploc poşete koyun).

Hava yoluyla seyahat ediyorsanız, kullandığınız taşıyıcıda çeşitli türlerde sıvıların ve malzemelerin (ve hangi miktarlarda) taşınmasına ilişkin havayolu düzenlemelerini bildiğinizden emin olun. Kendiniz veya başkaları için herhangi bir sorun yaşamamak için dikkatli bir şekilde paketleme konusunda sorumlu ve gayretli olun veya genel olarak MMS'e olumsuz bir şekilde yansıtın.

KALSİYUM HİPOKLORİT (MMS2)

Ü Kalsiyum hipoklorit organik maddelerle temas ettiğinde çok küçük bir kıvılcımla bile tutuşabilir. Örneğin: Kalsiyum hipoklorit kavanoza birisi bir bez (herhangi bir bez) doldurursa ve herhangi bir nedenle mum, sigara veya başka herhangi bir kıvılcımdan çıkan bir kıvılcım çarparsa, anında ve aşırı sıcak bir yangına neden olur. .

Ü Kalsiyum hipoklorit tozunun dökülmesi durumunda, iki faraş veya bir faraş ve ıslak bir bezle temizleyin, ancak süpürge kullanmayın, çünkü bir kıvılcım kalsiyum hipoklorit tozu ile temas ettiğinde süpürgeyi kolayca tutuşturabilir.

Ü Kalsiyum hipoklorit higroskopiktir ve havadan nem çeker. Kaynağınız nemlenirse, atın, ancak fosseptik tankınız varsa tahliye etmeyin.
Bir şehir kanalizasyonunuz varsa, küçük bir miktar, yaklaşık bir litre, ona zarar vermez. Alev almamasını sağlamak için üzerine az miktarda su ekledikten sonra onu şehir çöplüğüne veya şehir çöp toplayıcısına atabilirsiniz.

Machine Translated by Google

Ü Toz halindeyken cilt ve göz ile temasından kaçınınız.

Ü Kalsiyum hipokloritten çıkan dumanları doğrudan solumayın.

Ü Bir ay boyunca ihtiyacınız olandan daha fazla MMS2 kapsülü yapmayın, çünkü kapsüller kırılgan hale gelir ve kolayca açılabilir.

Ü MMS2 kapsüllerinizi hazırlamak için bir kapsül makinesi kullanıyorsanız (bkz. sayfa 93-94, 274-278), plastikten yapılmış bir makine kullanın, çünkü kalsiyum hipoklorit tozu metalle temas etmemelidir.

UYARI

- Kalsiyum hipokloritin (MMS2) DMSO ile temas etmesine izin vermeyin. Bu aşırı ısı ve ateşle anında yanmaya neden olur. Bu durumda yangını anında başlatmak için bir kıvılcıma ihtiyaç duymaz.
  Böyle bir yangını söndürmek için su kullanın ama su sıçrayacağı için geri çekilin.

- Kalsiyum hipoklorit (MMS2) asla ve asla DMSO ile aynı kap, kutu veya bavula konmamalıdır. Bu eşyaları taşırken her zaman ayrı olarak paketleyin.

YUTMA UYARISI

- Kalsiyum hipoklorit (MMS2) kapsülleri alırken DMSO'yu asla bir içecekte kullanmayın. DMSO, MMS2'nin ısınmasına neden olabilir ve midenizde çok rahatsız edici olabilir. (Bu kazayla olursa, rahatsızlığı gidermek için bol miktarda soğuk su içirin.)

Machine Translated by Google

- Bir MMS1 dozuna DMSO ekliyorsanız, örneğin Protokol 1000 Plus'a göre, her MMS1 damlası için 3 damladan fazla DMSO hesaplamamalısınız ve en az 1/2 fincan (4 ons/120) içinde karıştırılmalıdır. ml) su.

- MMS2'nin MMS1/DMSO dozlarıyla aynı gün alınmasını gerektiren bir protokolde bunu yapabilirsiniz, ancak MMS2 kapsülü MMS1/DMSO dozlarından yarım saat ayrılmalıdır. Asla aynı anda hem DMSO hem de MMS2 kapsülü içeren bir doz almayın!

SİTRİK ASİT/HİDROKLORİK ASİT (HCl)

➤ Sitrik asit ve hidroklorik asit (HCl) tek başlarına cilt ile temas etmemelidir. Asit deriden temiz su ile yıkanabilir. Asit göze kaçarsa, batma hissi geçene kadar gözü temiz suyla yıkayın. Gözünüzü hemen yıkarsanız bir problem olmaz ancak gözünüze temiz su gelmeden önce 30 saniye gibi uzun bir süre geçerse bir problem olabilir ve hemen bir acil servise gitmelisiniz, fakat durulamadan önce değil. gözü suyla iyice Başlangıçta göze sıçramayı önlemek için önerilen bazı önlemler şunlar olabilir: asit dökerken gözlük takın, şişeyi göze sıçramayı önlemek için belirli bir mesafede ve yükseklikte tutmaya özen gösterin, yeterince derin bir bardak kullanın.

Ü Bazı (hepsi değil) insanlar için sitrik asidin önemli mide rahatsızlığına neden olduğu bilinmektedir. Bu durumda MMS için aktivatör olarak sitrik asit yerine %4 HCl kullanın.

Ü Protokollerimiz %4 HCl gerektirir. Bu konsantrasyonda cilde kazara döküldüğünde ciddi bir zarar vermemelidir, ancak yine de hemen durulanmalıdır.

Machine Translated by Google

Bununla birlikte, daha yüksek mukavemetli HCl ve diğer yüksek mukavemetli asitler, uygun şekilde kullanılmadığı takdirde zararlı olabilir. Güçlü asitleri aynı odanın dışında herhangi bir mesafeye taşırken veya taşırken, yanınızda su da taşımanız gerektiğini unutmayın. Bu, cildinizden veya gözlerden dökülen asidi hemen durulamanızı sağlar. Büyük dökülmeler, derhal durulanmadığı veya gözlerden silinmediği takdirde ciddi hasara ve hatta ölüme neden olabilir. HCl'yi yüksek konsantrasyonda tutmanız gerekiyorsa, bunu çok iyi havalandırılan bir alanda yapın, uygun bir maske kullanın, eldiven giyin ve hasara neden olabileceğinden dumanları solumamaya çok dikkat edin.

DMSO

Ü DMSO bir çözücüdür ve deriden dokulara kolayca geçer. Ayrıca diğer maddeleri de beraberinde taşıyacaktır, bu nedenle DMSO'yu kullanmadan önce cildinizde ne olduğuna dikkat edin.

Ü DMSO'yu topikal olarak uyguluyorsanız, DMSO'yu kullanırken ellerinizin ve tırnaklarınızın temiz olduğundan ve kirletici maddelerden (sabun kalıntısı dahil) arınmış olduğundan emin olun. DMSO uyguladığınız alanın temiz olduğundan da emin olmak istersiniz .

Ü DMSO uygulamadan önce cildin bir bölgesini yıkarken , mümkünse uygulama bölgelerini ve elleri yıkamak için doğal, kimyasal içermeyen sabun kullanmak en iyisidir. Bu olsun ya da olmasın, sabunun tamamen durulandığından emin olun veya hiç sabun kullanmayın. Temiz suyla (cildi ovalayarak) iyice yıkayın.

Ü DMSO'yu cilde uygulamanın en iyi yöntemi, DMSO'yu vücudunuza veya bir başkasına sürerken temiz ve kuru çıplak elleri kullanmaktır.

Ü DMSO'yu çıplak elle uyguluyorsanız, oje sürmeyin. DMSO, yalnızca çözünmeyen bir çözücüdür.

Machine Translated by Google

cila değil, aynı zamanda toksik bileşenlerini deriden ve vücuda da taşıyacaktır. DMSO'yu uygulamak için elinizi plastik bir sandviç torbaya koyabilirsiniz (genel olarak bu tür plastik, DMSO ile kullanım için uygundur).

Ü DMSO'yu kullandıktan sonra, sabunu cilde/dokulara taşıyabileceğinden asla sabunla yıkamayın . Ellerinizi temiz su ile güzelce yıkamanız yeterlidir.

Ü Tam gücünü DMSO'dan uzak tutun.

Ü DMSO ile en yaygın eldivenleri (kauçuk, lateks vb.) kullanmayın. Eldivenleri çözebilir. Eldivenlerin küçük bir kısmının çözülmesi bile, lastiği veya lateksi vücudunuza aktarabilir. Gerilmeyen plastikten yapılmış eldivenlerin DMSO ile kullanılması uygundur. Normalde DMSO kişinin ellerine zarar vermez ve eldivenlere gerek yoktur. (Bazı cilt tiplerinde sık veya çok miktarda uygulanması cildin kırışmasına neden olabilir ama bu kısa sürede geçer.)

Ü Bir lavman solüsyonuna asla DMSO eklemeyin. Kolon, vücudun dışarı attığı birçok toksin içerir. DMSO'yu kolona koyarsanız, bu toksinlerin bir kısmını kan dolaşımına geri verebilirsiniz.

UYARI

- DMSO'nun kalsiyum hipoklorit (MMS2) ile temas etmesine izin vermeyin. Bu aşırı ısı ve ateşle anında yanmaya neden olur.

  Bu durumda yangını anında başlatmak için bir kıvılcıma ihtiyaç duymaz. Böyle bir yangını söndürmek için su kullanın ama su sıçrayacağı için geri çekilin.

- DMSO, asla ve asla kalsiyum hipoklorit (MMS2) ile aynı kap, kutu veya valiz içinde paketlenmemelidir. Bu eşyaları taşırken her zaman ayrı olarak paketleyin.

Machine Translated by Google

YUTMA UYARISI

- Kalsiyum hipoklorit (MMS2) kapsülleri alırken DMSO'yu asla bir içecekte kullanmayın. DMSO, MMS2'nin ısınmasına neden olabilir ve midenizde çok rahatsız edici olabilir. (Bu kazayla olursa, rahatsızlığı gidermek için bol miktarda soğuk su içirin).

- Bir MMS1 dozuna DMSO ekliyorsanız, örneğin Protokol 1000 Plus'a göre, her MMS1 damlası için 3 damladan fazla DMSO hesaplamamalısınız ve en az 1/2 fincan (4 ons/120) ile karıştırılmalıdır. ml) su.

- MMS2'nin MMS1/DMSO dozlarıyla aynı gün alınmasını gerektiren bir protokolde bunu yapabilirsiniz, ancak MMS2 kapsülü MMS1/DMSO dozlarından yarım saat ayrılmalıdır. Asla aynı anda DMSO ve MMS2 kapsülü içeren bir doz almayın!

Ücretsiz Kahraman: Dünyamıza MMS verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şahsen birkaç kişinin tam bir eroin bağımlılığından üç ila dört gün içinde sadece saatte 3/4 damla MMS1 ile kurtulmasına yardım ettim. Bu, uyanık oldukları her saat başıdır. Banyo başına 25 damla MMS1 kullanarak MMS1 banyolarını da dahil ettim. %100 inanılmaz sonuçlarla bir avuç dolusu insana kişisel olarak yardım ettim. —Ravi, İngiltere

Machine Translated by Google

Candida Gone: Candida'm o kadar kötüydü ki yıllarca yorulmakla kalmadım, mantar gözlerime ve kulaklarıma göç etti. Bu, mumlu kağıtlara bakmak gibiydi. Kulaklarım uğuldadı ve durmadan çınladı. Özellikle geceleri beni derin bir uykudan uyandıracak kadar kötü olduğunda her yerim kaşınıyordu. Başka birçok semptomum vardı ve birçok tedavi denedim, bunların hiçbiri MMS'i deneyene kadar işe yaramadı. Şeker mayayı beslediği için diyetimi çok düşük karbonhidratlı bir diyete değiştirmek zorunda kaldım. Standart Amerikan diyetini yemeye devam ederseniz daha iyi olabileceğinizi düşünmüyorum, bu yüzden diyetimi neredeyse hiç tahıl, hiçbir şeker ve çok sınırlı meyve içerecek şekilde değiştirdim. Kurtarmak için bunu yapmalısınız. Semptomları uzak tutmakta harika bir iş çıkaran Syclovir adında bir ürün bulmuştum, ancak ürün üzerinde bir yıl geçmesine rağmen tedavi yoktu. Sonra MMS'in Candida'yı öldürmeye yardımcı olabileceğini okudum, bu yüzden günde 4 kez 7 damla aldım ve iyileşme görmeye başladım. Sanırım bu yaklaşımın üzerinden yaklaşık 2 ay geçti ve enerjim çok yüksek. Artık hiçbir semptom olmadan daha fazla karbonhidratı tolere edebilirim. Kendimi harika hissediyorum ve bunun MMS sayesinde olduğunu biliyorum. Ek olarak, MMS ayak parmaklarımdaki artriti tersine çevirdi ve damarlarımı temizlemiş olmalı çünkü artık kendimi zorlayabilirim ve nefesim kesilmiyor. MMS'in hayatımda ne mucize olduğunu

eğer

Çoklu İyileşmeler: MMS1 ve 2 beni prostat büyümesi/ağrı...diş eti/diş enfeksiyonu ve kandidadan kurtardı.
Harika! Banyo yapmak için MMS kullanıyorum... cilt ve yorgun kaslar için harika. —James A., Yeni Zelanda

Machine Translated by Google

Bölüm 3
MMS Temel Temelleri

MMS'i kullanmaya çalışmadan önce bilmeniz gereken bazı temel bilgiler vardır. Pek çok şey gibi, MMS'i de alıştıktan sonra kullanımı kolaydır. Ancak yapmanız gereken son şey, ne yaptığınızı bilmeden kullanmaya çalışmaktır. Kendi sağlığınızın sorumluluğunu almayı seçerseniz, lütfen bu kitaptaki protokollerden herhangi birini gerçekleştirmeye çalışmadan önce ödevinizi yapın.

İşte sağlığınızın iyileşmesi için bir dünya farkı yaratabilecek iki temel faktör:

1. Bir protokole her başladığınızda, kitabı başlangıçta veya birkaç ay önce okumuş olsanız bile, başlamak üzere olduğunuz protokoldeki bilgileri baştan sona gözden geçirdiğinizden emin olun. Başlamadan önce yapılması gereken her şeyi net bir şekilde anlamak önemlidir . Bu, protokol için gereken tüm materyalleri toplamanıza yardımcı olacak ve protokolde belirli bir aşamaya gelip eksik kalmaktan veya başlangıçta yanlış bir şey yaptığınızı fark etmekten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bazı protokoller diğerlerinden daha ayrıntılıdır ve bazıları başarı için gerekli olan önemli uyarıları ve/veya ayrıntıları içerir. Bu nedenle, bir protokole başlamadan önce hafızanızı tazeleyin ve her ayrıntıyı net bir şekilde anlayın.

2. Mümkünse bir partneriniz olsun. MMS'in birçok kullanımı vardır. Genel bir temizlik için bir protokol kullanarak gayet iyi yapabilirsiniz.

Machine Translated by Google

ya da soğuk algınlığını yenmek için. Ama çok hasta olduğunuzda, ister çok kötü bir grip olsun, ister daha ciddi veya uzun süreli bir hastalık olsun, kendinizi bir doz karıştırmaya, banyo hazırlamaya veya saat ve ölçümleri takip etmeye doyamayabilirsiniz. Tek başınıza gitmeye çalışmayın. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek birini, bir eş, bir ebeveyn, oğul veya kız, teyze veya amca, büyük ebeveyn, bir arkadaş veya bakıcı bulun.

MMS'i etkinleştirme

Sitrik Asit ve Hidroklorik Asit (HCl)

MMS'in "aktive etmek" için gıda sınıfı bir aside ihtiyacı vardır ve ikisi birlikte MMS1 (klor dioksit) üretir. MMS'i aktive edebilen, taze limon veya misket limonu suyu veya sirke gibi birkaç asit vardır. Ancak bu kitapta, MMS'yi etkinleştirmek için bir asit kullanmaktan bahsettiğimizde, %50 sitrik asit veya %4 HCl (hidroklorik asit) kullanmayı kastediyoruz. Bu iki asidi bu yüzdelerde kullanırken her zaman 1 damla MMS için 1 damla asit kullanın. Bu yüzdelerdeki bu asitlerin her ikisi de MMS ile 1'e 1 oranındadır.

Başka bir deyişle, her 1 damla MMS'ye bu asitlerden herhangi birinin 1 damlasını karıştırın. %50 sitrik asit veya %4 HC1 kullanarak bu damla damla dozların karıştırılması için standart aktivasyon süresi 30 saniyedir. Temel bir MMS1 dozunun nasıl karıştırılacağına ilişkin tüm talimatlar için sayfa 32'ye bakın.

HCl'yi , midenizde doğal olarak üretilen asitle aynı olduğundan, tercih edilen aktivatör olarak tercih ediyoruz.
Birçok insan daha iyi bir tada sahip olduğunu ve midede daha kolay olduğunu düşünüyor.

Bazı Alternatif Asitler

MMS için aktivatör olarak hem sitrik hem de hidroklorik asidin kullanımı kolaydır; ancak konumunuza ve müsaitlik durumunuza bağlı olarak veya acil bir durumda, aşağıdaki gibi diğer etkinleştiriciler

Machine Translated by Google

MMS'i etkinleştirmek için taze limon veya limon suyu veya sirke kullanılabilir, ancak bunlar farklı şekilde ölçülür. Bu asitlerden herhangi birini kullanıyorsanız, her 1 damla MMS için 1'e 5 oranında 5 damla limon, kireç veya sirke kullanmanız gerekecektir. Bu alternatif asitler kullanılıyorsa, %50 sitrik asit veya %4 HCl için standart aktivasyon süresi olan 30 saniye yerine aktivasyon süresi üç dakika olmalıdır.

Notlar

Ü Taze limon veya misket limonu suyunu kullanırken, limonun veya kirecin kabuğunu (kabuğu veya dış yüzeyi) hiçbir şekilde sıkmayan bir narenciye presi kullanmamak önemlidir. Limon/kireç kabuğundan elde edilen yağın, meyve suyuyla karıştırılması durumunda, sodyum kloritin aktivasyonunu önleyebilir ve böylece kullanışsız bir dozda bir tane bırakabilir. Limonu/kireci elinizle sıkarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Çeşitli plastik ve metal sıkacakları (özellikle elle tutulan tip), limon/kireç suyuna çok fazla kabuk yağı koyar. Bu yüzden limonu/kireci elinizle sıkın. Bununla, limonu/kireçleri ortadan ikiye kesin, yarısını elinize alın ve ihtiyacınız olan miktarda damlayı nazikçe sıkın. Dozunuz için ihtiyacınız olan damla miktarı için damlaları düştükçe sayın.

Ü Asla askorbik asit veya hidroflorik asit kullanmayın; çünkü askorbik asit MMS'i nötralize edecek ve hidroflorik asit son derece zehirlidir.

Ü Bu kitap boyunca aktivatör olarak %50 sitrik asit kullanılmasını öneriyoruz. Bu, MMS formüllerinde yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. Ancak %33 veya %35 sitrik asit kullananlar da var. Farklı yüzdelerdeki mevcudiyet ülkeden ülkeye değişir. Bu yüzdeler, bir MMS1 dozunu karıştırmak için de kullanılabilir. Bu yüzdelerde (%33 ve %35 sitrik asit) ayrıca MMS ile 1'e 1 damla oranı kullanır ve aktivasyon süresi için 30 saniye beklersiniz.

Machine Translated by Google

Temel Bir MMS Dozunu Karıştırma1

Bu kitapta çeşitli protokoller tartışılmaktadır. Bunlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen sayıda damla kullanır. Burada sadece temel karıştırma kavramını tartışacağız.

Aşama 1

q Daima boş, temiz, kuru bir bardak kullanın.

q Camı hafifçe yana eğin ve MMS damlalarınızı bardağın alt kısmının köşesine gidecek şekilde bırakın. Damlaları düşürürken damlalık şişesini veya pipeti (damlalık) daima yukarı ve aşağı doğru tutun.

q %50 sitrik asit solüsyonu veya %4 HCl solüsyonu kullanıyorsanız, MMS damlalarının üzerine aynı miktarda aktivatör ekleyin. (Her MMS damlası için 1 damla asit ekleyin.)

Adım 2

q 30 saniyeye kadar sayarken damlaları biraz döndürün; bu süre içinde karışım kehribar rengine dönmelidir.

Aşama 3

q Ardından, 41-45. sayfalardaki talimatlara göre 1/2 bardak (4 ons/120 ml) içme suyu veya meyve suyu veya başka bir sıvı ekleyin.

q Dozunuzu tazeyken, birden az dakika.

Machine Translated by Google

Temel Bir MMS Dozunu Karıştırma1



Machine Translated by Google

Dikkatli olun: MMS ve aktivatör karıştırıldığında ve kapalı bir kapta olmadığında bir miktar klor dioksit gazının çıkması muhtemeldir.

Doğrudan kokusunu almaktan kaçınmak en iyisidir. Dozunuzu doğrudan burnunuzun veya ağzınızın altında karıştırmayın. Gazı küçük miktarlarda solumanın istendiği ve akciğerler ve sinüsler için çok iyileştirici olabileceği zamanlar vardır, ancak bunu gerektiren belirli bir protokole tabi değilseniz ve ne yaptığınızı bilmiyorsanız (çünkü kolay olduğu için) bundan kaçının. çok fazla nefes almak).

Saatlik Dozlar

İlk kitabımı yazdığımda, insanlara her gün 3 büyük dozda MMS1 kullanmaları talimatını vermiştim. İlk kitabımı ya da o kitaptan bilgi veren birkaç rastgele web sitesinden herhangi birini okuduysanız ve ne yazık ki güncellemediyseniz, o zaman yeni bir şeyler öğrenmenin zamanı geldi. Başlangıçta, daha büyük dozu önerdiğimde, her zaman insanların her seferinde biraz çalışmasını sağladım . O zamanlar öneri, günde 3 kez alınan 15 damla doza kadar çalışmaktı.

Eski yöntemin dezavantajı, birçok insanın oldukça güçlü bir Herxheimer tepkisi göstermesiydi. İyileşmeden önce çok daha kötü hissedeceklerdi. Zamanla ve daha fazla deneyim kazandıkça, gün boyunca daha küçük dozlarda MMS1 almanın daha iyi sonuçlar getirdiğini fark etmeye başladım. Bunun belki de en önemli nedeni, MMS1'in sisteminizde sadece bir saat, belki de en fazla bir buçuk saat sürmesidir. Bu nedenle, MMS1'in sisteminizde saatlik olarak çalışmasını sağlamak zorunludur. Bu şekilde MMS1, patojenleri sürekli olarak vurur ve patojenlerin yeniden gruplanıp yeniden birikmesine izin vermez. Bunun yerine, yeniden bir araya gelme şansı olmadan sürekli vuruldukları için ölürler. Bu yeni yöntem işe yarıyor ve açıkça olumlu sonuçlar görüyoruz.

Machine Translated by Google

2009 yılında güneydoğu Afrika'da küçük bir ülke olan Malavi'ye gittim. Oradayken bana 800 HIV/AIDS vakası geldi.
Bu insanlar üç hafta boyunca günde sekiz saat, her saat başı sadece 3 damla MMS1 aldı. Bil bakalım ne oldu? 21 gün boyunca günde sekiz saat alınan 3 damlalık dozlar, HIV/AIDS'i yok etmede %99 etkiliydi. 800 vakadan sadece beşi başarısızlıkla sonuçlandı ve bu beş vakadan talimatlar şu ya da bu şekilde gerektiği gibi izlenmedi.

O zamandan beri yüzbinlerce insan saatte 3 damla doz alarak sağlığına kavuştu. Daha az sıklıkla kullanılan büyük dozların aksine, daha küçük saatlik dozlardaki bu değişiklik, muhtemelen daha önceki talimatlardaki en büyük gelişmeyi temsil etmektedir.

Özetlemek gerekirse, yılların deneyiminden sonra, çoğu hastalığın (sıtma dışında), günlük sekiz ila on saatlik bir süreye yayılan saatlik MMS1 dozlarına önemli ölçüde daha duyarlı olduğunu öğrendik. Bu, günde 1, 2 veya 3 büyük dozdan daha etkilidir. Bu kanser ve çoğu hastalık için geçerlidir. İnsanlar son yıllarda inanılmaz bir başarı ile saatlik protokolleri kullanıyorlar. Protokol 6 ve 6 (bkz. sayfa 169) ve bazı Acil Durum Protokolleri (bkz. Bölüm 12) gibi sıtma dışında saatlik doz kuralının birkaç istisnası daha vardır.

Tekrarlamak gerekirse: Lütfen her biri 15 damla olmak üzere 3 büyük dozdan bahseden talimatları takip etmeyin.
(Yukarıda belirtildiği gibi kuralın bir istisnası olmadığı sürece.)

Ardışık Dozların Önemi

Dozunuzu her saat başı art arda almaya özen gösterin. Örneğin, sekiz saatlik bir protokoldeyken, dört saat gibi dozlama saatlerinizi bölmeyin.

Machine Translated by Google

sabah, sonra üç saat ara, ardından gün içinde dört saat daha.

> MMS'nin temel bir ilkesi, patojenlere her saat başı vurmak, patojenlere yeniden gruplanma ve yeniden inşa etme zamanı vermemesi, bunun yerine, yeniden gruplanma şansı olmadan sürekli olarak vurularak ölmeleridir.

Günlük Doz Şişesi

Son yıllarda günlük doz şişesi kullanımını öğrettik . Bu şişenin ana ilham kaynağı, insanların saatlik dozlarını almalarını kolaylaştırmaktı. Bununla birlikte, o zamandan beri , her saatlik doz taze yapıldığında MMS1 almanın maksimum yararının elde edildiği sonucuna vardık. Bu fenomen ilk olarak, günlük doz şişesini geniş bir süre boyunca kullanan binlerce otistik çocukta fark edildi. Daha sonra, çocuklar ayrı ayrı ve her saat taze olarak hazırlanan dozlara geçtiğinde, dozlarının tüm gün boyunca bir şişede karıştırılmasından çok daha fazla gelişme rapor edildi.

20 yıllık MMS ile çalışma ve binlerce kişiye kişisel olarak yardım etmemde, bireysel olarak karıştırılmış taze MMS1 dozları kullanıldığında sağlığın iyileşmesinde genel olarak daha büyük sonuçlar olduğunu fark ettim. Ayrıca, dünya çapında MMS ile yoğun bir şekilde ve çok sayıda (binlerce) çalışan çok aktif Sağlık Bakanlarımız da aynı sonuçları bildirdiler.

Çeşitli nedenlerle, her bir dozu her saat taze karıştırmak yerine tüm gün boyunca bir karışım oluşturmaktan başka bir seçenek yoksa, kesinlikle harcadığınız zamana değer ve hiç MMS almamaktan daha iyidir. Ama benim tavsiyem, eğer

Machine Translated by Google

mümkünse, taze saatlik dozları karıştırmaya devam edin. Çok daha hızlı iyileşmek için daha büyük bir şansınız olacak.

Not: Günlük doz şişesi, gün için tüm MMS1 dozlarınızı, her saat belirli bir miktarda içeceğiniz tek bir şişede karıştırmayı gerektirir. Örneğin, Protokol 1000'deyseniz, art arda sekiz saat boyunca her saat başı 3 damlalık bir MMS1 dozu (maksimum 3 damladır - daha azıyla başlarsınız) almayı gerektirir. Günlük bir şişe yapıyorsanız, 24 damla MMS'i etkinleştirirsiniz ve damlaları 1 litre/litrelik bir şişe arıtılmış suya eklersiniz. Şişeden 4 ons içerseniz, 3 damla dozunuz olur.

Yeni bir saatlik MMS1 dozunun oluşturulmasının zor ve imkansız görünmesinin birçok nedeni olabilir. Belki birinin çok araba kullandığı bir işi vardır.
Sürüş sırasında bir dozu karıştırmak kolay değil, tavsiye etmiyorum. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki insanlardan önemli geri bildirimler alarak, bir iradenin olduğu yerde bir yol olduğunu buldum. Sağlığınızın, saatlik dozlarınızı karıştırmanın bir yolunu bulmak için harcadığınız çabaya değer olduğunu düşünün. MMS ve aktivatör asit şişelerinizi bir Ziploc çantasında taşımak kadar basit olabilir.

İpuçları

Ü Hareket halindeyken, çantanızda veya cebinizde taşımak için 1/2 ons (15 ml) büyüklüğünde küçük MMS şişeleri ve asit aktivatörü bulundurmak isteyebilirsiniz. (Bunlar gerektiğinde evdeki daha büyük şişelerinizden yeniden doldurulabilir.)

Ü Hareket halindeyseniz ve kendinizi ofiste, arabada, toplantılarda, trafiğe takılmış durumda vb. bulursanız, MMS sarf malzemelerinizi elinizin altında ve birlikte gitmeye hazır tutmak için küçük bir taşınabilir kese veya öğle yemeği çantası satın alın. her zaman yardımcı olabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan MMS şişeleriniz ve asit aktivatörünüz, 4 ons/120 ml büyüklüğünde küçük bir bardak ve bir veya iki şişe arıtılmış su. Kural olarak,

Machine Translated by Google

Dozlarınızı plastik kaplarda karıştırıp içmenizi tavsiye etmiyorum, cam tercih edilir. Ancak hareket halindeyseniz, 4 ons/120 ml boyutunda küçük tek kullanımlık plastik bardakları yanınıza almanız uygun olabilir. Bu her zaman kullandığınız şey olmaz, ancak hareket halindeyken yardımcı olabilir.

Ü Yukarıdakilerin hepsini yapmak hala uygun değilse ve kendinizi dozunuzu karıştırmayı bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda buluyorsanız , istisnadan ziyade bir kural olarak tüm gün dozlu bir şişe kullanmaya yenik düşmeye bir alternatif , başka seçeneğin olmadığı saatler için yalnızca dozları önceden karıştırmak olacaktır.

Örneğin, bir öğretmen olduğunuzu ve sınıfınızın önünde iki veya üç saat ayakta durmanız gerektiğini söyleyin. Bu süre zarfında bir dozu karıştırmak için kendinize izin veremeyeceğinizi önceden biliyorsunuz. Bu durumda 2 veya 3 dozu önceden bir şişede karıştırın. Yeni bir doz karıştırmak için kayıp gidemediğiniz süre boyunca o şişeden saatlik dozunuzu için. Hemen hemen her durumda , elinizde bir su şişesi bulundurmak kabul edilebilir. Ardından, mümkün olduğunda, taze saatlik dozlarınızı karıştırmaya geri dönün. Bu, protokollerin 8 veya 10 saatlik döngüsünü bozmadan ardışık saatlik dozlarla devam edebilmesine yardımcı olur. Tüm MMS1 dozları genellikle 120 ml su (veya diğer uyumlu sıvı) içinde alınır. 120 ml'lik 4 ons şişe bulmaya çalışın ve ihtiyacınız olacak doz miktarını ayrı şişelerde önceden karıştırın. Veya, iki saatlik önceden karıştırılmış doza ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, 8 ons/240 ml'lik bir şişe veya üç saat boyunca 12 ons/360 ml'lik bir şişe yeterli olacaktır. Şişenizi 120 ml'lik bölümlerde işaretlemek için silinmez bir işaretleme kalemi kullanmak isteyebilirsiniz. Sizin için en iyi olanı bulun.

Bu yöntem, önceden hazırlanmış doz şişesi ile taze saatlik dozların karıştırılmasının bir kombinasyonudur. Unutmayın, taze karışık dozlar en iyisidir, ancak önceden hazırlanmış taze dozlar ve dozların bu kombinasyonuna başvurun.

Machine Translated by Google

bir şişede, başka seçenek olmadığında. Ardışık saatlik dozları takip etmek önemlidir.

MMS'inizin İyi Olduğunu Test Etme

MMS'i etkinleştirirken, MMS damlalarının ve aktivatörün ilk 30 saniye içinde kehribar rengine dönmesi çok önemlidir. Bu kitapta kehribar dediğimiz zaman, halka kahverengi bir renge atıfta bulunuyoruz. Bu, açıktan koyu kahverengiye kadar herhangi bir yerde olabilir, ancak sarı olamaz. MMS ile aktive edilen su eklemeden önce düşen kehribar rengi, ışığa tutulduğunda bir cam kehribar şişenin (uçucu yağlar, çeşitli tıbbi iksirler veya bira şişeleri için kullanıldığı gibi) rengine çok benzer.

Bu testi yapmak için 3 damlalık bir MMS1 dozunu karıştırın, daha az damla kullanırsanız rengi yeterince değerlendirmek zor olacaktır. Bu testi iyi aydınlatılmış bir odada yapmak en iyisidir. Damlalarınızı karıştırdıktan sonra (su eklemeden önce), bardağı beyaz veya açık renkli bir arka plana karşı tutun ve bardağın yan ve alt kısmından (damlalarınızın olduğu yere) gözlerinizle cam hizasında bakın; bu açıda damla karışımınıza bakıyor olacaksınız. Camın içine bakarsanız , damlalar genellikle daha açık sarı görünür, ancak damlaları göz hizasında (iyi aydınlatma ile) görürseniz daha koyu bir gölge, yani kehribar görmelisiniz. Karanlığa dönüşmesine rağmen şeffaf olması da gerekir (transparan). Damlalar kehribar renginde görünmelidir. Kehribar rengi solacak ve yaklaşık 15 dakika içinde açık sarı olacaktır. Çözeltinin etkisini kaybedeceğinden, tüketmeden önce bir dakikadan fazla oturmasına izin vermeyin.

Kehribar rengi damla karışımının doğru olduğunun önemli bir göstergesidir. İki berrak sıvıyı, MMS'i ve bir etkinleştiriciyi karıştırıyorsunuz. Sıvılar talimatlara göre karıştırılırsa renk değiştirir ve kehribar rengine döner. Bu kehribar rengi, doğru sıvılara sahip olduğunuzu gösterir.

Machine Translated by Google

ve doğru bir karışım. Çok az iki berrak sıvı aynı rengi üretebilir.

Damlalarınız karıştırdıktan sonraki ilk 30 saniye içinde kehribar rengine dönmezse, MMS'nizde ve/veya asidinizde bir sorun vardır ve bu karışım istenen sonuçları vermeyebilir. Doğru yaptığınızdan emin olmak için bir dozu bir kez daha karıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak kehribar rengi değil de açık sarı alıyorsanız, iyi bir MMS almaya çalışırken bu damlaları şimdilik kullanabilirsiniz. asit aktivatörü. Ancak bu solüsyonu (açık sarı, kehribar değil, damla) bir haftadan fazla kullanmamanızı öneririm. Çözelti en azından sararmazsa, hiç kullanmayın.

Kullandığınız camın türü, başlamak için camın tamamen kuru olduğundan emin olmak, karıştırdığınız damla sayısı, duvarın arka plan rengi, zaman gibi çeşitli faktörler damlaların rengine etki edebilir. gün ve odada ne kadar doğal ışık olduğu vb.

Doğru rengi alamıyorsanız ve talimatları doğru uyguladığınızdan eminseniz, damlaları farklı koşullarda birkaç kez karıştırmayı deneyin. Örneğin, farklı bir bardak kullanın (bazı cam kaliteleri bozulur), camın yeterince temiz olduğundan emin olun; bulaşık deterjanı kalıntısı olmadığından emin olun.
Rengi test ederken damlalarınızı beyaz bir duvara, beyaz bir buzdolabına veya açık bir arka plana karşı tutun. Renk konusunda şüpheniz varsa, test ederken 6 damlalık bir dozu karıştırın. Damlalarınızın yetersiz olup olmadığını belirlemeden önce damlalarınızı çeşitli koşullar altında test edin.

Not: MMS ile 1'e 5 damla oranında limon, misket limonu veya sirke gibi alternatif bir asit kullanıyorsanız damlalarınızın rengi kehribar rengine dönüşmez. Bu durumda, MMS'in iyi olduğunu test etmek istiyorsanız, 3 damla MMS1 dozunu karıştırın (3 damla MMS ve 15 damla limon, misket limonu veya sirke olur) ve üç dakika bekleyin. Sonra Ekle

Machine Translated by Google

1/2 bardak (4 ons/120 ml) su ve 25 ppm olması gereken ppm'yi test edin. (ppm'yi test etmek için, bkz. sayfa 278.)

Su—Bir MMS1 Dozunu Karıştırmak İçin İdeal Sıvı

Ü İdeal olan, MMS1 dozunuzu sadece suda almaktır.
MMS1 dozları 1/2 bardak su (bu 4 ons veya 120 ml'dir) veya maden suyu içinde alınmalıdır. Çocukların genellikle yarım bardaktan daha az suya ihtiyacı vardır. Bir çocuk 1 damla MMS1 veya daha az aldığında 1/4 fincan sıvı kullanmalıdır.

Ü MMS1 içme (arıtılmış) su ile alınmalıdır - Klor, florür veya diğer toksinler eklenmiş suya asla dokunmayın , çünkü bunlar MMS1'in etkinliğini iptal eder ve hatta sizi hasta edebilir. Genellikle şişelenmiş su satın almak en iyisidir. Unutmayın, tüm şişelenmiş sular eşit yaratılmamıştır. Şişelenmiş olduğu için otomatik olarak musluk suyundan daha güvenli, temiz veya saf olduğunu varsaymayın. Bazı şişelenmiş sular florür, klor veya diğer zararlı maddeler içerir. Bu yüzden su kaynağınızı kontrol edin. Ne elde ettiğinizi öğrenmek için etiketleri okuyun ve/veya üreticilere danışın. Damıtılmış su veya ters ozmoz suyu da kullanılabilir.

Dikkat: Lütfen dünyadaki çoğu yerde su arıtıcı olarak toksik bir klor türü kullandığını unutmayın. Bundan daha da kötüsü, birçok yer suya aşırı derecede zehirli florür ekliyor çünkü ne yazık ki yaklaşık 50 yıl önce doktorlar halkı florürün dişlere yardımcı olduğuna ikna etti.

Florür, insanoğlunun bildiği en zehirli kimyasallardan biridir. Kişinin dişlerine yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur ve sonuç olarak dişlerinde leke olan yüz binlerce genç vardır. Suyunuzu saf bir su kaynağından veya kuyudan almadığınız veya ters ozmoz su filtreniz yoksa, bu protokoller için kaliteli bir şişelenmiş içme suyu kullanın. Damıtılmış su da kullanılabilir.

Machine Translated by Google

Tat Faktörü/MMS1'in Tadı Nasıl İyileştirilir

Ü MMS1 dozlarının tadı neden bazı insanlar için son derece kötü? Bazı kişilerin bir MMS protokolü üzerindeyken şu veya bu zamanda MMS1 almaya aşırı derecede tiksindiklerini fark ettik. Bazen o kadar kötüleşir ki insanlar artık dayanamaz. Bence bir açıklaması olabilir. Muhtemelen patojenler, ilgili kişinin onları yok edebilecek her şeyi almaya devam etmesini önlemek için patojenler için bir hayatta kalma mekanizması olarak MMS1'e karşı isteksizlik yaratır. Her halükarda, bu size olursa, MMS1 alma isteksizliğinin üstesinden gelmek ve denemek için elinizden geleni yapmak için harcadığınız zamana değer. Olumlu bir tutumu korumaya çalışmak yardımcı olabilir, ardından tat sorununun üstesinden gelmek için aşağıda belirtilen şeylerden birini veya birkaçını deneyin.

Ü Birçok kişi, %4 HC1 (hidroklorik asit) ile aktive edilen MMS1 dozlarının, %50 sitrik asit ile aktive edilenlere göre daha iyi tat verdiği konusunda hemfikirdir. Sitrik asit kullanıyorsanız ve tadı rahatsız ediyorsa HCl'ye geçmeyi deneyin. Bu gerçekten kişisel bir mesele— sizin için en iyisinin ne olduğunu görün.

Ü Su ideal olsa da, tadı sizi rahatsız ettiği için MMS1'i yalnızca suyla alamıyorsanız, bazı (tümü değil) doğal meyve suları, zararlı koruyucular ve/veya C vitamini veya askorbik asit eklenmemişse kullanılabilir. çünkü bu, MMS1'in etkinliğini iptal edecektir. Taze meyve suyu en iyisidir. Elma, üzüm ve kızılcık suyunun MMS1 ile iyi çalıştığını gördük, ancak yine de doğal olmalı, koruyucu içermemeli ve ilave C Vitamini (veya askorbik asit) içermemelidir. MMS1 ile hiçbir şekilde portakal veya mandalina suyu kullanmayın. Bu meyve sularını gün için MMS1 protokolünüzden en az iki saat önce veya sonra alabilirsiniz.

Ü Birçok çay MMS ile uyumlu değildir. Bununla birlikte, uyumlu olan bazı bitki çayları vardır. Bu, kullandığınız çaya, yani taze çaya bağlı olarak değişebilir.

Machine Translated by Google

bitki veya muhtemelen bir tür kirletici ile bağlanmış bir çay poşeti . Neyin uyumlu olduğundan emin olmak için 278. sayfada açıklanan test şeridi yöntemini kullanın.

Ü Bazı gazlı içecekler MMS1 ile iyi çalışır: Coke, Pepsi, Sprite, 7-Up ve Canada Dry Ginger Ale (yalnızca orijinal formülleri kullanın; Diet Soda veya "Light" veya "Zero" kullanmayın). Bu içecekleri uzun vadede veya Protokol 1000 için (şeker içeriği nedeniyle) günde 8 kez içeceğiniz için önermiyoruz. Gazlı maden suyunu şekersiz olduğu için daha iyi bir seçim olarak öneririm. Bununla birlikte, tadı bir sorunsa, ciddi şekilde hasta olan biri için soda içinde bir MMS1 dozu almak, hiç almamaktan daha iyidir. Dozunuzu 4 ons/120 ml büyüklüğünde bir kapta karıştırabilir ve örneğin 1 ons Pepsi ve kalan suyu ekleyebilirsiniz - bu, MMS'in tadını kapatmak için yeterli soda olabilir. Ancak birçok durumda tek başına (gazlı ve şekersiz) maden suyu tadın üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Not: Bu içecekleri MMS ile birçok kez bizzat test etmiş olmama rağmen, soda şirketlerinin zaman zaman formüllerini değiştirme eğiliminde oldukları ve genellikle ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği dikkatimi çekti. İçeceğinizin MMS1 ile uyumlu olup olmadığını anlamanın en güvenli yolu, içeceği bir klor dioksit test şeridi ile test etmektir. (LaMotte Company tarafından üretilen bu test çubukları ve bunların MMS1 ve çeşitli sıvılarla uyumluluğunu test etmek için nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için sayfa 278'e bakın.) Test çubukları mevcut değilse ve bir kişi belirli bir meşrubat kullanan bir protokoldeyse veya karıştırıcı olarak şişelenmiş meyve suyu, ancak beş veya altı gün sonra sonuç alamıyorsanız, dozunuzu içmek için başka bir sıvıya geçmenizi şiddetle tavsiye ederim.

Ü Kokunun tat üzerinde büyük etkisi olabilir. MMS1'in tadını yiyemediğinizi fark ederseniz, dozunuzu içme şeklinizi değiştirmeyi deneyin. Bazı insanlar dozlarını içerken aslında burnunu tutarlar. Geniş ağızlı bir şişenin aksine küçük ağızlı bir şişe veya bardak harikalar yaratabilir. kullanma

Machine Translated by Google

küçük ağızlı bir şişe, burnunuzun klor dioksit (ClO_2) dışarı gaz veren kabın içine girmesine izin vermez.
Bardaklar ve şişeler tüm şekil ve boyutlarda gelir. Yaratıcı olun! Beklentileri yüksek tutun; boş bir meyve suyu şişesi veya başka bir ürün kavanozu işinize yarayabilir. Sizin için neyin doğru olduğunu araştırın.

Ü MMS1 ile karıştırmak için bu kitapta bahsedilenler dışında çeşitli meyve suları veya gazlı içecekler kullanmak isterseniz, kural olarak MMS ile uyumluluğu test etmek iyi bir fikirdir. Bu bölümde daha önce bahsedilen test şeridini kullanın (sayfa 278'deki talimatlara bakın).

Ü Bazı insanlar MMS1 içeceklerinin tadını iyileştirmek için stevia kullanılmasını önerdiler. Stevia'nın kalitesinin değiştiğini bulduk. Bazıları yüksek oranda işlenir ve bazı markalar/türler MMS1'in etkinliğini iptal eder. Stevia kullanmak istiyorsanız, kullandığınız türün MMS1 ile uyumlu olup olmadığını doğrulamak için test şeritleri (bkz. sayfa 278) kullanmanızı öneririz. (SweafLeaf® adlı bir şirket sıvı stevia yapar ve aromasız sade SteviaClear® damlaları MMS1 ile uyumludur. SweetLeaf® stevia'nın çeşitli tatlarını kullanmak isterseniz, MMS1 ile uyumlu olduğundan emin olmak için yine test şeritlerini kullanın— uyumluluk aromadan aromaya değişebilir.)

Ü Kendimiz arıtılmış su ve biraz bal ile bir sürahi hazırladık ve gün boyunca MMS1 içecekleri ile karıştırmak için buzdolabında sakladık. Bu, tadı bazı insanların beğenisine yardımcı oldu. Bununla birlikte, birçok farklı kalite ve bal türü olduğu için (ve bazı ballar oldukça karıştırılmıştır) yine, yapılacak en güvenli şeyin içeceğinizi ballı suyla test etmek olduğunu öneriyoruz. Kullandığınız bal türünün MMS1 ile uyumlu olduğundan emin olmak için test şeridi yöntemini kullanın.

Machine Translated by Google

Ü MMS1 dozunun tadını iyileştirmenin bir başka yolu da her dozda soğuk su kullanmaktır. Bunun için buzdolabında bir şişe arıtılmış su tutmanız yeterlidir.

Ü MMS1 ile ne karıştırmayı seçerseniz seçin, karıştırmaya başladığınız andan itibaren 60 saniyeyi geçmeyecek şekilde hemen içmeye çalışın.

Bir Kapsülde MMS1 (Tadı Ortadan Kaldırmak İçin)

Tadı ortadan kaldırmaya yardımcı olan MMS1 damlalarını almanın bir başka yöntemi de sebze veya jel kapsül kullanmaktır.

Aşama 1

q Sarf malzemelerinizi hazır bulundurun. Bu yöntem için damlalarınıza ek olarak boş kapsüllere ve bir göz damlalığına ve bunları etkinleştirmek için temiz, kuru bir bardağa ihtiyacınız olacak. Kapsülünüzü hazırlandıktan hemen sonra alabilmek için yakınınızda içme suyuna da ihtiyacınız olacaktır. Aldığınız doz için kullanılacak uygun boyuttaki kapsüller için sayfa 46'daki tabloya bakın.

Adım 2

q Bir bardaktaki dozunuz için doğru miktarda damlayı etkinleştirin ve 30 saniye sayın.

q Göz damlasını hemen alın, etkinleşen damlaları camdan emerek dikkatlice kapsülün içine koyun.

q Kapsül kapağını iterek kapatın ve yerine tam oturduğunu iki kez kontrol edin.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Kapsülü en az 1/2 fincan (4
ons/120 ml) hemen su. Beklemeyin
kapsülü doldurduktan sonra, damlalar düşmeye başlayacağından
eritin.

Notlar

Ü Kapsül içindeki MMS'i etkinleştirmeyin.
Kapsülün küçük alanı içinde üretilen basınç
aktivasyon işlemi sırasında kapsülün
yutarken dağılın. Bu yüzden her zaman etkinleştirdiğinizden emin olun
damlaları temiz bir bardağa koyun ve 30 saniye önce sayın.
aktive edilmiş damlaları kapsülün içine koyarak.

Ü İhtiyaç duyacağınız kapsül boyutu, doz boyutuna bağlıdır.
almak istiyorsun. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
bir kapsül içine koymak için 3 damlalık bir doz hazırlıyorsanız,
aslında damla sayısının iki katı olmalı, çünkü her doz
%50 sitrik asitten eşit damlalarla aktive edilebilir
damlalar veya %4 HCl damlaları.

MMS1 Kapsül Boyutu ve Dozu	
Kapsül Boyutu	Toplam Düşüş
Boyut 4: 3 damlalık bir doz tutar	toplam 6 damla
Boyut 3: 4 damlalık bir doz tutar	toplam 8 damla
Boyut 2: 5 damlalık bir doz tutar	toplam 10 damla
Boyut 1: 6 damlalık bir doz tutar	toplam 12 damla
Boyut 0: 7 damlalık bir doz tutar	toplam 14 damla



Machine Translated by Google

Ü Kapsül sayısı küçüldükçe, kapsüllerin boyutlarının gerçekten büyüdüğünü unutmayın. Mümkünse, alacağınız doz boyutuna en yakın kapsül boyutunu kullanın. Herhangi bir boyutta doz almak için #0 boyutunda bir kapsül (büyük boy) kullanabilirsiniz, ancak birçok kişi #0 kapsülleri kolayca yutamaz. Dozunuzdaki damla miktarına karşılık gelen büyüklükteki kapsülü kullanmak en iyisidir.

Ü Kapsülleri veya hapları yutmakta zorluk çekiyorsanız, bu yöntem muhtemelen sizin için iyi bir fikir değildir. Ayrıca küçük çocuklar için önerilmez.

Sadece Bir Damla Daha Alamıyorum

Burada, birinin bir damla MMS daha alamayacağını hissettiği bir senaryoyu ele almak istiyorum. Belki bir süredir bir protokol üzerindedirler ve kendilerini o kadar iyi hissetmedikleri bir noktaya ulaşırlar (bunun nedeni muhtemelen vücutta bir toksin dalgasının salınması ve hasta hissetmesine neden olmasıdır). Ya da belki hiç MMS1 almıyorlardı ama şu ya da bu nedenle hastalanıyorlar ve kendilerini o kadar hasta hissediyorlar ki MMS1'i midelerine indiremiyorlar.

Burada son 20 yılda gözlemlediğim önemli bir süreç var ve bu, kişinin vücudunun MMS'e karşı kötü tadın çok ötesine geçen bir tiksinti geliştirebileceğidir. Tekrar tekrar gördüm. Patojenler tarafından yaratıldığına inanıyorum. Bunu hastalığı koruyan bir tür hayatta kalma mekanizması olarak düşünün.

Hastalık, kişinin yediği veya aldığı bir şeyin onu yok edebileceğini algıladığında, hastalığın kendisi, onu etkileyecek maddeye (bu durumda MMS1) kişide bir tiksinti yaratan bir sinyal gönderir. Bu tiksinti, kişi MMS1 almayı düşündüğünde bile başlayabilir. Bu olduğunda, ne yapabilirler?

Machine Translated by Google

Yatakta hastaysanız ve kendinizi çok kötü hissediyorsanız veya MMS1 alırken durum gelişirse ve bir damla daha içme fikrini artık kaldıramayacak hale gelirseniz, aşağıdaki prosedür yardımcı olabilir.

Buradaki ilke, MMS1'i hep birlikte almayı bırakmak istememenizdir. Saatlik olarak alınan çok, çok az miktarda MMS1 gibi görünen şeyler bile vücuttaki patojenlerden kurtulmaya ve sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. MMS1'i belirli bir süre "ele almak" için dozunuzu saatte 1 damlanın altına düşürmeniz gerekebilir.

Bazıları, alımlarını 1/2 damla, 1/4 damla, 1/8 damla ve aşırı durumlarda saatte 1/16 damlaya düşürmek zorunda kaldı. Fikir şu: Vazgeçmeyin! Saatlik küçük bir parça MMS bile vücudunuzun sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Talimatlar

Aşama 1

q 1/4 damla dozun nasıl hazırlanacağına ilişkin talimatlar için lütfen Başlatma Prosedürüne (bkz. sayfa 79) bakın.
1/4 damlalık bir doz hazırladıktan sonra, 1/8 damlalık bir doz yapmak için bunun 1/2'sini alabilirsiniz. Veya 1/16 damlalık bir doz yapmak için 1/4 damla dozun 1/4'ünü alın. Seçtiğiniz küçük dozu birkaç saat veya bir veya iki gün boyunca hazırlayın ve alın.

Adım 2

q Küçük miktarı rahatça aldıktan sonra, saatlik dozu yavaşça artırmaya başlayın. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir hızda yavaşça artırın.

q Yavaşça artırmaya devam edin veya düşük kalın. Bazı insanlar 1/4 damla doza kadar çıkabilir ve sonra devam edebilir.

Machine Translated by Google

dozlarını istikrarlı bir şekilde artırmak için. Ancak, çeşitli nedenlerle MMS alımlarını oldukça küçük bir miktarın üzerine çıkaramayanlar var, ancak düşük dozla iyileşebiliyorlar. Bu, Bölüm 5, Sağlığı İyileştirme Planı (HRP) ve Bölüm 6, Temel Protokoller'de daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Not: Bir protokolde bulunmadıysanız ve halihazırda DMSO almıyorsanız, ancak yatakta olacak kadar yeni hastalandıysanız ve kendinizi oldukça kötü hissediyorsanız, bu noktada DMSO'yu MMS1 ile kullanmaya çalışmayın, aksi takdirde DMSO'yu yaptığınız bir protokolde zaten kullanıyorsunuz.
(Hiçbir şey almak istemeyecek kadar hasta hissettiğinizde, her seferinde bir şey almaya çalışmak en iyisidir. Olduğu gibi almak için çaba sarf ettiğiniz MMS1'e DMSO eklendi, DMSO'yu eklemeden önce, önce MMS1'i almaya dayanıklılığınızı artırmaya çalışın.) 1 damladan daha az doz alırken DMSO'yu kullanmaya çalışmayın.

MMS depolama

MMS'yi (suda %22.4 sodyum klorit) saklamanın en iyi yolu, sıkı plastik (metal değil) kapaklı kehribar veya yeşil cam şişelerde ve buzdolabındadır. Bu idealdir, ancak her zaman mümkün değildir. Amber veya yeşil cam şişeler yoksa, şeffaf bir şişe yeterli olacaktır, ancak onu ışıktan uzak tutmaya çalışın (bir buzdolabı kapalıyken karanlıktır).
Buzdolabında yer yoksa serin ve karanlık bir yer yeterli olacaktır. Cam şişe yoksa plastik kapaklı plastik şişeler işinizi görecektir ancak şişenin alt kısmında üçgen içinde 1 veya 2 numaralı şişeleri bulmaya çalışın. Bu daha kaliteli bir plastik anlamına gelir. (Üçgende #3 ile sınıflandırılan plastiklerin kullanılması tavsiye edilmez.) Plastik kapaklı şişelerin kullanılması sodyum klorit (ve aynı zamanda klor dioksit) sonunda metal bir kapağı çözecektir.

Machine Translated by Google

Hasta hissetmek

MMS1 alırken mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı yorgunluk oluşursa (bkz. Herxheimer reaksiyonu sayfa 6) dozu hemen yarıya kadar azaltın, ancak semptomlar baş edilemeyecek kadar fazla değilse MMS1 almayı bırakmayın . Bu durumda, durum düzelene kadar tamamen durun. Semptomlar ortadan kalktığında, semptomlar ortaya çıkmadan önce aldığınız miktarın yarısı ile tekrar başlayın. Miktarı yarıya indirirseniz ve yukarıda belirtilen reaksiyonlar devam ederse, yarı yarıya azaltın. MMS1'den hastalığa neden olmadan alabileceğiniz miktarı bulana kadar MMS1 alımınızı kademeli olarak azaltın. Saatlik olarak çok az miktarda MMS1 bile size yardımcı olacaktır, bu nedenle fikir, mümkünse hep birlikte bırakmamaya çalışmaktır. Tahammül edebileceğiniz rahat bir MMS1 miktarı bulduğunuzda, bir ila iki gün boyunca buna bağlı kalın ve ardından üzerinde bulunduğunuz protokol için uygun miktara ulaşana kadar alımınızı yavaş yavaş artırmaya çalışın.

Not: %50 sitrik asit kullanıyorsanız ve kendinizi kötü hissediyorsanız, bunun yerine %4 HCl deneyin. Bazı insanlar sitrik asidi tolere edemez.

Hamile Kadınlar ve MMS

Binlerce hamile kadın, gerektiğinde sağlıklarını korumak için MMS1'i kullandı. Hamile bir kadın için doz, hamile olmadığı zamanki ile tamamen aynıdır. Protokolleri takip edin ve sizin için en iyi dozu belirleyin.
MMS1 bu kitaptaki protokollere göre alındığında vücuda zarar vermez ve bu nedenle hamile kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil tüm insanlar için güvenli kabul edilebilir. (Çocuklar ve bebekler için bu kitapta listelendiği gibi uygun dozajları takip edin - 13. Bölüme bakın.) Herkes kendi sağlık kararlarını vermekten sorumludur.

İsterseniz eğitimli bir sağlık uzmanına danışın.

Machine Translated by Google

MMS Protokollerinde Yemek Yemek

MMS1 dozları yemek zamanlarında alınmamalıdır. Protokoller üzerindeyken, yemeklerinizi dozunuza göre planlamak en iyisidir. Dozunuzu aldığınız andan itibaren MMS1 dozunu ve öğünlerini 20 ila 30 dakika arasında boşluk bırakın. Örneğin, MMS1 dozunuzu sabah 8:00'de alırsanız, kahvaltı sabah 8:20-8:30'da ve bir sonraki dozunuz sabah 9:00'da olabilir. Kahvaltınız nispeten basit ve küçük olmalı ve yemek 10-15 dakikadan uzun sürmemelidir. Aynı şekilde, öğlen 12'de bir MMS1 dozu alırsanız, öğle yemeği 12:30'da olabilir ve bu böyle devam edebilir.

Protokolde olduğunuz saatlerde, çok büyük öğünler yerine daha küçük öğünler ve/veya atıştırmalıklar yemeye çalışmak en iyisidir. (Yanlış anlamayın, MMS1 alırken yiyebilirsiniz, sadece dozlarınızı aldığınız saatlerde daha büyük öğünlerden kaçının.) Bunu yapmanın çeşitli yolları vardır - günlük rutininize göre ayarlayın.

Örneğin, protokolünüze sabahın erken saatlerinde, diyelim ki sabah 8:00'de başlarsanız, sekiz saat sonra, son dozunuzun saati olan 15:00 olur. Bu sekiz saatlik dozlama döneminde daha küçük öğünler veya atıştırmalıklar yediyseniz ve son dozunuzu saat 15:00'te bitirdiyseniz, bu, 17:00 veya sonrasında günün daha büyük öğününü yiyebileceğiniz anlamına gelir.

Bazı insanlar, sabah saatlerinde portakal suyu veya bir fincan kahve veya çay içmek için serbest kalabilmek için dozlarına günün ilerleyen saatlerinde başlamayı tercih ederler (daha fazla bilgi için sayfa 56'ya bakın). Örneğin bir kişi dozlamaya öğleden sonra 3:00'te başlarsa, sekiz saatlik protokoldeyse son dozu saat 22:00'de olacaktır. Bu, 1:00'den önce kahve, çay veya portakal suyunu (MMS1 ve MMS2 ile uyumlu olmayan şeyler) protokolü başlatmadan en az iki saat önce içebilecekleri anlamına gelir. Buradaki fikir, dozunuzu ihtiyaçlarınıza ve programınıza uyacak şekilde ayarlamaktır. Sizin için neyin işe yaradığını görün.

Machine Translated by Google

MMS'in etkinliği, özellikle antioksidanlarda yüksek olan belirli gıdalarla karıştırıldığında iptal edilebilir . MMS'i gerçekte neyin iptal ettiğini görmek için gezegendeki tüm yiyecekleri tamamen kapsamlı bir şekilde incelemek için zamanım veya kaynaklarım olmadı . Yapmış olsam bile, belirli bir yiyeceğin MMS'nin etkinliğini iptal edip etmediğinin denklemine ağırlık verebilecek birçok faktör var. Gıda GDO'lu mu, hangi pestisit var, gıdada ne tür katkı maddeleri var, bunların etkisi olabilir vs. Hayatınızı tehdit eden bir hastalığa yakalanmış çok hastaysanız, diyetinizde bir şeyin olup olmadığından kesinlikle emin olmak için. MMS'i iptal etseniz de etmeseniz de, MMS'in yediğiniz her şeyle uyumluluğunu test etmek için test şeritlerini (bkz. sayfa 278) kullanmanızı önerebilirim. Bu sizin için uygun olabilir veya olmayabilir.

Bir gıdanın sadece antioksidan olarak etiketlenmesi nedeniyle, antioksidanlarda özellikle yüksek olmayabileceğini ve bu nedenle MMS'i mutlaka ortadan kaldıracağı kesin değildir. Neyin MMS ile uyumlu olduğunu ve neyin olmadığını görmek için çok çeşitli gıdalar üzerinde daha fazla test yapmaya ve denemeye devam edeceğiz. Ancak insanlar 20 yıldır MMS alıyor ve çok fazla ayrıntı tanımlanmadan sağlığına kavuşuyor. Bu kitap, MMS alırken nelerden kaçınmanız gerektiği konusunda size bazı yönergeler vermektedir.

Özellikle antioksidanları yüksek olan gıdaları veya takviyeleri almayın. Bunun ötesinde, sizin için neyin işe yarayıp yaramadığını not edin. Protokolde makul bir süre geçtikten sonra MMS ile sonuç alamıyorsanız, diyetinize ciddi bir göz atın ve MMS ile çeliştiğinden şüphelenebileceğiniz bir şeyin elimine edilip edilemeyeceğine bakın. Bir öğünde çok yemek yemeye alışkınsanız, daha az malzeme içeren bir menü tercih edin. Protokolde olduğunuz süre boyunca bir mono diyet (veya en azından kısmi bir mono diyet) uygulamak yardımcı olabilir.

Machine Translated by Google

Özetlemek

- Yemeklerinizle birlikte bir MMS dozu almayın, yiyecek tüketimini ve MMS1 dozunuzu 20-30 dakika arasında boşaltın.

- MMS dozlarınızı gerçekten aldığınız saatlerde, büyük "ziyafet" türlerinde yemek yememeye çalışın, bunun yerine daha küçük öğünler ve/veya atıştırmalıklar yiyin.

- Dozlama saatleriniz sırasında MMS'i nötralize eden şeyler yemeyin veya içmeyin. (Bkz. sayfa 42-45, 56.)

- Makul bir süre sonunda başarılı olamıyorsanız, diyetinizi basitleştirmeyi düşünün. MMS'i iptal ettiğinden şüphelenebilecek şeyleri ortadan kaldırmayı deneyin.

Besin Takviyeleri ve HRP

HRP (Sağlık) yapmanın iki temel nedeni vardır.
Kurtarma Planı—bkz. Bölüm 5):

1. Bir hastalığı ortadan kaldırmak ve sağlığınızı iyileştirmek için.

2. Temizleme amacıyla, vücuttaki zehirlerden detoks yapmak ve böylece hem küçük hem de büyük bir dizi sağlık sorununun giderilmesine yardımcı olabilecek zehirlerden kurtulmak için.

Herhangi bir türden bir hastalığınız varsa, karar basittir. Yapmak istediğiniz şey hastalığı ortadan kaldırmak.

Birisi hasta olduğunda ve özellikle ciddi şekilde hastaysa, kişinin diyet ve yaşam tarzı gibi çeşitli şeyleri durdurması ve incelemesi için iyi bir zamandır. Doğru yemek, doğruyu kullanmak ve doğru yaşamak,

Machine Translated by Google

iyi sağlık. İyi beslenme vücudun iyileşmesi için önemli olsa da, birisi bu kitapta açıklanan protokolleri uyguladığında , bir süre besin takviyesi almaktan kaçınmak aslında yardımcı olabilir. Bunun nedeni, patojenlerin de iyi beslenmeyle beslenmesidir, yani bir anlamda, patojenler hala hayattayken besin takviyesi alıyorsanız, bir elinizle birikiyor ve diğer elinizle yıkıyorsunuz. Ayrıca bazı besin takviyeleri MMS'i nötralize eder.

Bu, özellikle kanser ve bir dizi önemli hastalık için geçerlidir - protokollere başladığınızda, aynı anda ekstra besin takviyelerinin artmasıyla gelişmenin zamanı değildir. Bu durumlarda, duruma bağlı olarak iki ila üç hafta ve muhtemelen birkaç haftaya kadar takviye almayı bırakmanın en iyisi olduğunu öneririm. Çünkü dediğim gibi, kanser hücreleri ve diğer patojenler iyi beslenmeyle beslenebilir. Kanseri veya diğer hastalıkları daha uzun yaşamaya veya çoğalmaya teşvik edecek hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Buradaki fikir, hastalığı aç bırakmak ve öldürmek, daha fazla gelişmesi için vermek değil.

Yukarıda belirtildiği gibi önemli bir hastalığınız varsa, MMS almaya başlarken herhangi bir takviyeyi askıya alın veya başlatmayın - takviyeleri eklemeden önce patojenleri yeterince yok etmesi için zaman tanımaya çalışın. Öte yandan, iyi olduğunu bildiğiniz veya zaten denediğiniz bir tür takviyeye gerçekten ihtiyaç duyuyorsanız, bunları bir noktada eklemek isteyebilirsiniz (yukarıda önerildiği gibi, iki ila iki ila iki kez) büyük hastalıklar için üç hafta) ve nasıl yaptığınızı görün. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğine çok dikkat etmek zorunludur . Takviye(ler) ekleyerek kendinizi iyi hissediyorsanız ve daha iyi durumdaysanız, devam edin. İyileştiğiniz sürece değişmeyin. Ancak takviyeler eklerseniz (bunları MMS dozlarınızdan farklı bir zamanda alsanız bile) ve ilerlemiyor ve iyileşmiyorsanız veya iyileşmeniz çok yavaş ilerliyorsa, o zaman olabilir.

Machine Translated by Google

takviyeleri bir süreliğine tekrar askıya almak en iyisidir.

Takviye alıyorsanız, bunları MMS dozlarınızı aldığınız zamandan en az iki saat, hatta mümkünse daha fazla boşluk bırakmak çok önemlidir . MMS dozunuzu alırken asla takviye almayın.

Bugün ne kadar insan varsa o kadar beslenme teorisi var. Ancak gözlemlerimiz, kanser hücrelerini ve hastalıkları öldürmek için MMS kullanmanın en iyisi olduğunu ve bir süre vücut için herhangi bir özel besin takviyesini teşvik etmediğini gösteriyor. Daha sonra, hastalık ortadan kaldırıldığında veya büyük ölçüde azaldığında, iyi beslenme yoluyla bağışıklık sistemi oluşturulabilir. Bu adım adım bir süreçtir. Herhangi bir yeni besin takviyesi ve gıdayı tanıtmadan önce detoks yapın.

Büyük bir hastalığınız yoksa, sadece çeşitli toksinlerden ve ağır metallerden arınmak ve cilt problemleri, ağrıyan eklemler, çeşitli rahatsız edici tahrişler ve yaşamı tehdit etmeyen sayısız diğer rahatsızlıklar gibi diğer şeyleri ortadan kaldırmak istiyorsanız, daha sonra, takviyelerin sizin için yararlı olacağına inanıyorsanız, protokoldeki ilk veya iki haftadan sonra herhangi bir zamanda takviyeye başlayabilirsiniz. Ancak aynı prensipler geçerlidir, MMS protokolünüzden yeterince faydalanmadığınızı düşünüyorsanız, takviyeleri bir süreliğine askıya almayı deneyin ve nasıl yaptığınızı görün.

MMS dozunu alırken vitamin ve takviye alıyorsanız, bunları aldığınız zamanları MMS dozlarınızı aldığınız zamandan en az iki saat ayırdığınızdan emin olun. Mümkünse, MMS dozlarınızı günün ilk bölümünde alın. Ardından, son MMS dozunuzdan iki saat sonra günlük protokolünüzü tamamladığınızda, vitaminlerinizi ve takviyelerinizi almaya başlayın. BT

Machine Translated by Google

Vitamin ve takviye almaya başlarsanız, sentetik ve yapay ürünlerden kaçının.
Besleyici bütün gıdaları denemek ve yemek her zaman en iyisidir.

MMS Protokolü Kullanırken Kaçınılması Gereken Yiyecek ve İçecekler

- MMS1 veya MMS2 alırken alkol, çikolata, kahve, kafeinsiz kahve, kafeinli içecekler, çay (siyah, yeşil ve birçok bitki çayı), süt, hindistancevizi suyu, portakal suyu, mandalina suyu veya ilave C Vitamini (askorbik asit) içeren içeceklerden kaçının. .

- Moringa gibi antioksidanlar açısından özellikle yüksek olan gıdaları veya takviyeleri almayın, çünkü bunlar MMS'nin etkinliğini ortadan kaldırır.
  Bu, MMS alıyorsanız bu yiyeceklerin hiçbirini yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Bununla birlikte, belirli bir protokolde, yukarıdaki maddeleri tüketmeden önceki gün için MMS dozlarınızı bitirmenizi beklemek veya sabah ilk iş olarak bunları almak, ardından MMS dozuna başlamadan önce iki saat beklemek daha iyidir. Son günlük dozunuzdan en az iki saat sonra veya günlük dozunuza başlamadan iki saat önce bunları boşaltın.

- Önemli bir hastalıkla mücadele ediyorsanız, yukarıdaki Besin Takviyeleri ve HRP bölümünde açıklandığı gibi, takviyeleri bir süreliğine birlikte askıya almak isteyebilirsiniz.

Not: Çay bu "yapılmaması gerekenler" listesinde yer alırken, MMS1 ile uyumlu bazı (tümü değil) bitki çayları da vardır. Neyin uyumlu olup olmadığından emin olmak için 278. sayfada açıklanan test şeridi yöntemini kullanın.

Machine Translated by Google

4. Bölüm
DMSO (Dimetil Sülfoksit)

DMSO (Dimetil Sülfoksit), nazik ama güçlü bir iyileştirici maddedir. 1955'ten beri alternatif uygulayıcılar ve birkaç tıp doktoru tarafından ilaçları vücudun dokularına ve organlarına daha derine taşımanın bir yolu olarak yaygın olarak kullanılan iyi bilinen bir taşıyıcı çözücüdür. Ağızdan alındığında, kan pıhtılarını çözmek için kullanılmıştır. Nakil için kullanılan vücut organları, hastaneler arasında taşınması için %99,9 DMSO'ya daldırılır, böylece DMSO dokuya zarar vermez.

Bu kitaptaki bazı protokoller, DMSO'nun MMS1 ile birlikte kullanılmasını gerektirir. (Lütfen, DMSO ve MMS2'yi asla aynı anda almadığınızı unutmayın. Sayfa 27'ye bakın.) DMSO'nun MMS1'i dokuların daha derinlerine taşımaya yardımcı olduğu için bunun iyi sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. DMSO kendi başına ayrıca ağrıyı dindirebilir, şişliği azaltabilir, iltihabı azaltabilir, iyileşmeyi teşvik edebilir, mantar önleyici, kan pıhtılarını çözebilir, vücudun normal işlevini eski haline getirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. DMSO, genellikle kas burkulmaları ve çeşitli yaralanmaların tedavisinde veteriner hekimler ve atletik antrenörler tarafından kullanılır. Yaralanma bölgesine kan akışını artırarak iyileşmeyi destekler.

Bir kaza olması durumunda kullanmak için her zaman elimde bir miktar DMSO bulunduruyorum. Kazadan hemen sonra uygulanırsa burkulmalara ve morluklara inanılmaz derecede hızlı bir rahatlama sağlayabilir ve yaralı bölgeyi birkaç dakika içinde eski haline getirebilir. Büyük kazalarda ağrıyı hafifletmeye ve vücuda yardımcı olabilir.

Machine Translated by Google

normalden daha hızlı iyileşir. Kazadan sonra ne kadar erken uygulanırsa o kadar iyi, ancak bir kazadan hemen sonra uygulayamazsanız, kullanımında gecikme olsa bile iyileşme sürecini hızlandıracaktır. DMSO'yu doğrudan yaralanmanın üzerine uygulayın. Tam güç uygulayabilirsiniz.
Yanarsa veya aşırı kaşıntıya neden olursa, az miktarda su, bir çay kaşığı kadar ekleyin ve hafifçe ovalayın. Gerekirse, DMSO'dan rahatsızlık kalmayana kadar küçük miktarlarda su eklemeye devam edin.

Aşağıda, bu kitaptaki protokollere göre DMSO'yu kullanmadan önce bilmeniz gereken bazı yararlı bilgiler ve şeyler bulacaksınız. Ayrıca, DMSO'nun kullanımı hakkında çok çeşitli bilgilerin mevcut olduğu internette araştırma yapmanızı tavsiye ederim.

DMSO—Nereden ve Ne Satın Alınır

DMSO, hayvan tedarik şirketleri ve Amazon gibi çevrimiçi perakendeciler dahil olmak üzere çeşitli mağazalar aracılığıyla edinilebilir. Şişedeki "saflık" yüzdesini (%) aramak istiyorsunuz. Şişenin üzerinde "%99 veya %99,99" saflık veya "saf" varsa ve başka bir sayı yoksa, bu en yüksek saflıktır.

Mümkünse, tam güçte DMSO satın alın (%99 ila %99,99 saflık). Gerekirse, her zaman damıtılmış suyla biraz seyreltebilirsiniz. Seyreltilmiş DMSO satın alırsanız , yalnızca suyla seyreltilmiş olanı satın alın.
Bazen Aloe vera ile seyreltilir ve çoğu zaman kokuludur. Bunları kullanmanızı tavsiye etmem. Etiketleri ve ürün açıklamasını dikkatlice okuyun. Gerekirse, ne satın aldığınızdan emin olmak için tedarikçinizle görüşün.

Notlar

Ü Seyreltilmemiş DMSO'nun oldukça güçlü olduğunu düşünebilirsiniz, ancak çoğu zaman protokollerimizin çağırdığını unutmayın.

Machine Translated by Google

DMSO'yu su ile karıştırmak için. Oral dozda alırsanız 1/2 su bardağı (4 oz/ 120 ml) su ile içiyorsunuz demektir. Yama Protokolünde kullanıyorsanız, su da eklenir, bu nedenle bu protokoller seyreltilmesini sağlar. Birçok kişi seyreltilmemiş DMSO'yu doğrudan cilde uygulayabilir (ovalayarak veya bir sprey şişesi kullanarak) ve iyi sonuç verirler. Ancak bunu çok güçlü bulursa, DMSO'nuzu damıtılmış suyla biraz seyreltin. Gerekirse daha fazlasını ekleyebileceğiniz için az miktarda su ekleyerek başlamak en iyisidir .

Ü DMSO'nuz %10'dan fazla distile su ile seyreltilmişse, protokolde kullanılan her MMS1 damlası için fazladan bir damla DMSO ekleyebilirsiniz. Örneğin, protokol 1 damla MMS1 için 3 damla DMSO gerektiriyorsa, o zaman MMS1 damlası başına 4 damla DMSO kullanın.

Ü DMSO'nun biraz hoş olmayan bir koku ve tada sahip olduğu iyi bilinmektedir, ancak farmasötik sınıf DMSO'nun neredeyse hiç kokusu ve kötü tada sahip olmadığı açıklanmıştır. İnternette ve bazı eczanelerde bulunabilir. Maliyet önemli ölçüde daha yüksektir.

DMSO—Alerji Testi

Çok, çok az insan, genellikle karaciğeri zayıf olanlar, DMSO'ya alerjisi vardır. Alerjik olup olmadığınızı kontrol etmek için bu testi yapın:

q Sade su kullanın (sabun kullanmayın) ve kolunuzda bir noktayı yıkayıp kurulayın. (Dirseğin hemen üstünde veya altında iyi çalışır.)

q Kolunuzdaki noktaya 1 damla DMSO (temiz bir parmakla) ekleyin ve ovalayın.

q DMSO'ya emmesi ve izin vermesi için yaklaşık 15 dakika verin. alan kurutur.

Machine Translated by Google

24 saat içinde karaciğer bölgenizde ağrı olmazsa, 1000 kişiden 999'unda olduğu gibi DMSO kullanmanız muhtemelen sizin için güvenlidir.

MMS1 karaciğeri iyileştirdiği için, bir haftadan uzun süredir MMS1 alıyorsanız, karaciğeriniz DMSO'yu muhtemelen sorunsuz bir şekilde tolere edecektir.

DMSO'yu uyguladıktan sonra karaciğerde ağrı hissederseniz, Başlatma Prosedürünü ve ardından Protokol 1000'i uygulayarak karaciğerinizin durumunu iyileştirmeye çalışmanızı öneririm. Halihazırda bir protokol üzerindeyseniz, ancak yine de DMSO'ya kötü tepki veriyorsanız, sadece protokole devam edin ve birkaç gün sonra aynı testi tekrarlayın ve DMSO'ya tolerans göstermelidir. Testte ikinci kez başarısız olursanız, protokole devam edin ve geçene kadar testi birkaç günde bir deneyin. Keşfedildiğinden beri DMSO'nun bir insana herhangi bir kalıcı zarar verdiğine dair bir rapor hiç olmadı.

DMSO—Güvenlik Önlemleri

Ü DMSO bir çözücüdür ve deriden dokulara kolayca geçer. Ayrıca diğer maddeleri de beraberinde taşıyacaktır, bu nedenle DMSO'yu kullanmadan önce cildinizde ne olduğuna dikkat edin.

Ü DMSO'yu topikal olarak uyguluyorsanız, DMSO'yu kullanırken ellerinizin ve tırnaklarınızın temiz olduğundan ve kirletici maddelerden (sabun kalıntısı dahil) arınmış olduğundan emin olun. DMSO uyguladığınız alanın temiz olduğundan da emin olmak istersiniz .

Ü DMSO uygulamadan önce cildin bir bölgesini yıkarken , mümkünse uygulama bölgelerini ve elleri yıkamak için doğal, kimyasal içermeyen sabun kullanmak en iyisidir. Bu olsun ya da olmasın, sabunun tamamen durulandığından emin olun veya hiç sabun kullanmayın. Temiz suyla (cildi ovalayarak) iyice yıkayın.

Machine Translated by Google

Ü DMSO'yu cilde uygulamanın en iyi yöntemi, DMSO'yu vücudunuza veya bir başkasına sürerken temiz ve kuru çıplak elleri kullanmaktır.

Ü DMSO'yu çıplak elle uyguluyorsanız, oje sürmeyin. DMSO, sadece cilayı çözmekle kalmayıp aynı zamanda toksik bileşenlerini deriden ve vücuda taşıyacak bir çözücüdür. DMSO'yu uygulamak için elinizi plastik bir sandviç torbaya koyabilirsiniz (genel olarak bu tür plastik, DMSO ile kullanım için uygundur).

Ü DMSO'yu kullandıktan sonra, sabunu cilde/dokulara taşıyabileceğinden asla sabunla yıkamayın . Ellerinizi temiz su ile güzelce yıkamanız yeterlidir.

Ü Tam gücünü DMSO'dan uzak tutun.

Ü DMSO ile en yaygın eldivenleri (kauçuk, lateks vb.) kullanmayın. Eldivenleri çözebilir. Eldivenlerin küçük bir kısmının çözülmesi bile, lastiği veya lateksi vücudunuza aktarabilir. Gerilmeyen plastikten yapılmış eldivenlerin DMSO ile kullanılması uygundur. Normalde DMSO kişinin ellerine zarar vermez ve eldivenlere gerek yoktur. (Bazı cilt tiplerinde sık veya çok miktarda uygulanması cildin kırışmasına neden olabilir ama bu kısa sürede geçer.)

Ü Bir lavman solüsyonuna asla DMSO eklemeyin. Kolon, vücudun dışarı attığı birçok toksin içerir. DMSO'yu kolona koyarsanız, bu toksinlerin bir kısmını kan dolaşımına geri verebilirsiniz.

UYARI

- DMSO'nun kalsiyum hipoklorit (MMS2) ile temas etmesine izin vermeyin. Bu aşırı ısı ve ateşle anında yanmaya neden olur.

  Bu durumda, başlatmak için bir kıvılcım gerekmez.

Machine Translated by Google

anında ateş edin. Böyle bir yangını söndürmek için su kullanın ama su sıçrayacağı için geri çekilin.

YUTMA UYARISI

- Kalsiyum hipoklorit (MMS2) kapsülleri alırken DMSO'yu asla bir içecekte kullanmayın. DMSO, MMS2'nin ısınmasına neden olabilir ve midenizde çok rahatsız edici olabilir. (Bu kazayla olursa, rahatsızlığı gidermek için bol miktarda soğuk su içirin.)

- Bir MMS1 dozuna DMSO ekliyorsanız, örneğin Protokol 1000 Plus'a göre, her MMS1 damlası için 3 damladan fazla DMSO hesaplamamalısınız ve en az 1/2 fincan (4 ons/120) ile karıştırılmalıdır. ml) su.

- MMS2'nin MMS1/DMSO dozlarıyla aynı gün alınmasını gerektiren bir protokolde bunu yapabilirsiniz, ancak MMS2 kapsülü MMS1/DMSO dozlarından yarım saat ayrılmalıdır. Asla aynı anda DMSO ve MMS2 kapsülü içeren bir doz almayın!

Torunun Siğili: 8 yaşındaki torunum bir hafta sonu ziyarete geldi ve dizinde korkunç ve büyük bir siğil vardı. Aslında üç damla MMS ve sitrik asidi karıştırdım ve hiç seyreltmeden doğrudan siğile uyguladım. Onu biraz yaktı ama yaklaşık bir ay sonra torunumu bir daha gördüğümde siğil tamamen gitmişti. Yaklaşık bir yıl önce oldu ve siğilin olduğu yerde bir yara izi var ama başka bir siğil belirtisi yok. —Tina, Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

Bölüm 5
Sağlık Kurtarma Planı (HRP)

Arka fon

Zehirli çevremiz nedeniyle günümüz dünyasında sağlıklı olmak zor olabilir. Birçok insanın karmaşık veya çoklu sağlık sorunları vardır ve bunların üstesinden gelmek biraz çalışma gerektirebilir. Bu nedenle bu Sağlık Kurtarma Planını (HRP) geliştirdim. Bazen bunu Ana Mucize Protokolü olarak düşünüyorum ve çeşitli protokollerin bir kombinasyonu olduğu için, gerçekten bir Sağlık İyileştirme Planıdır (sağlığı geri yüklemek bir süreçtir). İyi haber şu ki: Eğer binlerce acı çeken insanla çalıştıktan sonra, Sağlığınızı İyileştirme Planımızda ana hatlarıyla belirtilen temel esasları izlerseniz, diğerlerinin yaptığı gibi nispeten kısa sürede iyileşeceğinize eminim. Unutmayın, MMS vücudu olduğu gibi iyileştirmez, patojenleri yok eder ve vücudun kendini iyileştirmesini engelleyen zehirleri oksitler. Bu kitapta verilen bu planı tüm hastalıklar için kullanın.

Nasıl çalışır

Bu kitap, düzgün bir şekilde takip edildiğinde insanların sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan bir dizi protokolle dolu. Temel Protokollerimiz, Sağlık İyileştirme Planını oluşturmak için bir dizi Destekleyici Protokol ile birlikte çalışır.

Sağlığı İyileştirme Planının genel bir sıralaması veya stratejisi olduğunu bilmek önemlidir. koydum

Machine Translated by Google

burada, bu kitabın ön tarafına doğru, genel bir bakış ve kolay başvuru için. Henüz MMS ile çalışmamış olanlar için, bu noktada bu planın nasıl çalıştığı tam olarak anlam ifade etmeyebilir, ancak bu kitapta özetlenen protokolleri öğrendikçe netleşecektir.

Önemli olan nokta, protokollerin nasıl kullanılacağına dair bir sıra olmasıdır. Burada belirtilen süreden sonra kişinin iyileşmesi durursa, bunun her zaman bir şeyleri değiştirme zamanının geldiğinin bir göstergesi olduğunu unutmayın, bir sonraki adıma geçin ve gerektiğinde sık sık kitabın bu bölümüne bakın.

> Bu kitaptaki tüm protokoller çocuklar için kullanılabilir. Ancak bunlar çocuğun ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çocuklar için protokol dozajlarının nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için Bölüm 13'e bakın.

Sağlığın İyileştirilmesi için Temel Protokollere Genel Bakış Plan

Başlatma Prosedürü , her bir kişinin kolay bir şekilde sağ ayağa başlamasını sağlamak için esastır. Bu protokol, vücudun buna alışması için saatte çok küçük dozlarda MMS1 gerektirir.

Protokol 1000 , hastalık patojenlerini öldüren, zehirleri yok eden ve ağır metalleri vücuttan uzaklaştıran birincil protokolümüzdür. Sadece Protokol 1000 ile çok geniş bir hastalık yelpazesinin üstesinden gelindiğini bulduk.

Protokol 1000 Plus , dozaja belirli bir miktarda DMSO eklenmesini gerektiren bir prosedürdür. DMSO, orada saklanan zehirleri ve patojenleri bulmak ve ortadan kaldırmak için MMS'yi vücudun dokularının daha derinlerine taşır.

Machine Translated by Google

Protokol 2000 , Protokol 1000 ve 1000 Plus'ın yapamadığını bitirir veya yapar. Bu, yalnızca 1000 ve 1000 Plus Protokolleri ile ulaşılamayacak kadar yerleşik hastalıkları ele alan sert vurucumuzdur . Bu aynı zamanda kanserin ve yaşamı tehdit eden hastalıkların çoğunun üstesinden gelmek için ana protokoldür.

Protokol 3000 , daha da etkili hale getirmek için Protokol 2000'e basitçe eklenir. Oral dozlarda olduğu gibi mideden geçmeden deri yoluyla MMS almanın ek bir yoludur.

Küf/Mantar Protokolü , MMS1 ile birlikte kullanılan bentonit kilinin eklenmesini içerir. Üzerinde bulunduğunuz protokollerde ilerleme kaydedemiyorsanız, bir süreliğine Küf/Mantar Protokolüne geçmeniz gerekebilir. Başlangıç Prosedüründen hemen sonra, ancak Küf/mantar ile temas ettiğinizi düşünüyorsanız ve probleminizin kökünde küf olduğundan şüpheleniyorsanız, Protokol 1000'e devam etmeden önce bu protokolle başlamayı düşünebilirsiniz.

Yukarıda bahsedildiği gibi, bu altı protokol, sağlığın iyileşmesi için dizilimdeki Anahtar Protokollerimizdir. Hastalığın ne olduğuna bağlı olarak bunlarla birlikte uygulanacak bir dizi Destek Protokolü vardır. Çoğu durumda, insanlar bu Sağlık Kurtarma Planındaki tüm protokolleri tamamlamadan çok önce sağlıklarına kavuşurlar. Bununla birlikte, hastalıkları ekstra mil gitmeyi gerektirenler var. Destekleyici Protokollerin bazıları, belirli sorunları ve hastalıkları ele alır ve bu nedenle, Anahtar Protokollerdeyken (genellikle Protokol 3000'den sonra ama bazen daha önce) bunları eklemek gerekir. Bu bölümdeki talimatlar bunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Hint Bitkisi— Aşırı kanserler için nadir durumlarda (belki 100'de 1) Hint Bitkisi (veya Kara Merhem) kullanmak gerekebilir. Bu bitkisel formül şu anda satılıktır.

Machine Translated by Google

Amerika Birleşik Devletleri 90 yıldan fazla. Binlerce kişi başarıyla kullandı. (Bkz. Bölüm 10.)

Temel prensipler

MMS Protokollerimizin basit kuralları ve MMS'in Üç Altın Kuralı dediğimiz Sağlık İyileştirme Planının temel prensipleri şu şekildedir:

Ü İlerleme görüyorsanız, yaptığınız işe devam edin.
Hiçbir şeyi değiştirme. Bir sonraki protokole gitmeyin.
Bir sonraki damlaya yükseltmeyin; İyileşirken, iyiye gidene kadar veya artık herhangi bir ilerleme görene kadar, yaptığınız şeyi yapmaya devam edin, bu durumda bir sonraki seviyeye geçersiniz.

Ü Ne zaman mide bulantısı, ishal, kusma veya aşırı yorgunluk hissediyorsanız ve/veya hastalığınızın sizi halihazırda yaptığından daha kötü hissediyorsanız, MMS alımınızı yarı yarıya azaltın. Bu belirtiler devam ederse, hastalığınızın hissettirdiğinden daha kötü hissetmeyene kadar yarı yarıya azaltmaya devam edin. Ardından, Herxheimer semptomları (bulantı, ishal vb.) azaldığında, uyguladığınız protokole göre yavaş yavaş doğru doza geri dönün, ancak kendinizi hastalığınızın zaten hissettirdiğinden daha kötü hissettirecek kadar değil.

Ü Beş ila altı günlük bir süre içinde iyileşmeye yönelik herhangi bir ilerleme görmezseniz, bir sonraki seviyeye geçin – rampa artırın – MMS alımınızı artırmaya başlayın. Bir protokolü takip ettiğiniz yere bağlı olarak, dozunuza damla ekleyin ve/veya bir sonraki protokole geçin. Her yeni bir protokol eklediğinizde, halihazırda yaptığınız şeyi durdurmayın.
Ekle, ancak izlediğiniz önceki protokollerin hiçbirini durdurmayın.

Örneğin, 1000 numaralı Protokol'de olduğunuzu ve beşinci veya altıncı günden sonra durumunuzda ne olursa olsun bir miktar iyileşme fark ettiğinizi varsayalım. İyileşme belirtileri

Machine Translated by Google

Protokol 1000'e devam etmenin bir göstergesidir, hiçbir şeyi değiştirmeyin, devam edin. Öte yandan, Protokol 1000'deyseniz ve protokolün beş veya altı gününü tamamladıysanız ve herhangi bir ilerleme veya iyileşme belirtisi görmediyseniz, Protokol 1000 Plus'a geçin ve bu şekilde devam edin.

Sağlık İyileştirme Planı için Protokol Dizilimi

Başlatma Prosedürü: Daima Başlatma Prosedürü ile başlayın. Başlangıç Prosedürü ile eş zamanlı olarak, dişlerinizi MMS1 ile fırçalamak ve herhangi bir cilt problemi varsa sprey şişesini kullanmak olan İki Temel Adıma başlayın. (Talimatlar 73-78. sayfalarda verilmiştir.) Ek olarak, vücutta herhangi bir dış tümör varsa, bu MMS1/ DMSO Yamasını da uygulamaya başlama zamanıdır (sayfa 135).

Protokol 1000: Protokol 1000'e geçin ve bir tür iyileştirme gördüğünüz sürece bu protokole devam edin. Ancak Protokol 1000'de beş veya altı günlük bir süre varsa ve herhangi bir iyileşme belirtisi görmezseniz , yapılacak ilk şey MMS'in herhangi bir şey tarafından etkisiz hale getirilmediğinden emin olmaktır (bkz. sayfa 42-45). , 52, 56). Ayrıca, MMS ile başarılı olamayabileceğiniz diğer nedenlerle listeyi kontrol edin (Bölüm 8). Ardından, her şeyi doğru bir şekilde takip ediyorsanız ve beş veya altı gün sonra herhangi bir gelişme belirtisi görmüyorsanız, bir sonraki seviyeye geçin - Protokol 1000 Plus.

Protokol 1000 Plus: İyileşme olduğu sürece Protokol 1000 Plus'a devam edin, ancak yine, beş veya altı günlük bir süre boyunca herhangi bir gelişme olmazsa, bir kez daha bir sonraki seviyeye, yani Protokol 2000'e geçin.

Protokol 2000: Protokol 2000'deyken,
MMS2, üçüncü veya dördüncü günden başlayarak,

Machine Translated by Google

bu protokol ile devam geliştiriyor. Ancak, beş veya altı günlük bir süre için belirgin bir iyileşme belirtisi yoksa, Protokol 3000'i ekleyin.

Protokol 3000: Protokol 3000'i ekledikten sonra, gelişme olduğu sürece devam edin, ancak beş veya altı günlük bir süre varsa ve herhangi bir gelişme yoksa, çeşitli Destekleyici Protokoller ile başlayabilirsiniz. Bu protokoller (bu kitapta daha ayrıntılı anlatılmıştır) vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olacak ek yollar sunar. İyileşene kadar daha fazla protokol eklemeye devam edersiniz.

Küf/Mantar Protokolü: Dizideki Anahtar Protokollerin sonuncusu, ancak kesinlikle en az değil, Küf/Mantar Protokolüdür. 1000'den 3000'e kadar olan Protokollerde başarı görmüyorsanız, lütfen bir süreliğine Küf/Mantar Protokolüne geçmeyi düşünün. Küflerin/mantarların neden olduğu birçok hastalık vardır, bu yüzden lütfen 99. sayfadaki Küf/Mantar Protokolü'nde açıklanan detayları dikkatlice okuyunuz.

Küf bir mantar türüdür. MMS1 ve MMS2'nin öldürdüğü görünmeyen bazı mantar türleri olduğunu yıllar içinde öğrendim. Ancak, durum bu olduğunda, genellikle kilin sorunu çözeceğini buldum. Dolayısıyla, MMS1 veya MMS2 ile istenen sonuçları alamıyorsanız, bu hastalığa küf/mantarın neden olduğunun bir göstergesi olabilir ve bu, protokolünüze kil eklemek için bir sinyal olabilir.

Bir diğer önemli nokta, bazı doktorlar ve sağlık pratisyenleri gibi, bazı küf/mantar çeşitlerinin vücuttaki bazı hastalıklar için bir tür koruyucu kalkan görevi görebileceğine inanıyorum. Bu durumda bazı patojenler MMS ile aşılamayabilir, çünkü mevcut küf onlara belirli bir “koruma” sağlar. Bu durumda küfü yok edersek

Machine Translated by Google

önce kil ile, diğer patojenler "küf korumalarını" kaybettikleri için, MMS onları da yok edebilir.

Bu hem Lyme hem de Candida ve muhtemelen başka hastalıklarda olabilir. Candida'nın kendisi bir mantardır ve kil onu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ancak diğer mantar türleri de Candida için koruyucu bir kalkan görevi görüyorsa, MMS'in işini yapabilmesi için önce bu sorunu çözmek önemlidir. Yaptığınız herhangi bir protokolü beklemeye alabilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an Küf/ Mantar Protokolü'nü yapabilirsiniz. Küf/Mantar Protokolünü enjekte etmek sorun olmayacak ve halihazırda kaydetmiş olduğunuz ilerlemeye zarar vermeyecektir ve ardından Küf/Mantar Protokolünü bitirdikten sonra, hangi protokolde olursanız olun geri dönebilir ve onunla devam edebilirsiniz. tam sağlık geri kazanılır.

Notlar

Ü MMS1'i ağızdan alırken aşağı inerken yanma ya da mide ekşimesi gibi bir his yaşıyorsanız, bu içinizde küf/mantar bulunduğunun bir göstergesi olabilir. Bu, Küf/Mantar Protokolünü yapmak için bir işaret olacaktır (bkz. sayfa 99). MMS1'i harici olarak kullanırken ve çok kötü yandığında ve soktuğunda kil ve Vazelin merhemi kullanın (bkz. sayfa 106-107).

Ü Daha önce de belirtildiği gibi, MMS sizi daha kötü hissettirirse (başka bir deyişle, Herxheimer reaksiyonu belirtileri yaşıyorsanız – mide bulantısı, ishal vb.) dozu %50 azaltın ama durmayın. Hastalığınızın size hissettirdiğinden daha kötü hissetmeye devam ederseniz, dozunuzu azaltmaya devam edin. Kendinizi aşırı derecede kötü hissediyorsanız, hoş olmayan semptomlar geçene kadar birkaç saat veya bir gün ara verin, ancak semptomlar geçtikten sonra, MMS alımınızı, üzerinde bulunduğunuz protokol için uygun doza yavaş yavaş artırmaya başlayın. sizi hastalığınızın zaten hissetmenize neden olduğundan daha fazla hasta hissettirmediği sürece.

Machine Translated by Google

Ü Unutmayın, MMS alımınızı her artırdığınızda ve başka bir protokol eklediğinizde, halihazırda yaptığınız şeyi yapmayı bırakmayın. Ekleyin, ancak yaptığınız şeyi almayın veya durdurmayın.

Ü Hatırlanması gereken çok önemli bir şey, iyileşene kadar MMS almayı asla bırakmamaktır. İyi olduğunuzda, sağlıklı ve formda kalmanıza yardımcı olacak gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapmaya çalışmanızı öneririm. Bu, birkaç şeyden birini veya birkaçını içerebilir. Kök kanallarını çıkarmak ve enfeksiyonlu ağız kavitasyonlarına müdahale etmek, evinizden ve/veya ofisinizden küfü çıkarmak, zararlı kimyasallardan arındırılmış iyi bir su kaynağı elde etmek gibi sürekli kan dolaşımına giren herhangi bir toksik zehir kaynağını ortadan kaldırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. .
(Sağlıklı kalmak için değiştirmeniz gerekebilecek şeyler hakkında daha fazla fikir için Bölüm 8 Gerçeklik Kontrolü'ne bakın.) Fiziksel aktiviteyi günlük rutininizin bir parçası yapın. Düzgün dinlenin. Hayatınızdaki stresi azaltın. Başkalarıyla iyi ilişkiler geliştirin. Günlük bir ruhsal uygulamayı benimseyin. İyi bir beslenme planı izleyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin.
Gerçek yemek yiyin.

Kural İstisnası

Kanseriniz veya yaşamı tehdit eden başka bir hastalığınız varsa, yeni bir protokol eklemeden önce beş ila altı günlük aralıkları gözetmeden Protokol 2000'e daha hızlı geçmeniz gerekebilir. İşlerin gidişatına göre daha hızlı hareket etme zamanının gelip gelmediğini belirleyebilirsiniz. Kendinizi çok kötü hissediyorsanız ve yine hayatınızı tehdit eden bir hastalığınız varsa, protokollere daha hızlı gitmek isteyebilirsiniz, ancak hastalığınızdan zaten daha fazla hastalanmadan. Bu durumda, daha hızlı hareket edebileceğinizi söylememe rağmen, yine de her zaman Başlangıç Prosedürü ile başlamalısınız - bu adımı atlamayın.

Machine Translated by Google

Hastalık ne kadar ilerlemişse, başlamak için o kadar yavaş gitmeniz gerektiğini anlamak önemlidir .
Vücudu çok hızlı detoksifiye ederseniz, bu kişiyi çok hasta edebilir. Zaten oldukça hastayken hastalanmak iyi bir şey değil. Bu, vücudu daha da zayıflatabilir ve uzun vadede genel iyileşme sürecini yavaşlatabilir.

Başlangıç Prosedürünü tamamladıktan sonra, Protokol 1000'e ve saatlik 3 damla dozlara geçerken, iki ila üç gün içinde (standart beş ila altı gün yerine) herhangi bir gelişme görmüyorsanız ve Bir Herxheimer reaksiyonu yaşamadıysanız, Protokol 1000 Plus'a (saatlik dozlarınıza DMSO ekleyen) geçin. Ardından, iki veya üç gün içinde yine bir gelişme görmüyorsanız, Protokol 2000'e geçin.

Protokol 2000'in talimatlarını izleyin ve bu kitapta özetlendiği gibi, ancak kendinizi daha da hasta etmeden Sağlık İyileştirme Planına devam edin. (Bkz. MMS'in Üç Altın Kuralı, sayfa 83-84.)

Vücudunuzun nasıl tepki verdiğine çok dikkat edin. Her insan farklıdır; bazıları bu hızlı tempoda gidebilirken, diğer yandan bazılarının burada önerilenden daha yavaş bir hızda gitmesi gerekebilir. Kişi saatte sadece 1 damla MMS1 aldığında hayatı tehdit eden hastalıklarda kayda değer iyileşmeler olduğunu duyduk. Ne kadar MMS ile başa çıkabileceğinizi görmek bir yarış değil.

Vücudunuzu dinleyin ve MMS'in Üç Altın Kuralına her zaman uymanın son derece önemli olduğunu unutmayın.

Destekleyici Protokoller—Ne Zaman Eklenmeli

Genel olarak, Protokol 3000'e ulaştıysanız ve sağlığınızı tam olarak iyileştirmediyseniz, Destekleyici Protokollere eklemeye başlamanızı tavsiye ettim. Bunun nedeni kısmen, Sağlığı İyileştirme Planı üzerinden çalışmanın bir süreç olmasıdır. Genel olarak, vücudun süreçteki her yeni eklemeye alışması için biraz zamana ihtiyacı vardır. Ekleme

Machine Translated by Google

aynı anda çok fazla şey bunaltıcı olabilir ve/veya muhtemelen Herxheimer reaksiyonuna neden olabilir. İyileşmeyi engelleyebilecek hiç kimsenin yorulup pes etmesini istemiyorum. Bir Destekleme Protokolüne ne zaman ekleneceğine dair bu kural zor ve hızlı değildir. Bu bir kılavuzdur.

Destekleyici Protokoller eklerken bazı istisnalar: Devam eden bir öksürüğünüz olduğunda Öksürük Protokolü'nü yapın. Meme, rahim ağzı veya rahim kanseri olan bir kadın, bazı durumlarda Protokol 1000'de olduğu kadar erken, hatta daha önce Duş Protokolü'ne başlamak isteyebilir. MMS'i iyi idare ediyorsa ve bunun iyileşmesine yardımcı olup olmadığını görmek için birkaç dokunuş ekleyebileceğini düşünüyorsa, denemeye değer olabilir. Kolon kanseri olan biri, eğer uygun hissediyorsa, Protokol 3000'e ulaşmadan önce bir noktada lavman veya kolonik eklemek isteyebilir. Protokol 3000'e ulaşmadan önce bir Destekleyici Protokol eklemenin başka bir örneği, herhangi bir harici tümör için MMS1/DMSO Yamasının kullanılması durumunda olacaktır. Vücudunuzun sinyallerine çok dikkat edin ve üstesinden gelebileceğinizi düşündüğünüz şeyi takip edin. Destekleyici Protokolleri kullanmanın örneklerini ve bunları sağlık kurtarma rutininize ne zaman ekleyeceğinizi gösteren hastalıkların bir listesi için Bölüm 7'ye bakın.

Ek Protokoller Üzerine Bir Söz

Bu kitaptaki Ek Protokoller, belirli bir hastalığa özgü olmaları bakımından Destekleyici Protokollerden farklıdır. Bazı hastalıklar HRP'den farklı bir prosedür gerektirir. Örneğin, sıtma, normal MMS1 dozundan daha güçlü iki doz almayı gerektirir. Çoğu durumda bu, sıtmayı ortadan kaldırır, ancak komplikasyonlar varsa, Sıtma Protokolü sıtmaya özel daha fazla talimat verir.

Bazen, bir Ek Protokol, belirli belirli bir aşamadan sonra, bir noktada İHP'ye gitmeyi önerebilir.

Machine Translated by Google

bu hastalığa özel prosedürler. Ek Protokoller hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bölüm 11'e bakın.

İHP için İki Temel Sağlık Prosedürü

1. Dişlerinizi Fırçalamak

Hemen hemen tüm hastalıklar, ağız ve dişlerin durumundan büyük veya küçük ölçüde etkilenir, bu nedenle bu MMS Sağlık Kurtarma Kılavuzunda listelenen tüm protokollere , MMS1 ile dişlerin günlük olarak fırçalanması eşlik etmelidir. MMS1'in ağız sağlığını geri getirebileceği defalarca gösterilmiştir ve bu protokollerin uygulanması durumunda, dişler ve ağız çok kötü durumda olsa bile MMS1 ile fırçalarken daha iyi sonuçlar genellikle fark edilir.

Bu, kişinin iyi bir diş hekiminin hizmetlerine ihtiyaç duymayacağı anlamına gelmez, ancak ağızdaki enfeksiyon ve hastalıklar bir kez geçtiğinde diş hekimi çok daha iyi bir iş çıkarabilir ve vücut hastalıklarının görülme olasılığı 10 kat daha fazladır. üstesinden gelmek. Bu nedenle, bu iyileşme planının ilk adımı , protokolleri yaparken dişleri ve diş etlerini fırçalamak için iyi bir yumuşak diş fırçası satın almaktır. Bazen diş macunu ile diş fırçası kullanıyorsanız, yalnızca MMS1 (ve kullanıyorsanız DMSO) ile kullandığınız ayrı bir diş fırçası bulundurun. Bu, diş fırçasında kalan diş macunu kalıntısının MMS1 ile karışmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Hiçbir koşulda florür içeren diş macunu kullanmamalısınız.

Machine Translated by Google

Diş Fırçalama Prosedürü

Aşama 1

q Bir bardakta 5 damla MMS etkinleştirin.

q 30 saniye sonra sadece 1/4 fincan (2 ons/60 ml) ekleyin.
MMS1 damla su.

Adım 2

q Bu karışımla hem diş etlerinizi hem de dişlerinizi en az iki dakika fırçalayın. (Fırçalarken sıvının bir kısmını diş fırçasının üzerine 3 veya 4 kez dökün. 75. sayfadaki ipucuna bakın.)

q Protokolleri yaparken bunu günde 2 veya 3 kez yapın.
bu kitap.

Not: Birkaç yıldır dünyanın her yerinden insanlar ağızlarını formda tutmak ve çeşitli diş ve diş eti enfeksiyonlarının üstesinden gelmek için MMS1'i başarıyla kullanıyor. Sodyum kloritin alkalinitesi veya MMS1'in dişlerinizden cıva sızdırmasının asitliği hakkında endişelenmenize gerek yok. Bunun nedeni, alkali olan MMS (sodyum klorit) ile damla damla karıştırıldığında MMS aktivatöründeki asitliğin, MMS1 çözeltisini nötre çok daha yakın bırakarak, çoğunlukla birbirini iptal edecek şekilde hesaplanmasıdır. Asitlik çoğu meyveden çok daha azdır ve dişlerinize zarar veremez veya dolgularınızdan cıva sızdıramaz. Meyve ve sebzelerin doğada MMS1 dozlarından daha fazla asidik olduğunu unutmayın. (Meyve ve sebzelerin asitliği ve alkaliliği hakkında daha fazla bilgi için Ek C'ye bakınız.)

DMSO ve Dişler

Dişleriniz kötü durumdaysa, örneğin apse, ağrı veya daha ciddi komplikasyonlarınız varsa.

Machine Translated by Google

diş fırçalama rutininize DMSO'yu ekleyin. DMSO, MMS'yi diş minesinden geçerek dişe taşıyacak ve birçok sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Aşama 1

q Tarif edilen MMS1 diş fırçalama karışımını karıştırın üstünde.

q Dişlerinizi bu karışımla bir dakika kadar fırçalayın. Bu, ağız ve dişlerin ilk temizliği ve DMSO'nun dişlerinizin dokularına ve minesine "taşımasını" istemediğiniz her şeyi temizlemek içindir.

q Bu ilk temizlemeden sonra ağzınızı iyice çalkalayın.

Adım 2

q Ardından, MMS1 karışımının geri kalanına DMSO ekleyin ve eklenen DMSO ile fırçalamaya devam edin. Fırçalamaya devam etmeden hemen önce karışımınıza DMSO eklemelisiniz. Kullanmakta olduğunuz her 1 damla MMS için 3 damla DMSO ekleyin. Yukarıdaki formül için bu 15 damla olacaktır.

q Halihazırda seyreltilmiş DMSO'nuz varsa, her MMS damlası için 4 damla kullanın.

İpucu: Diş Fırçalama Prosedüründe açıklanan solüsyonun aynısını birden fazla fırçalama için kullanmak istiyorsanız solüsyonu ağzı kapalı bir şişeye koymanız gerekecektir. Diş fırçanızı sıvıya batırmak isterseniz, artık tekrar kullanılamaz. Bu nedenle, "daldırmak" istiyorsanız, tüm karışımınızı kirletmeyin. Bunun yerine, solüsyonun bir kısmını küçük bir bardağa dökün ve fırçalarken diş fırçanızı bu sıvıya 3 veya 4 kez batırarak devam edin, ardından kalan "daldırma" solüsyonunu atın. Miktarı ikiye katlayın (10

Machine Translated by Google

Günde bir porsiyon oluşturmak için 1/2 fincan [4 ons/120 ml] suya aktifleştirilmiş MMS damlaları.

Bu çözümü güne uydurursanız DMSO ekleyemezsiniz. DMSO, kullanımdan hemen önce eklenmelidir, çünkü zamanla MMS çözümünüzü zayıflatacaktır.

2. Cildinize Püskürtme

Bu Sağlık Kurtarma Planı sırasında, cilt kanseri, egzama, sedef hastalığı, enfeksiyonlar veya yaralar vb. gibi herhangi bir cilt probleminiz varsa, MMS ile cilde veya yaraya püskürtme yapmak çok yardımcı olur. Bu protokolü HRP'nin (Sağlık İyileştirme Planı) temel adımlarında listeledim, çünkü cilt sorunlarının, sağlığınızı iyileştirmeye başlarken hemen cildi püskürtmekle başlaması önemlidir. Bu sprey şişesinin kullanılması, aynı zamanda, cildin genel durumuna ve daha birçok duruma yardımcı olmak için yaralar veya çürükler gibi her tür izole cilt probleminde de faydalıdır. Diğer protokollerde olsanız da olmasanız da hayatınızın geri kalanında cilt problemlerinde kullanılabilir. MMS spreyi cildinizi soktuğunda veya yaktığında, Küf/ Mantar Protokolü'ne gidin ve küf/mantar harici prosedürü ile ilgili bölümü kontrol edin (bkz. sayfa 106).

MMS1 Sprey Şişesi

q Standart sprey şişesi formülü 10 ila 1'dir. Yani, 1 ons/30 ml suya 10 aktifleştirilmiş MMS damlası.

Çözeltiye klor, florür veya diğer yabancı maddeleri bulaştırma riski olmadığından, hiçbir MMS karışımı için musluk suyu kullanmayın. Yalnızca şişelenmiş içme suyu, ters ozmoz veya damıtılmış su kullanın.

q Çoğu yerde 2 onsluk veya 4 onsluk sprey şişeleri eczanelerde veya sağlıklı gıda mağazalarında bulunur.

Machine Translated by Google

Basitçe formülü çarpın, 20 damla MMS1 ila 2 ons su veya 40 damla MMS1 ila 4 ons su.

q Genel olarak bu karışım bir hafta kadar dayanır. Orijinal renk gözle görülür şekilde solmaya başladığında gücünü kaybettiğini anlayacaksınız.

q Sprey şişenizi güneş ışığına maruz bırakmayın; karanlık bir yerde saklamak MMS1 çözümünün güçlü kalmasına yardımcı olacaktır.

q Cildinizdeki tüm sorunları püskürtmek için bunu kullanın.

q MMS1 sprey şişesini yüzünüzde kullanırken, gözünüze değdirmeyin .

İpucu: Yüzünüze biraz püskürtebilir ve ardından üstüne biraz DMSO (dimetil sülfoksit, bkz. Bölüm 4) püskürtebilir veya hafifçe vurabilirsiniz. Kırışıklıkları hafifletmek için yüzünüzü hafifçe ovun. DMSO genellikle MMS spreyini vücudun herhangi bir yerinde daha etkili hale getirir. Yüzünüze hem MMS1 hem de DMSO püskürtürken gözünüze değdirmeyin .

Varyasyon: 10'a 1 MMS1 sprey şişesiyle sonuç görmüyorsanız, sprey solüsyonunuzun gücünü 1 ons/30 ml su başına 50 etkinleştirilmiş MMS damlasına kadar artırabilirsiniz. Her zaman 1 ons/30 ml başına 10 etkinleştirilmiş damla (MMS1) ile başlayın ve sizin için en iyi olanı görmek için damlaları artışlarla artırın.

MMS1 sprey solüsyonu, ne kadar zayıf veya güçlü olursa olsun, soktuğunda ve/veya yandığında, büyük olasılıkla bir tür mantarın mevcut olduğunun bir göstergesidir. Bu durumda, arıtılmış su ile durulayın ve Küf/Mantar Protokolü'nde (sayfa 106-107) açıklanan kil ve Vazelin merhemini uygulayın.

Machine Translated by Google

MMS2 Sprey Şişesi

MMS2'yi sprey şişesinde kullanan birçok kişiden cilt için olumlu sonuçlar veren geri bildirimler aldık. Hem MMS1 hem de MMS2 cilde çeşitli şekillerde yardımcı olur, bu yüzden ikisini de deneyin ve sizin için en iyi olanı görün. MMS2 ve MMS1'in sprey şişesinde kullanıldığında aşağıdaki talimatlarda bazı farklılıklar olduğunu lütfen unutmayın .

q Temiz, kuru bir sprey şişesine (2 ons/60 ml veya 4 ons/120 ml boyutunda bir şişe işe yarar) yeteri kadar MMS2 tozu (kalsiyum hipoklorit) ekleyin ve sadece şişenin altını kaplayın.

q Şişenin geri kalanını arıtılmış, damıtılmış veya ters ozmoz suyuyla doldurun.

q MMS2 tozunu çözmek için iyice çalkalayın.

q Ardından MMS2 solüsyonunu temiz bir kağıt kahve filtresinden temiz ve kuru bir bardağa koyun. (Mümkünse ağartılmamış kahverengi kağıt kahve filtreleri kullanın.) MMS2 genellikle kolayca çözülmeyen küçük topaklar içerir ve süzülmezse sprey şişenizi tıkar.

q MMS2 solüsyonunu sprey şişesine geri koymadan önce, püskürtücünüzü tıkayacak topaklar olmadığından emin olmak için şişeyi temiz arıtılmış suyla iyice duruladığınızdan emin olun.

q MMS2 sprey şişesini yüzünüzde kullanırken gözünüze değdirmeyin .

Not: MMS1 sprey şişesinden farklı olarak, yanıklara neden olabileceğinden DMSO'lu bir MMS2 sprey şişesi kullanmayın.

Machine Translated by Google

Bölüm 6
Anahtar Protokoller

Başlatma Prosedürü

Bu Başlatma Prosedürü 1000, 1000 Plus, 2000 veya 3000 Protokolleri uygulanmadan önce yapılmalıdır. Bu prosedür olmadan bazen ilk hafta içinde mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı yorgunluk yaşayan insanlar olduğu için bu prosedür size daha fazla başarı sağlayacaktır. Böylece Protokol 1000'i başlatıyor. Birçoğu ısrar etmek yerine hemen vazgeçiyor. Onları suçlayamazsın; MMS'in ne kadar harika olduğunu duydular ve sonra kendilerini kötü hissettirdiler, bu yüzden pes ettiler. Bunun nedeni, protokollerine başlamak için çok hızlı bir şekilde çok fazla MMS1 almaya başlamalarıdır. Lütfen bu Başlangıç Prosedürünün sağlığınızın iyileşmesi için sizin için son derece önemli olduğunu söylediğimde bana inanın. Vücudunuzun yavaş yavaş MMS'e alışmasına yardımcı olduğu için gereksiz hastalıklardan kaçınmanıza yardımcı olab

Başlatma Prosedürü, başlamak için çok düşük dozlarda MMS1 almayı ve dört günlük bir süre boyunca yavaş yavaş 1 damla doza kadar çalışmayı içerir. (Bu kuralın bir istisnası vardır, sayfa 82'deki varyasyona bakın.) MMS1 hastalığı öldürmeye çalışır, ancak çok hızlı giderseniz, ölü patojenlerden (herhangi bir hastalık üreten ajan) gelen zehirler vücutta olduğundan daha hızlı birikir. vücut onlardan kurtulabilir. Bu zehirler esas olarak mide bulantısı, kusma veya ishale neden olabilir ve bazen aşırı yorgunluk gibi başka rahatsızlıklar da yaşanabilir. Bu, tanımında açıklandığı gibi bir Herxheimer reaksiyonu olarak adlandırılır.

Machine Translated by Google

sayfa 6'daki terimler. Umarım, Başlatma Prosedüründen geçmek, bir Herxheimer reaksiyonunu önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Başlatma Prosedürü için Talimatlar

Birinci gün

Başlangıç Prosedürünün ilk günü, sekiz saat boyunca her saat 1/4 damla aktif MMS alır. Bir damlayı dörde bölemeyeceğiniz için, aşağıdaki adımlar dozu nasıl yapacağınızı açıklar. Unutmayın, boş, temiz, kuru bir bardak kullanın. Tüm MMS1 dozları 1/2 su bardağı su ile alındığından bardağınızı 1/2 su bardağı (4 ons/120 ml) noktasında işaretlemeniz veya bu ölçü ile bir bardak kullanmanız faydalı olacaktır.

Aşama 1

q Karıştırma a'daki talimatlara göre 1 damla MMS'i etkinleştirin.
MMS1'in Temel Dozu (sayfa 32).

Adım 2

q Bardağı 1/2 fincan (4 ons/120 ml) işaretine kadar suyla doldurun.
Damlaların suya karıştığından emin olun.

Not: Bazı meyve suları ve gazlı içecekler kabul edilebilir; 42-45. sayfalara bakın.

Aşama 3

q Bu su karışımının 1/4 veya 1 ons/30 ml'sini dökün
başka bir bardağa alıp için.

Machine Translated by Google

Not: Bu 1 ons/30 ml'yi içmeden önce, içmeden önce tadı seyreltmek isterseniz, biraz daha su ekleyebilirsiniz (en fazla bir veya iki ons).

q Fazladan 3 ons/90 ml'yi atın. Onları kullanmayacaksın. Her saat başı yeni bir içecek hazırlamanız gerekir; aksi takdirde doz etkisini kaybeder. Her MMS1 dozu taze olarak oluşturulmalıdır - damlalarınızı karıştırın ve 30 saniyeye kadar sayın, ardından su ekleyin ve için.
İçmeden önce 60 saniyeden fazla beklememeye özen gösterilmelidir.

İkinci ve Üçüncü Gün

Başlangıç Prosedürünün ikinci ve üçüncü gününde, günde sekiz saat boyunca her saat 1/2 damla MMS1 alın .

4. Adım

q Adım 1 ve 2'yi (yukarıdaki birinci günden itibaren) her saatte bir uygulayın, ancak bu sefer karışımın 1/2'sini (bu 2 ons/60 ml olacaktır) dökün ve için ve diğer yarısını atın.
Bu size 1/2 damla verir.

Dördüncü gün

Başlatma Prosedürünün dördüncü gününde, sekiz saat boyunca her saat başı 3/4 damla MMS1 alın.

Adım 5

q 1. ve 2. adımları izleyin (yukarıdaki birinci günden itibaren). Bu durumda 1 ons/30 ml sıvıyı atmak ve kalan 3 ons/90 ml sıvıyı içmek en kolayı olacaktır. Başka bir deyişle, 1. ve 2. adımlarda yaptığınız 1/2 fincan (veya 4 ons/120 ml) karışımın 3/4'ünü içiyorsunuz ve bu size 3/4'lük bir damla doz veriyor.

Machine Translated by Google

6. Adım

q Dördüncü günün sonunda Protokol 1000'e Başlama Prosedürünü tamamladınız. Ertesi gün (beşinci gün), 84. sayfadaki talimatlara göre Protokol 1000'e başlamalısınız.

Not: Çok hasta bir kişi olması durumunda , Başlatma Prosedürüne yukarıda önerilen 1/4-damla dozdan daha az bir dozla başlayın. Aşırı derecede hasta bir kişi için, sekiz saat boyunca (bir gün boyunca) her saat başı 1/8 damla ile başlayın, ardından Başlatma Prosedürünü ve ardından Protokol 1000'i yapın.

Başlangıç Prosedürü için Varyasyon–Hızlı İzleme

MMS1'e aşina olan ve daha önce kullanmış olanlarınız için, Başlatma Prosedürünü daha hızlı geçmek istediğinizi düşünüyorsanız; bu varyasyon sadece zamanı yarıya indirir. Ancak, MMS almanızdan bu yana yaklaşık sekiz aydan uzun bir süre geçmişse, bu hızlı izleme yöntemini önermiyoruz. (Günlük bir MMS idame dozu almaya alışkınsanız [bkz. sayfa 200] ve tam bir MMS protokolü başlatmak istiyorsanız, yine de bu hızlı takip versiyonunu kullanarak Başlangıç Prosedürü ile başlamanızı tavsiye ederim.) Her durumda, önce bu yöntemle ilerlerken unutmayın, vücudunuzun nasıl tepki verdiğine dikkat edin, kendi hızınızda gidin ve tekrar mide bulantısı, kusma veya ishal olursa dozu hemen yarıya indirin ve sayfadaki mide bulantısı ile ilgili talimatları izleyin. 50. Başlatma Prosedürünü hızlı bir şekilde takip etmek için, dozlama süresini aşağıdaki gibi yarıya indirmeniz yeterlidir:

Machine Translated by Google

Birinci Gün—Hızlı İzleme

q Sekiz saat yerine dört saat boyunca 1/4 damlalık bir doz alın.
saat.

q Dört saatin sonunda, birinci günün kalan dört saati için 1/2 damla dozu
artırın.

İkinci Gün—Hızlı İzleme

q Dört saat boyunca 1/2 damlalık bir doz alın.

q İkinci günün kalan dört saati için dozu 3/4'lük bir doza yükseltin.

Üçüncü Gün—Hızlı İzleme

1 damlalık bir dozla başlayarak Protokol 1000'e başlayın.
Protokol 1000 talimatlarını izleyin.

MMS'in Üç Altın Kuralı

1. Bozulmadıysa, tamir etmeyin! İyileştiğiniz sürece, yaptığınız şeyi değiştirmeyin - işe yaradığı çok açık olduğu için ona devam edin.

2. Vücudunuz en iyisini bilir... Sadece onu dinlemeyi öğrenmeniz gerekir! Mide bulantısı, ishal, kusma veya aşırı yorgunluk hissettiğinizde ve/veya hastalığınızın size neden olduğundan daha kötü hissettiğinizde, MMS alımınızı yarı yarıya azaltın ve daha sonra hastalık geçtiğinde yavaş yavaş toparlayın. Kendinizi daha kötü hissettiğinizde dozunuzu artırmaya devam etmek yaygın bir hatadır. Bunun sana olmasına izin verme! Fazlası her zaman için iyi değildir. Vücudunu dinle!

3. Bir telaş içindeyseniz, değişim zamanı! Bir çıkmaza mı geldiniz? Beş ila altı günlük bir süre geçerse ve

Machine Translated by Google

herhangi bir gelişme belirtisi görmüyorsanız ve yanlış bir şey yapmadığınızı kontrol ettiniz, (bkz. Gerçeklik Kontrolü, Bölüm 8), bir sonraki seviyeye geçin. Nerede olduğunuza bağlı olarak, dozunuza bir damla daha ekleyin, bir sonraki artışı yapın veya bir sonraki protokole gidin ve/veya HRP'de listelendiği gibi bir Destekleyici Protokol ekleyin.
Ne zaman ilerlersen ilerle, zaten yapmakta olduğun şeyi yapmaktan vazgeçme. Ekleyin ama almayın.

Kısaca...

MMS'in Üç Altın Kuralı

1 İyileşiyor musunuz? Hiçbir şeyi değiştirme.
Yaptığınız şeye devam edin.

2 Daha kötü mü hissediyorsunuz? MMS alımınızı azaltın %50.

3 İyileşmiyor/kötüleşmiyor mu? İyileşme belirtisi yoksa, bir sonraki artışı yapın veya HRP'ye göre bir sonraki protokole geçin.

Protokol 1000

Bu protokolün tek başına Hepatit A, B ve C, HIV/AIDS, artrit, asit reflü, böbrek hastalığı, herhangi bir sayıda ağrı ve sızı gibi çok çeşitli hastalık ve rahatsızlıkları olan kişilere sağlığı geri kazandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. idrar yolu enfeksiyonları, depresyon, diyabet ve liste uzayıp gidiyor. Protokol 1000 aynı zamanda, vücudun genellikle sahip olduklarının farkında bile olmadığı istenmeyen toksinlerden kurtulmak için iyi bir genel temizlik için de yararlıdır.

Birçok insan, Protokol 1000'i uyguladıktan sonra, herhangi bir önemli sağlık sorunu yaşamadıklarını gerçekten hissetmediklerini bildirmektedir.

Machine Translated by Google

kendilerini çok daha iyi hissettiler—Protokol 1000'i tamamladıktan sonra daha fazla enerji ve canlılığa, daha net düşünmeye ve genel olarak daha sağlıklı hissettiler.

Burada verilen talimatlar orijinal ve benim adlandırmayı sevdiğim Klasik Protokol 1000 içindir. Daha fazla araştırma yaparsanız, biz ve diğer birçok insanın yıllar boyunca Protokol 1000'in çeşitli versiyonlarını denediğimizi göreceksiniz. Protokol 1000'in küçük varyasyonlarının çoğu başarılı olmuş olsa da, dünyanın dört bir yanından aldığımız raporlara göre, başarı hiçbir zaman dozu her saat taze karıştırmanın orijinal protokolü kadar iyi olmamıştı.

Protokol 1000, 4 ons/120 ml su içinde (42-45. sayfalarda açıklandığı gibi bazı meyve suları kabul edilebilir) maksimum 3 damla aktif MMS (MMS1) almaktır. üç hafta veya iyi olana kadar. Saatte 3 damla ile başlanmaz. Bu kitapta belirtildiği gibi ve MMS'in Üç Altın Kuralına uyarak 3 damlaya kadar yavaş yavaş biriktirmeye çalışıyorsunuz.

Unutmayın, vücudunuz damla artışını tolere etmezse, sizin için en iyi olanı seçin. Sağlığınız, her dozda 3 damladan daha az alarak iyileşebilir.
Bazı insanlar, saatte 1 veya 2 (hatta daha az) damla alarak sağlığına kavuşmuştur.

Yavaş başlamak ve 3 damla dozu artırmak en iyisidir.
Başlatma Prosedürünü tamamlamadan Protokol 1000'i başlatmayın. Başlatma Prosedürünü bitirdikten sonra, Protokol 1000'i saatte 1 damla ile başlatıyoruz ve önerilen saatte 3 damla dozuna kadar çalışıyoruz.

Machine Translated by Google

Protokol 1000 için Talimatlar

Aşama 1

q Temiz, kuru bir bardakta 1 damla MMS'i Temel MMS Dozunu Karıştırma, sayfa 32 bölümündeki talimatlara göre etkinleştirin.

q 1/2 su bardağı (4 ons/120 ml) su veya önerilen diğer karıştırıcıyı ekleyin.

Adım 2

q 1 damla dozunuzu aldıktan sonra bir dakika içinde içiniz. karıştırma.

Aşama 3

q olana kadar her saat başı 1 damla doz almaya devam edin. damlalarınızı artırmaya hazır.

4. Adım

q Üç veya dört saat sonra mide bulantısı sorunu veya daha kötü bir his yoksa, dozunuzu en az 1/2 damla artırın. Kendi hızınızda ilerleyin (hastalığınızdan daha fazla hastalanmadan), ancak her saat başı 3 damla olacak şekilde istikrarlı bir şekilde artırın. Örneğin, bir kişi ilk güne iki ila üç saat boyunca 1 damlalık bir dozla başlayabilir ve daha sonra birkaç saatliğine 1-1 / 2 damlaya ve ardından birkaç saatliğine 2 damlaya çıkabilir. ve benzeri. Diğerleri, ilk gün boyunca her saat başı 1 damla, ertesi gün her saat başı 2 damla ve bu şekilde devam etmek isteyebilir. Bazıları, yükselmeden önce birkaç gün boyunca her saat başı 1 damla dozda kalmayı gerekli bulabilir.

Machine Translated by Google

Adım 5

21 gün boyunca, günde sekiz saat, her saat başı 3 damla doz almaya devam edin. Başka bir aksamadan iyileşebilirsiniz, ancak herhangi bir zamanda mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı yorgunluk hissederseniz, aldığınız damla miktarını en az yarı yarıya azaltın. Unutmayın, azaltın ama durmayın.

(Biraz gevşek dışkı veya ishal temizlenme sürecinin bir parçası olarak kabul edilebilir, ancak çok fazla olursa veya mide bulantısı ve kusmanız varsa hemen azaltın. Hasta Hissetmek, sayfa 50 bölümündeki talimatları izleyin.) MMS'in Üç Altın Kuralına uyduğunuzdan emin olun.

Notlar

Ü Protokol 1000'deyken asla her saat başı 3 damla dozunu aşmayın.

Ü Bu semptomları yaşarsanız mide bulantısı, ishal, kusma veya aşırı yorgunluk hissetmek hoş olmasa da, genellikle vücudunuzun detoksifikasyon sürecinden geçtiğinin bir işaretidir - yani bu açıdan olumludur. Ancak amaç, kendinizi hasta etmemeniz için çok hızlı değil, sabit bir hızda gitmektir.

Ü Üç haftadan daha kısa bir süre içinde sağlığınıza kavuşursanız, 21 günlük sürenin tamamı boyunca Protokol 1000'e devam etmenizi öneririm. Bu, detoksifikasyon sürecini tamamlamaya yardımcı olacaktır.

Protokol 1000 Artı

Protokol 1000 Plus, saatlik dozlamanıza DMSO (dime til sülfoksit) eklenmesini gerektirir. Devam etmeden önce

Machine Translated by Google

bu protokolle, lütfen bu kitaptaki Bölüm 4'ü baştan sona okuyun ve/veya aşina olun.

Bu protokol, saatte 3 aktif damla (veya bazen daha az) olan MMS1 Protokolü 1000 dozuna basitçe DMSO eklemektir. Protokol 1000 Plus ile, her MMS damlası için 3 damla DMSO eklersiniz. Veya bu zamana kadar saatte 3 damlaya ilerlemediyseniz, aldığınız aynı miktarda MMS1'e devam edin ve buna göre DMSO'yu ekleyin. Örneğin, 3 damlalık bir MMS1 dozu alıyorsanız, 9 damla DMSO eklersiniz.

2 damla MMS1 dozu alıyorsanız, 6 damla DMSO eklersiniz.

Protokol 1000 Plus için Talimatlar

Aşama 1

q 3 damla MMS'i etkinleştirin. (Bulantı vb. nedenlerle henüz 3 damla doza kadar çalışamadıysanız, ne kadar damla alıyorsanız o kadar etkinleştirin.)

q 1/2 su bardağı (4 ons/120 ml) su (veya uygun sıvı; 42-45, 56. sayfalara bakın).

Adım 2

q Suyu ekledikten hemen sonra, kullandığınız her MMS1 damlası için 3 damla DMSO ekleyin. Örneğin, 3 damla MMS1 dozu yapıyorsanız 9 damla DMSO ekleyin. (DMSO'yu karıştırarak iyice karıştırın.)

q DMSO eklendikten hemen sonra dozu azaltın.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Dozunuza DMSO ekledikten sonra rahatsızlık hissederseniz (mide bulantısı, ishal vb.), bir sonraki dozda eklediğiniz DMSO miktarını azaltın.
1 damla MMS1 başına 3 damla DMSO eklemek yerine, 2 damla DMSO'yu 1 damla MMS1'e düşürün.
Hala rahatsızlığınız varsa, DMSO'yu bir damla daha azaltın, diğer bir deyişle, 1 damla MMS1 için 1 damla DMSO kullanın. DMSO miktarını 2 kat azalttıktan sonra hala rahatsızlık hissediyorsanız, bir gün boyunca MMS1 dozlarınıza DMSO eklemeyi tamamen bırakın. Daha sonra küçük dozlarda DMSO ile başlayın ve 1 damla MMS1 başına 3 damla DMSO'ya kadar yavaşça biriktirin.

Notlar

Ü MMS1/DMSO dozunu hemen içmenin önemli bir nedeni, DMSO'nun dozun etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlamasıdır. Tam gücü kaybetmek altı saat kadar sürer; yine de, gücünü kaybetmemesi için hemen içmek en iyisidir. DMSO damlaları ekledikten sonra bir dakika içinde içmenizi öneririm, çünkü ilk on dakikada büyük miktarda güç kaybeder ve daha sonra daha yavaş bir hızda güç kaybetmeye devam eder.

Ü Protokol 1000 Plus'tan Protokol 2000'e geçerken, Protokol 2000'i yaparken her zaman burada Protokol 1000 Plus'ta verilen talimatlara göre DMSO kullanmaya devam edin, yani her 1 damla MMS1 için doza her zaman 3 damla DMSO ekleyin.

Protokol 2000

Protokol 2000, özünde bizim Kanser Protokolümüzdür, ancak buna "Kanser Protokolü" adını vermiyoruz çünkü aynı zamanda yaşamı tehdit eden diğer birçok hastalık için de işe yarıyor. ben

Machine Translated by Google

Protokol 2000'i sadakatle kullanan ve burada belirtildiği şekilde kullanma sorumluluğunu üstlenenlerin %90'ından fazlasının kanserlerini veya diğer hastalıklarını tamamen yendiğini gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte, MMS1 ve MMS2'nin bile yardım edemeyecek kadar ileri giden kanser ve diğer hastalıklar olduğunu da belirtmeliyim. Normalde bunlar muazzam miktarda kemoterapi, radyasyon veya cerrahi tedavi görmüş vakalardır ve vücut basitçe "geri dönüşü olmayan noktayı geçmiştir". Ancak asla asla demiyoruz. Kişinin yaşamak için hala bir saati daha varsa, ona biraz MMS1 verin. Aşırı koşullara sahip insanlara yardım etme konusunda daha fazla bilgi için 249. sayfaya bakın.

Protokol 2000'de şunları yapacaksınız:

- Her saat aldığınız damla sayısını, MMS nedeniyle hastalanmadan kaldırabileceğiniz kadar (ağırlığınız için maksimum damla miktarına kadar - bkz. sayfa 92) artırın. Çoğu durumda, kanser ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıklar için damlalardaki artış gereklidir.

- Dozunuzu aldığınız saat sayısını artırın her gün sekiz ila on saat.

- Protokol 2000'in üçüncü veya dördüncü gününün başında, MMS1'e ek olarak MMS2 almaya başlamalısınız.

Hatırlanması gereken en önemli şey, iyileşene kadar MMS almayı asla bırakmamaktır. Sağlığınız tamamen iyileşene kadar, Sağlık İyileştirme Planında açıklandığı gibi Protokol 2000'de ve gerekli Destekleyici Protokollerde kalın.

Not: Protokol 1000 Plus'tan Protokol 1000 Plus'a geçerken Protokol 2000, yaparken her zaman Protokol 1000 Plus'ta verilen talimatlara göre DMSO'yu kullanmaya devam edin.

Machine Translated by Google

Protokol 2000, yani her 1 damla MMS1 için doza 3 damla DMSO ekleyin.

Protokol 2000 için Talimatlar

Aşama 1

q Protokol 1000'deki günde sekiz saat yerine, bir kişinin saatlik dozu aldığı günlük saat sayısını günde on saate çıkarın.

Adım 2

q Günlük dozunuzdaki damlaları 1 damlalık artışlarla artırmaya başlayın. Örneğin, Protokol 1000'e göre saatte 3 damla alıyorsanız, 4 damlaya yükseltebilirsiniz.

q Sağlığı İyileştirme Planı (HRP), kuralın bir istisnasına izin verir, (bkz. sayfa 70). Bu kategoriye girerseniz ve bu nedenle kanser veya yaşamı tehdit eden başka bir hastalık nedeniyle doğrudan Başlangıç Prosedüründen Protokol 2000'e gelirseniz, saatte 1 damla ile başlayın ve sadece birkaç saat sonra damlaları saatte 1 damla ile artırın. saat. Hissetme şeklinizden saat başına bir damla daha eklememeniz gerekip gerekmediğini anlayabilirsiniz. Hastalığın size hissettirdiklerinin ötesinde küçücük bir hastalıklı his, şu an için artışın durduğunu size bildirene kadar, saatte 1 ilave damla artırmaya devam edin. Bazı insanlar daha hızlı ilerleyebilir, bazıları geçemez, lütfen MMS'in Üç Altın Kuralına dikkat edin.

q Hastalığınızın size hissettirdiğinden daha kötü hissetmenize izin vermemeniz önemlidir, çünkü ek hastalık daha sonra iyileşmenizi yavaşlatabilir.
Bu nedenle, MMS dozunuzu almak mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı yorgunluğa neden oluyorsa, dozunuzu azaltın.

Machine Translated by Google

Bir sonraki doz için aldığınız damlaları %50 oranında azaltın, MMS1 hala sıkıntı yaratmaya devam ediyor gibi görünüyorsa, dozu aldığınız dozun %50'si kadar daha azaltın. Aldığınız MMS1 miktarı konusunda kendinizi rahat hissettiğinizde, damlaları tekrar yavaşça artırın. Eklenen hastalık şiddetliyse, geçici olarak damlaları tamamen bırakın ve kendinizi daha iyi hissettiğinizde tekrar başlayın. Ve yine, kendinizi olduğunuzdan daha kötü hissetmeden alabileceğiniz kadar artırın.

Aşağıdaki çizelge, çoğu insanın vücut ağırlığına göre alması gereken teorik maksimum damla miktarını vermektedir. 200 pounddan daha ağır olan herkes, 200 poundun üzerindeki her 20 pound için 1 damla ekleyerek maksimum damla sayısını hesaplayabilir. Bir kanserin iyileşmediği ve burada önerilenden daha fazla saat başına daha fazla damla alabileceği zamanlar vardır, bu durumda bunu yapmaktan çekinmeyin, ancak normalde bu çizelge doğrudur. Unutmayın, MMS'in Üç Altın Kuralına uyun. Bazı insanlar bu miktarların yakınında hiçbir yere ulaşamayacak. Bunlar maksimum miktarlardır—hedef değildir.

Protokol 2000 —Maksimum MMS1 Dozu	
Ağırlık	Dozaj
80-100 lb (36-45 kg)	Saatte 8 damladan fazla almayın
100-120 lb (45-54 kg)	Saatte 8 damladan fazla almayın
120-140 lb (54-63 kg)	Saatte 9 damladan fazla almayın
140-160 lb (63-72 kg)	Saatte 10 damladan fazla almayın
160-180 lb (72-81 kg))	Saatte 11 damladan fazla almayın
180-200 libre (81-90 kg)	Saatte 12 damladan fazla almayın
200 lbs (90 kg) ve üzeri: Her ek 20 libre (9 kg) için maksimum dozu 1 damla artırın	

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Protokolün üçüncü veya dördüncü gününde MMS2'yi almaya başlayın. (Kalsiyum hipokloritin nereden satın alınacağı ve MMS2 kapsüllerinin nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar için lütfen MMS2 —Ayrıntılar, sayfa 274 bölümünü okuyun.)

q Kullanmanız gereken en küçük 1 numaralı kapsülleri veya 1 numaradan bir beden büyük 0 numaralı kapsülleri kullanın. (Ve hayır, kapsül boyutlarında bir hata yapmadım; sayıyı artırdıkça boyutları gerçekten küçülür.) 1 numaralı kapsülleri 1/8 dolu veya #0 boyutlu kapsülü yaklaşık 1/16 dolu olarak yükleyerek başlayın. .

Kapsüller birbirinden ayrıldığında, bir taraf her zaman diğer taraftan daha büyüktür. Büyük tarafı doldurun (gevşek şekilde paketleyin). Ardından küçük tarafı takın ve yerine sıkıca bastırdığınızdan emin olun.

4. Adım

Adım 3 başlamanızı sağlar, ancak sonraki birkaç gün içinde kapsüle koyduğunuz miktarı artırın, 1 numaralı kapsül için tam veya 0 numaralı kapsül için 3/4 dolu olacak şekilde çalışın. Kapsül içine koyduğunuz miktarı yavaşça artırın.

Adım 5

q Bu kapsüllerden birini günde 5 kez, iki saatte bir alın.

q İlk MMS2 kapsülünüzü aldıktan yarım saat sonra alınız. günün ikinci MMS1 dozunuz.

Machine Translated by Google

Protokol 2000 için Örnek Zaman Çizelgesi, Bir Kez
Dozlamanıza MMS2 Eklenir

Protokol 2000 MMS2 Zaman Çizelgesi	
Zaman	Doz
09:00	MMS1 dozu
10:00	MMS1 dozu
SABAH 10:30	MMS2 dozu
SABAH 11:00	MMS1 dozu
ÖĞLEDEN SONRA 12:00	MMS1 dozu
ÖĞLEDEN SONRA 12:30	MMS2 dozu
01:00	MMS1 dozu
ÖĞLEDEN SONRA 2:00	MMS1 dozu
14:30	MMS2 dozu
15:00	MMS1 dozu
16:00	MMS1 dozu
ÖĞLEDEN SONRA 4.30	MMS2 dozu
17:00	MMS1 dozu
18:00	MMS1 dozu
ÖĞLEDEN SONRA 6.30	MMS2 dozu

Notlar

Ü MMS2'nin doğru boyuttaki kapsüllerine kadar çalışırken,
bu ya tam #1 boyutlu bir kapsül ya da 3/4 tam #0 boyutlu bir kapsüldür.
kapsül (asla bu miktarları aşmayın) ,
MMS1 dozları sabit. Başka bir deyişle, çalışmıyor
çalışırken MMS1 damlalarınızı artırma konusunda
uygun MMS2 dozunuza kadar, çünkü
mide bulandırıcı hangisi olduğunu belirleyemezsiniz
iki tanesi kendinizi hasta hissetmenize neden olabilir. sahip olduktan sonra
önerilen MMS2 miktarına ulaştıktan sonra
MMS1 damlalarınızı bir kez daha artırmaya başlayın.

Machine Translated by Google

Ü Unutmayın, ister MMS1 ister MMS2 miktarlarınızı artırıyor olun, herhangi bir zamanda artıştan mide bulantısı veya mide bulantısı hissediyorsanız, miktarı en az yarı yarıya azaltın ve yavaş yavaş tekrar artırın.

Ü Asla aynı anda DMSO ve MMS2 kapsülü içeren bir doz almayın! Bununla ilgili tam uyarı için 23-24. sayfalara bakın.

Protokol 3000

Ciddi veya yaşamı tehdit eden durumlarda amaç, mide bulantısı seviyesinin altında kalmaya çalışırken MMS1'in kanda hızla dolaşmasını sağlamaktır. Bunu başarmanın bir yolu, DMSO'yu MMS1 ile topikal olarak kullanmaktır. DMSO bir taşıyıcıdır ve bu nedenle MMS1'i doğrudan deriye ve dokulara ve dolayısıyla kana alır. Laboratuvar koşullarında, tehlikeli olmayan küçük miktarlarda radyasyon eklenerek yapılan testler, DMSO'nun MMS1'i doğrudan vücuttaki herhangi bir kansere taşıdığını ve ardından kanser hücrelerine nüfuz ettiğini göstermiştir. DMSO'nun ayrıca MMS1'i hastalığın o bölgeyi zayıflattığı vücuttaki herhangi bir yere taşıdığına dair kanıtlarımız var. (Daha fazla bilgi için Stanley Jacob'un kitabını tavsiye ederim: Dimethyl Sulfoxide (DMSO) in Trauma and Disease (Stanley W. Jacob ve Jack C. De La Torre). Ayrıca Hartmut PA Fischer'ın DMSO Handbook'u .)

Protokol 3000, günde en az sekiz saat süreyle her saat başı vücuda uygulanan DMSO ile karıştırılmış MMS1'in topikal kullanımıdır. Aşağıda açıklanan MMS1/DMSO prosedürü, MMS1'i kan plazmasına itmeye yardımcı olan hızlandırılmış bir cilt tekniğidir. Bu yöntem ayrıca bir Herxheimer reaksiyonunun önlenmesine yardımcı olur. Kanser veya yaşamı tehdit eden başka bir hastalık durumunda, Protokol 2000'in normal oral rejimine ek olarak kullanılmalıdır.

Machine Translated by Google

Protokol 3000 için Talimatlar

Aşama 1

q 10 damla MMS çözeltisini 10 damla %50 sitrik asit veya 10 damla %4 HCl asit ile karıştırın. Aktivasyon için 30 saniye sayın.

q 20 damla su ekleyin. Ancak bu karışım çok güçlüyse (cildin yanmasına veya başka tahrişlere neden oluyorsa), tahrişe neden olmayana kadar daha fazla su damlası ekleyin. Ekstra cilt hassasiyeti yoksa, daha güçlü bir karışımı tolere edip edemeyeceğinizi görmek için daha az su eklemek isteyebilirsiniz (bunu artışlarla yapın).

q 1 çay kaşığı/5 ml DMSO ekleyin.

q Karışımı hemen bir kol üzerine yayın. Karışımı yaymak için elinizi kullanabilirsiniz. (DMSO'yu uygulamadan önce tüm sabunu çıkarmak için ellerinizin yıkandığından ve iyice durulandığından emin olun .) Eldiven takmak gerekli değildir ve hatta potansiyel olarak tehlikelidir (lateks veya kauçuk ise). Bitirdiğinizde, elinizi sade suyla yıkayın, sabun ve suyla yıkamayın, çünkü DMSO bir taşıyıcıdır ve sabunun bir kısmını dokularınıza taşıyabilir.

Adım 2

q Bir sonraki saat, başka bir MMS1/DMSO solüsyonunu karıştırın ve diğer kolunuza yayın. Bir sonraki saati tekrarlayın ve vücudunuzun farklı bir bölümünü yapın. Önce bir kol, sonra diğer kol, sonra bir bacak, sonra diğer bacak, sonra mideniz ve sonra tekrar ilk kola ve bu şekilde devam edin. DMSO/MMS1 kombinasyonunu her uyguladığınızda vücudun farklı bir bölümünü kullanın. Bunu art arda sekiz saat boyunca her saat başı yapın.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Bu işlemi art arda üç gün boyunca art arda sekiz saat boyunca her saat başı tekrarlayın. (MMS1/DMSO uygulama saatini tamamladıktan sonra banyo yapmak veya duş almak iyidir. Son uygulamayı uyguladıktan sonra en az bir saat bekleyin. Sabun kullanmadan önce sade su ile iyice durulayın.)

4. Adım

q Sonra bir mola verin. DMSO'nun neden olabileceği (ekstra kuru cilt gibi) sorunların üstesinden gelmek için bir ila dört gün veya kaç gün sürerse bırakın.

Adım 5

q İlk haftadan sonra bu topikal uygulamayı haftada dört gün veya cildinizde bir sorun yoksa daha fazla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yoksa cilt tahrişi olmadığı sürece her gün MMS1 ve DMSO kullanmaya devam edin. Tahriş hissettiğinizde, bir süreliğine kesin veya karışıma daha fazla su ekleyebilirsiniz.

Not: MMS1/DMSO topikal uygulamasından dört gün çıktığınızda, yine de diğer MMS Protokollerinize devam etmelisiniz.

Varyasyonlar

Ü Alternatif bir yöntem, yukarıda bahsedilen MMS1 damlalarının aynı karışımını suya kullanmaktır, ancak bu karışımı önce vücuda yayın ve ardından DMSO'yu püskürtün (bkz. MMS1'in aynı alanda. Yavaşça cilde sürün. Bunu yapmak için temiz çıplak ellerinizi kullanabilirsiniz.

Machine Translated by Google

Bittiğinde ellerinizi sade su ile durulayın.
(Unutmayın, DMSO bir taşıyıcıdır, bu nedenle sabunla kullanmak sabunu sisteminize taşıyabilir, bu nedenle suyla durulayın ve kurulayın.)

Ü Daha küçük dozlarda DMSO alması gereken ekstra hasta kişiler için, vücudun sadece küçük bir bölgesini kullanarak başlamak en iyisi olacaktır. Avucunuzun büyüklüğünde bir alan kullanmanızı öneririm - daha büyük değil. Tüm kol veya bacak gibi daha büyük bir alana gitmeden önce birkaç gün bunun gibi küçük bir alan kullanın. Daha büyük bir alanı, yalnızca daha küçük alanda DMSO'ya karşı herhangi bir olumsuz reaksiyon yoksa kullanın.

Ü Veya bunun yerine karışıma fazladan su ekleyin. Yani, DMSO'yu ovmak için daha küçük bir alan kullanmak yerine, MMS1/DMSO solüsyonuna fazladan su ekleyin ve ardından bunu tüm kol veya bacak ve diğer bölgelere koyun.

Ü MMS1 ve DMSO'yu vücuda uygulamak için sprey şişeleri kullanmayı içeren bu Protokolü yapmanın daha uygun bir yolu vardır. Protokol 3000 için sprey şişesi yönteminin tüm ayrıntılarını bu kitabın 260. sayfasındaki çocuklar için bölümünde bulabilirsiniz. Çocuklar için aynı prosedür ve karışım yetişkinler için de kullanılabilir. Sprey şişesi yöntemi bazı insanlar için daha kolay olsa da, bu protokol için orijinal yöntemi, öğrenme adına ve şu ya da bu nedenle sprey elde edemeyen kişiler için yukarıda bıraktım. şişeler.

Uyarılar

Ü DMSO ile çalışırken lastik veya lateks eldiven veya diğer tıbbi eldivenleri kullanmayın. DMSO kauçuğu erittiği için vücudunuza kauçuk girebilir. Gerilmeyen plastik eldivenler, DMSO ile kullanılabilen bir tür plastiktir.

Machine Translated by Google

Ü Tam gücünü DMSO'dan uzak tutun. DMSO'yu ellerinizden yıkayana kadar DMSO'yu tutarken gözlerinize dokunmamaya dikkat edin.

Ü DMSO'yu uyguladıktan sonra cildinizde bir yanma hissederseniz, iyi bir teknik, yanan bölgeye bir çay kaşığı saf su koyup hafifçe ovmaktır. Yanmayana kadar su eklemeye devam edin.

Veya bu tür problemler için içinde sade su olan bir sprey şişesi kullanın, ancak suyu ovalayın.

Ü DMSO/MMS1 uygulamasından sonra cildinizde yanma veya tahriş hissederseniz, cildinizi yatıştırmak için zeytinyağı veya Aloe vera jeli ovalayabilirsiniz.

Not: DMSO'nun genel kullanımına yönelik güvenlik önlemlerinin tam listesi için lütfen 25-27. sayfalara bakın.

Küf/Mantar Protokolü

Küf birçok hastalığa katkıda bulunan bir faktör olabilir. Kalıp, bazı şaşırtıcı yerlere girebilir. Birçoğumuz küfü nemli veya nemli iklimlerle ilişkilendirsek de, gerçek şu ki küf, kuru iklimlerde bile hemen hemen her yerde bulunabilir. Küfle ilgili sorun, genellikle tespit edilmesinin zor olabilmesidir. Kişi küf nedeniyle hasta olduğunda, vücudu çeşitli şekillerde etkileyebilir ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Küf enfeksiyonlara neden olabilir; solunum yolunda hasara yol açarak her türlü akciğer sorununa, nefes almada güçlük, öksürük ve hırıltılı solunuma neden olabilir. Çeşitli cilt problemlerine, baş ağrılarına, depresyona, hafıza kaybına, görme problemlerine, alerjilere, sinüs ve burun problemlerine, kas ve eklem ağrılarına, sindirim bozukluklarına, bağışıklık sistemi rahatsızlıklarına, yorgunluğa ve çok daha fazlasına neden olabilir. Söylemeye gerek yok, küf, insanları çok hasta etmenin suçlusu olabilir.

Machine Translated by Google

Bazı koşullar altında küf/mantar vücudunuza hızla yayılabilir. Bazen sizi hasta eder, bazen de günler veya aylarca hissetmeyebilirsiniz. Hatta hiç hissetmeden gelip gidebilir.

Bununla birlikte, bunun üzerine bahse girmeyin, çünkü aylarca hatta yıllarca dayanabilir, sağlığınızı mahvedebilir ve sizi diğer birçok hastalığa karşı duyarlı hale getirebilir.

Küf bir mantar türüdür. MMS1 ve MMS2'nin öldürdüğü görünmeyen bazı mantar türleri olduğunu yıllar içinde öğrendim. Neden? Niye? tam olarak emin değilim. Ancak durum bu olduğunda, genellikle kilin sorunu çözeceğini buldum. Dolayısıyla, MMS ile istenen sonuçları alamıyorsanız, bu hastalığa küf/mantarın neden olduğunun bir göstergesi olabilir ve bu, protokolünüze kil eklemek için bir işaret olabilir. Şahsen ben de birçokları gibi bunu yaparken başarılı oldum. İşinize yarayacağını garanti edemem ama benim görüşüme göre, yukarıda açıklanan belirtilerden birini veya birkaçını yaşayan ve MMS ile başarılı olmayan biri varsa, kesinlikle kil eklemeyi denemeye değer. protokol ve sonuç getirip getirmediğine bakın. Kil size zarar vermemeli veya ilerlemenizi yavaşlatmamalıdır. Milyonlarca insan yüzlerce yıldır kil tüketiyor.

Küf/mantar hastalığın temelinde olduğuna ve MMS türlerinin yardımcı olmayacağına dair bazı belirtiler şunlardır:

- Sorun dış kaynaklıysa ve mantarın üzerine MMS püskürtülürse ağrılı hale gelir ve fena halde acımaya ve yanmaya başlar.

- MMS1 uygulandığında ağızda mantar varsa ağız batar ve yanar. (MMS'nin neden olduğu acıdan kurtulmak için ağzınızı soğuk suyla çalkalayın.)

- Küf dahili olarak ve çekerken sorun teşkil ediyorsa MMS sözlü olarak aşağı indikçe yanma yaşarsınız,

Machine Translated by Google

veya mide ekşimesi türü bir his, bu, dahili olarak küf/ mantar bulunduğunu gösterebilir.

Yukarıdaki reaksiyonlar meydana gelirse, bu Küf/Mantar Protokolü, kil ilavesiyle durumu düzeltebilir. Kil, her delikte güçlü bir elektrik yükü olan milyonlarca küçük deliğe sahiptir. Mikroorganizmalar, yükün çekiciliği ile deliğe çekilir ve deliğe hapsolur.
Kil daha sonra mikroorganizmaları (canlı veya ölü) alarak vücuttan yıkanır. Aşağıda verilen prosedürün birçok insanda başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Bu protokol için kullanılmasını önerdiğim kilin birkaç adı var: Aztek kili, bentonit kili (kalsiyum bentonit tercih edilir veya montmorillonit kili (Fransa'dan).

Kilin Dahili Kullanım Talimatları

Bir MMS protokolünde bulunmadıysanız, bu Küf/Mantar Protokolüne başlamadan önce Başlatma Prosedürünü (sayfa 79) yapın. Dört gün içinde Başlatma Prosedürünü tamamladıktan sonra, beşinci gün doğrudan bu protokole gidin. Halihazırda bir MMS protokolü kullanıyorsanız ve bu protokolün 1. ve 2. Adımlarını yaparken MMS rutininize kısa bir süreliğine kil eklerken Küf/Mantar Protokolünü yapmak için birkaç gün durmanız gerektiğini düşünüyorsanız, MMS dozlarınızı o sırada yapıyor olursanız olun protokole göre almayı bırakın (Proto cols 1000, 1000 Plus, 2000 veya 3000) .

Aşama 1

- Kil almanın birinci gününde, her doz iki saat arayla 5 doz kil alın.

- Kil dozu 1 ve 2: 1/2 fincan (4 ons/120 ml) suya 1/2 çay kaşığı (2.5 ml) kil ekleyin. En iyisi

Machine Translated by Google

kili suya serperken suyu karıştırmaya devam etmek için. İç şunu. Yavaşça içmekte sorun yok ama karıştırmaya devam edin.

Kil dozları 3, 4 ve 5: 1/2 fincan (4 ons/120 ml) suya 1 seviye çay kaşığı (5 ml) kil ekleyin. Su ile iyice karışana kadar yukarıda belirtildiği gibi karıştırın. İç şunu. Yavaşça içmekte sorun yok, ancak kil hızla bardağın dibine çökeceğinden karıştırarak tutmakta fayda var.

Adım 2

q Kili aldığınız ilk günden sonra kendinizi iyi hissediyorsanız ve 5 doz kilden sonra fazladan bir mide bulantısı hissetmiyorsanız (hastalığınızla birlikte hissettiğinizden daha fazla hastalanmadıysanız), ikinci günde aşağıdaki Adım 3'e geçin. Ancak, normalden biraz daha kötü hissediyorsanız, yukarıda 1. Adımda açıklanan kil dozlarını bir gün daha içmeye devam edin, 5 doz alana kadar her iki saatte bir kil dozu alın, ardından Adıma geçin. 3. gün 3.

Aşama 3

Kile başlamadan önce MMS1 dozunuz ne olursa olsun, yukarıdaki Adım 1'de açıklanan kil içeceği değiştirin. (İlk saat MMS1 dozu, sonraki saat kil dozu, sonraki saat MMS1 dozu, sonraki saat kil dozu vb.) Örneğin, bu Küf/Mantar Protokolünü hemen sonra yapmaya başladıysanız. Başlangıç Prosedürünü bitirin, ardından bu adım için 1 damla dozla başlayın. Protokol 1000'de her saat 3 damla MMS1 alıyorsanız, bu dozu kil dozunuzla değiştirin. Veya, Protokol 2000'deyseniz, saatte 5 damla MMS1 dozu alıyorsanız, bu dozu kil dozunuzla değiştirin. Alternatif

Machine Translated by Google

sekiz saat boyunca her saat. Bu, her gün 4 doz MMS1 ve 4 doz kil olacaktır.

q İki gün boyunca değişen dozları uygulayın. Bu adımdaysanız ve iyileşme görüyorsanız, tamamen iyi olana kadar devam edin (bir çeşit gelişme olduğu sürece). Ancak, birkaç gün boyunca herhangi bir iyileştirme olmaksızın gittiğiniz bir noktaya ulaşırsanız, aşağıdaki Adım 4'e gidin.

3. Adım için Ek Önemli Bilgiler

Ü Protokol 1000 Plus kullanıyorsanız ve kil almaya başladığınız sırada MMS1 dozlarınıza DMSO ekliyorsanız, yukarıdaki 3. Adımı yaparken de MMS1 dozlarınıza DMSO eklemeye devam edebilirsiniz.

Ü Ancak Protokol 2000'deyseniz, kil aldığınız süre boyunca MMS2 ve yukarıdaki Adım 3'e göre MMS1 ile devam etmeyin—sadece kile başladığınızda aldığınız MMS1 miktarıyla devam edin. 5 damla doz, 7 damla doz vb.

4. Adım

Bu adımda kil ve MMS1'i aynı dozda alacaksınız. Kili bir MMS1 dozunda karıştırırken, gazlı maden suyu (karbonatlı su) kullanmanızı öneririm. Bunun nedeni, gazlı maden suyundaki karbonasyonun, kil ile karıştırıldığı için MMS1'i koruma ve koruma eğiliminde olmasıdır. Kil, zamanla MMS1'in gücünü en aza indirme eğilimindedir, ancak onu gazlı suyla karıştırarak, onu o kadar çabuk en aza indirmez.

MMS1 ile karıştırılmış kil almanın neden faydalı olabileceğini daha fazla açıklamak gerekirse: Küf neredeyse her zaman bağışıklık sisteminizi baskılayarak diğer patojenlerin tutunmasına izin verir. Bu durumda, diğer patojenlerin MMS1 tarafından üstesinden gelinemeyeceğine inanıyorum çünkü küf mevcut olduğunda

Machine Translated by Google

onlar için belirli bir miktarda “koruma” sağlar. Bu nedenle, küfü kil ile yok edersek, diğer patojenler “küf korumalarını” kaybettikleri için MMS1 onları da yok edebilir.

q Temiz ve kuru bir bardakta, 3. Adımda aldığınız damla miktarıyla aynı miktarda kullanarak MMS damlalarınızı etkinleştirin.

q Hemen 60 ml gazlı maden suyu (karbonatlı su), ardından 1 çay kaşığı kil ekleyin. Sıvıyı karıştırırken kili bardağa “serpmenin” yardımcı olduğunu düşünüyorum. Biraz köpürecek, bu sizi şaşırtmasın, yeteri kadar büyük bir bardak aldığınızdan emin olun ki taşmasın.

q Kil serpilip tamamen karıştırıldıktan sonra 2 ons/60 ml karbonatlı su daha ekleyebilirsiniz.

q Bu dozu mümkünse yavaş , beş yıllık bir süre boyunca içiniz. dakika.

q Bunu en az sekiz saat olmak üzere her saat başı yapın. Bir gün.

Notlar

Ü Kil, MMS1'in tadını maskeleme eğilimindedir, ancak tat sizin için hala bir sorunsa, bu belgenin 42-45. sayfalarındaki yönergelere göre Pepsi, Kola, Sprite vb. gibi meşrubatlar kullanabilirsiniz. kitap. (Portakallı soda kullanmayın.) Tercihim şeker içermediği için mümkünse gazlı maden suyu.

Ü Aynı içeceği karbonat içermeyen arıtılmış şişelenmiş su ile yapabilirsiniz, yine de yardımcı olacaktır, ancak karbonatlı su veya soda ile yapıldığındaki kadar güçlü olmayacaktır.

Machine Translated by Google

Adım 5

4. Adım sizi daha iyi hissettiriyorsa ve iyileştiğinizi hissediyorsanız, iyileştiğiniz sürece daha fazla gün devam edin, ancak iyileşmeyi durdurduğunuzda (veya kendinizi iyi hissediyorsanız) MMS1/kil dozlarını almayı bırakın. Eğer bir iç küf/mantar probleminiz varsa, protokolünüze eklenen kil onu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Normalde bu adımı uzun bir süre devam ettirmek gerekmez, genellikle birkaç gün sürer, ancak iyileşme gördüğünüz sürece devam ettiğinizden emin olun.

Notlar

Ü Çok küflü bir yerde yaşıyor veya çalışıyorsanız, küf sorununu ortadan kaldırana kadar en az 6 damla MMS1 ve 1/2 çay kaşığı kil ile kili almaya devam etmelisiniz. eviniz veya iş yeriniz.

Ü İyileştikten sonra günlük MMS1 idame dozlarına devam edebilirsiniz (bkz. sayfa 200). Öte yandan, iyileşme görmeyi bıraktıysanız ve böylece MMS1/kil dozlarını durdurduysanız ancak yine de kendinizi hasta hissediyorsanız, hangi protokolde olursanız olun (MMS1 ve/ veya MMS1 miktarını alarak) geri dönmek iyi bir fikir olabilir. Kili eklemeden önce aldığınız MMS2), başka bir süre için.

Bu, kilin yakalanmasına yardımcı olan ve hala vücuttan atılması gereken patojenleri veya toksinleri veya küf/mantarın "koruyabileceği" patojenleri veya toksinleri daha fazla temizlemek için olacaktır. Küfün gitmesine rağmen hala mevcut olan bazı zehir ve patojen kalıntıları olabilir, bu nedenle, iyi olduğunuzdan emin olana kadar eski protokole devam edilmelidir.

Ü Boğazda mukus ve/veya öksürük şikayetiniz varsa, kil dozlarınızı birkaç dakika içinde yavaş yavaş içmenizi ve kilin ağızda çalışması için zaman vermenizi öneririm.

Machine Translated by Google

aşağı inerken ağız, boğaz ve yemek borusu. Ayrıca yutmadan önce ağzınızda birkaç kez çalkalamak da iyi bir fikirdir.

Ü Kili dahili olarak alırken, kilin dışarı attığı toksinleri atabilmeniz için bağırsaklarınızın hareket ettiğinden emin olun. Kabızlık durumunda, Senna bitkisini en iyi çözümlerden biri olarak buldum. Doğaldır ve kolonu çalıştırır. Senna, sağlık gıda mağazalarında ve bazı ülkelerde eczanelerde tablet formunda (müshil olarak satılır) bulunabilir. Önerilen dozla başlayın ve başarılı olana kadar her dört saatte bir tablet sayısını artırın.

Ü MMS1 veya MMS2 bir hastalığa yardımcı olmuyor gibi görünüyorsa bunun küf/mantardan kaynaklanabileceğini yukarıda açıkladık. Ancak MMS ile başarılı olunamamasının başka nedenleri de vardır, lütfen Bölüm 8'i gözden geçirin).

Küf/Mantar Dış Prosedürü

Vücutta harici olarak ortaya çıkabilen birçok mantar türü vardır. Daha önce bahsedildiği gibi, MMS1'in mantarın üzerine püskürtülmesi veya başka bir şekilde uygulanması durumunda MMS1'in yardımcı olmayacağının bir göstergesi ortaya çıkar. Acı verici hale gelecek ve kötü bir şekilde yanmaya ve yanmaya başlayacak. Bu durumda, MMS1 aslında durumu daha da kötüleştirecektir ve aşağıda verilenler gibi başka bir hareket tarzı denemek en

Küf/Mantar Dış Prosedürü için Talimatlar

Aşama 1

q Eşit miktarda kil ile Vazelin Petrol Jelini iyice karıştırın. Petrol Jelly'nin alternatifleri hindistancevizi yağı, zeytinyağı veya başka bir kaliteli taşıyıcı yağdır. Karışımı, mantar bölgesine iyi yapışması için oldukça sert yapın.

Machine Translated by Google

Adım 2

q Bu merhemi mantarın üzerine sürün ve gazlı bezle örtün.
bandaj.

q Ayaklarınızda mantar varsa ayaklarınıza kil karışımı sürün, temiz
çorap giyin ve gerekirse ayakkabılarınızı giyin.

Aşama 3

q Her dört saatte bir bölgeyi yıkayın ve mantar geçene kadar karışımın
daha fazlasını uygulayın.

Notlar

Ü Cilt bölgesinin ne kadar hassas olduğuna bağlı olarak, bir Vazelin karışımını yıkamak ağrılı olabilir. Kil ile karıştırılmış Vazelin'in birkaç saat sonra cilde ıslanma eğiliminde olduğunu bulduk. Mümkünse çok yumuşak bir sabun, mümkünse doğal maddelerden yapılmış bir sabun (parfüm hassas ve hasarlı cildi tahriş etme eğiliminde olabileceğinden, parfüm içermeyenler en iyisidir) ve ılık su kullanın. Suyu bölgeye yavaşça dökün ve elinizle çok nazikçe masaj yapın. Temiz bir havlu veya gazlı bezle nazikçe kurulayın.

Ü Piyasada çeşitli markalarda Petrol Jelly bulunmaktadır. Bir merhem yapmak için kil ile karıştırmak için “Vazelin” markasını (% 100 saf olması için üç kez saflaştırılmış orijinal) öneririm. Vazelin, çoğu yağdan daha uzun süre cildi ıslatma ve nüfuz etme ve cilt üzerinde saatlerce daha uzun süre kalma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bazen hindistancevizi yağı, zeytinyağı ve diğer yağlar çeşitli tıbbi maddeleri cilde taşımak ve orada tutmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, hiçbir şey Vazelinin şifalı maddeleri cilt ile saatlerce temas halinde tutma ve aynı zamanda bir iyileştirici madde olarak hareket etme yeteneği ile karşılaştırılamaz. Diğer çeşitli yağları sadece Vazelin elde edemiyorsanız kullanın.

Machine Translated by Google

Önemli Bir İnceleme

HRP ve Anahtar Protokoller çeşitli seçenekler sunar. Kuralın (sayfa 70) istisnası vardır, burada gerekirse Protokol 2000'e daha hızlı geçebilirsiniz. Başlatma Prosedürü için bir hızlı yol seçeneği (sayfa 82) vardır. Protokol 2000'de maksimum dozaj miktarlarını bulacaksınız. Bütün bunlar, ne kadar çok MMS alırsa o kadar iyi olduğuna işaret ediyor gibi görünüyor. Bu mutlaka böyle değildir !

Her zaman hatırlayın, MMS'in Üç Altın Kuralına uymak zorunludur . Kendi vücudunuz size kişisel ideal dozunuzun ne olduğunu söyleyecektir. Çoğu insan asla maksimum dozaj miktarlarına yaklaşamaz. Bunlar maksimum miktarlardır—hedef değildir. Bu miktarlar bazıları için gerekli olabilir, ancak diğerleri için gerekli olmayabilir.

Bir hastalık için belirli bir miktarda MMS, diyelim ki Protokol 1000 için 3 damlalık bir doz alabilirsiniz. Ancak daha sonra yolun aşağısında bir ara, protokolü tekrarlamanız gerekirse, geçen yıl sorunsuz bir şekilde saatte 3 damla yapmış olsanız bile, saatte yalnızca 1 damla ile başa çıkabileceğinizi görebilirsiniz. Bu neden? Bedenlerimiz değişir; farklı tipte patojenler veya toksinler veya farklı miktarlarda patojenler veya toksinler, çeşitli reaksiyonlara katkıda bulunabilir. Herhangi bir sayıda koşul ve koşul, ne kadar MMS'e tahammül edebileceğinizi etkileyebilir. Bu yüzden vücudunuzun size verdiği sinyallere dikkat etmeniz çok önemli ve tekrarlamak istiyorum, ne kadar MMS alabileceğinizi görme yarışı değil.

Her kişi farklıdır, bazı insanlar için hızlı bir yaklaşım veya daha yüksek doz gerekebilir ve diğerleri için düşük doz sonuç getirir. Daha önce bahsettiğim gibi, ilerlemiş kanserleri olan bazı kişilerin saatte sadece 1 damla MMS ve düşük doz MMS2 ile ve hatta bazılarının 1/4 veya 1/2 damla dozu ile iyileştiğini gördük.

Machine Translated by Google

Bölüm 7

HRP ve Çeşitli Hastalıklar

HRP'yi İle Birlikte Kullanmak Çeşitli Hastalıklar İçin Destekleyici Protokoller

MMS'in yardımcı olduğu, insanlığın tüm hastalıklarını, hatta geri bildirimlerden bildiğimiz tüm hastalık ve durumları bu kitapta listelemek mümkün değildir. Bununla birlikte, Sağlığı İyileştirme Planını nasıl kullandığımıza dair genel bir fikir göstermek için daha yaygın hastalıklardan bazılarını aşağıda listeledim (Bölüm 5). Bu plan, Anahtar Protokol sütunlarını Destekleyici Protokoller, Ek Protokoller ve gerektiğinde bazen Hint Bitkisi ile birlikte kullanmayı ifade eder.

Aşağıdaki önerileri kişisel sağlık kurtarma rutininize dahil etmek için Sağlık Kurtarma Planı ve nasıl çalıştığını iyi anlamanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Unutmayın, HRP Başlatma Prosedürü ile başlar ve daha sonra MMS'in Üç Altın Kuralına göre Anahtar Protokollerin uygun sıralaması izlenir (bkz. sayfa 83-84). Hastalığa/hastalığa bağlı olarak, gerektiğinde diğer Destek Protokolleri ve/veya Ek Protokoller de eklenir.

Sağlığı İyileştirme Planında her zaman Başlatma Prosedürü ile başlamayı vurguladım (bkz. sayfa 79) ve sonra

Machine Translated by Google

Protokol 1000'e ilerleyin. Ancak, Başlatma Prosedürünü tamamladıktan sonra faydalı olacağına inandığım bazı hastalıklar var, önce Küf/

Mantar Protokolü'nü yapın, ardından Protokol 1000'e geçin ve ana hatlarıyla belirtildiği gibi HRP'nin geri kalanıyla devam edin. Bunun nedeni, küf ve mantarın genellikle sorunun büyük bir parçası olmasıdır. Aşağıdaki listede, Başlatma Prosedürü tamamlandıktan sonra ve Protokol 1000'i yapmadan önce Küf/Mantar Protokolüne gidilmesinin hangi hastalıkların faydalı olacağını belirtmiştim. Ancak, her zaman ne yapmanız veya ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir soru var. ile başlayın, her zaman Başlatma Prosedürü ile başlayın ve standart HRP'yi takip edin. HRP programınızda yeterli ilerleme sağlamadığınızı hissettiğiniz her an, belirli bir süre için her zaman Küf/Mantar Protokolüne geçiş yapabilirsiniz.

Ağrılar ve Ağrılar: Protokol 6 ve 6'yı yapın. Ardından Başlatma Prosedürüne geçin ve HRP'yi izlemeye devam edin. Aynı anda, Başlatma Prosedürü sırasında DMSO ile birlikte MMS1 sprey şişesini kullanın. Ağrı bölgesine MMS1 püskürtün ve ardından DMSO'yu (DMSO'yu üzerine püskürtün veya elle ovalayın) günde 4 veya 5 kez püskürtün. Ağrılar geçene kadar HRP ile devam edin. Her zaman MMS'in Üç Altın Kuralına uyun.

Asit Reflü: Başlatma Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e geçmeden ve gerektiğinde HRP'yi izlemeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). En az bir ay boyunca, MMS dozlarınızdan en az iki saat ayrı olan herhangi bir öğünde iyi bir marka probiyotik alın. İyi olana kadar devam edin.

Alerjiler: Başlatma Prosedürü ile başlayın ve alerjiler gidene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Machine Translated by Google

Apandisit: Önce Protokol 6 ve 6'yı yapın (bkz. sayfa 169).
İkinci 6 damlalık dozu aldıktan bir saat sonra hala ağrı varsa hastaneye gitmek gerekebilir. Bununla birlikte, ağrı büyük ölçüde geçmişse, bu durumda Protokol 1000'e geçin ve her saat başı 3 damlalık bir MMS1 dozu alarak başlayın.
Apendiks sindirim sistemine bağlı olduğundan, bu, MMS1 akışının doğrudan apendikse gitmesini sağlayacak ve iyileşmesine yardımcı olacaktır. MMS'in Üç Altın Kuralına dikkat edin. Kendinizi daha iyi hissediyorsanız, sistemi detoksifiye etmek için Protokol 1000 ile üç hafta devam edin. Ağrı geri dönerse, hastaneye gitmek gerekebilir.

Artrit: HRP'ye başlayın. Aynı anda, Başlatma Prosedürü sırasında DMSO ile birlikte MMS1 sprey şişesini kullanın. Ağrı bölgesine MMS1 püskürtün ve ardından DMSO'yu (DMSO'yu üzerine püskürtün veya elle ovalayın) günde 4 veya 5 kez püskürtün. Gerektiğinde Anahtar Protokoller aracılığıyla HRP planını izlemeye devam edin. Artrit, birçok farklı yoğunluk derecesinde gelir. Sorun, Başlatma Prosedürü ve Protokol 1000 takip edilerek çözülebilir veya Genel Olarak Tedavi Edilemez Hastalıklar bölümünde belirtildiği gibi tüm çeşitli Destekleyici Protokollerin eklenmesi prosedürünün tamamının izlenmesini gerektirebilir (bkz. sayfa 117). Üç Altın Kurala uymayı unutmayın. İyi olana kadar devam edin.

Astım: Başlangıç Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e devam etmeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin ve gerektiğinde HRP'yi takip edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözlemleyerek).

Otoimmün Hastalıklar: Otoimmün hastalık dünya çapında milyonlarca ve milyonlarca insanı etkiler. 80 kadar otoimmün hastalık türü vardır (ve sayılmaktadır). Daha yaygın olanlardan bazıları lupustan çölyak ladin hastalığına, iltihaplı bağırsak hastalıklarına, sedef hastalığına kadar uzanır ve liste devam eder. MMS biliniyor

Machine Translated by Google

bunları ve daha fazlasını gidermek için. Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve İHP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kurala uyun). Birçok otoimmün hastalık benzer semptomlara sahiptir ve bu da onları teşhis etmeyi çok zorlaştırır. Aynı anda birden fazla olması da mümkündür. HRP programınız sırasında herhangi bir zamanda yeterli ilerleme görmüyorsanız, durup Küf/Mantar Protokolü'nü yapmak ve bunun işe yarayıp yaramadığını görmek yardımcı olabilir. Bazı otoimmün hastalıklarda, Genel Olarak Tedavisi Olmayan Hastalıklar bölümünde önerildiği gibi, gerekirse Destekleyici Protokoller eklemek de gerekebilir (bkz. sayfa 117).

Candida: Başlangıç Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e devam etmeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin ve gerektiğinde HRP'yi takip edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözlemleyerek). Eşzamanlı olarak lavman ve/veya kolonikler (bkz. sayfa 148-153) kişi kendini hazır hissettiğinde eklenebilir, genellikle Protokol 1000'i başlatana kadar başlamayın.

Soğuk algınlığı: Soğuk algınlığının geldiğini hissettiğinizde, Protokol 6 ve 6'yı yapın. İkinci 6 damlalık dozdan bir saat sonra soğuk algınlığı kaybolursa, soğuk algınlığı için gereken tek şey budur. Protokol 6 ve 6'yı uyguladıktan sonra soğuk algınlığı devam ederse, Başlatma Prosedürüne başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin. (Vücudun detoks yapmak için bazen soğuk algınlığını kullandığını unutmamak önemlidir. Bu durumda, hiçbir MMS veya herhangi bir ilaç miktarı üşütmeyi çabucak durduramaz - sadece seyrini sürdürmesi gerekir. Bu durumda, MMS'de olduğu gibi MMS almayı bırakmayın, soğuk algınlığı genellikle normalden çok daha erken geçer - vücudun detoksifikasyon için kullandığı ve tamamen üstesinden gelmesi iki veya üç hafta sürebilen soğuk algınlığı türü olsa bile.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Başlangıç Prosedürü ile başlayın. Sonra devam et

Machine Translated by Google

Küf/Mantar Protokolü, ilk olarak, Proto col 1000'e geçmeden ve gerektiğinde HRP'yi takip etmeden önce (her zaman Üç Altın Kurala uyun). Küf/Mantar Protokolü ile işiniz bittiğinde, aynı anda Proto col 1000'e başlarken, Lung Protocol'ü (Kap) başlatın, bkz. sayfa 159.

Crohn Hastalığı: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve HRP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). Lavmanlar ve mümkünse bazı koloniler yardımcı olabilir. Bu özel hastalık durumunda, protokolleri yapmaya alışır alışmaz lavmanlara veya koloniklere başlayın. Nasıl gittiğini görmek için bir veya iki lavmanla başlamak en iyisidir (bkz. sayfa 148). İyileşme fark ederseniz, daha iyisini yaptığınız sürece devam edin.

MMS1 damlalarını eklemeden Crohn hastalığı için lavman veya kolonik uygulamayın. İlk lavman iyi giderse, sonraki birkaç lavmanda MMS1 damlalarının sayısını talimatlara göre artırabilirsiniz. Kolonik yapıyorsanız, sayfa 152'deki talimatları izleyin. Koloniğin gerçekten süper bir lavman olduğunu ve kolonu daha verimli bir şekilde temizlediğini unutmayın. MMS'in Üç Altın Kuralının hala geçerli olduğunu unutmayın, özellikle de iyileşiyorsanız hiçbir şeyi değiştirmeyin.

Dang Ateşi: Dang humması için sayfa 190'daki protokolü izleyin.

Diş Sorunları: Diş Fırçalama Prosedürünü yapın (bkz. sayfa 73). Eşzamanlı olarak Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve HRP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek).

Depresyon: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin. Gerekirse, Tedavi Edilemez Genel Olarak Kabul Edilen Hastalıklar bölümü programına devam edin (bkz. sayfa 117).

Machine Translated by Google

Diyabet (Tip 1 ve 2): Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Sindirim Sorunları: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin. Ayrıca, en az bir ay süreyle, MMS dozuna başlamadan iki saat önce ve günün son dozundan iki saat sonra, yani MMS dozlarından iki saat arayla yenen yemeklerle birlikte iyi bir probiyotik alın.

Kulak Enfeksiyonları: Hemen Kulak Protokolünü yapın (bkz. sayfa 139-141). Eşzamanlı olarak, Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve gerekirse, iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Egzama: Etkilenen bölgeye MMS1 sprey şişesiyle (sayfa 76) püskürtmeye başlayın ve üstüne DMSO uygulayın. Aynı zamanda Başlatma Prosedürüne başlayın ve HRP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). MMS1 spreyi yanar ve sokarsa, küf/mantar olabileceğinin bir göstergesidir. Bu durumda, derideki küf ve mantarın üstesinden gelmek için Küf/Mantar Protokolü'ndeki (bkz. sayfa 99) talimatları izleyin.

İyileşene kadar HRP'yi takip etmeye devam edin.

Erektil Disfonksiyon: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Göz Hastalığı: Hemen Göz Protokolünü yapın (bkz. sayfa 137). Eşzamanlı olarak Başlatma Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Machine Translated by Google

Fibromiyalji: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Hepatit A, B, C: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Herpes (tüm türler): Başlangıç Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e devam etmeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin ve gerektiğinde HRP'yi takip edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözlemleyerek).

Yüksek Tansiyon: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

HIV/AIDS: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Bulaşıcı Hastalıklar: Bunlara hem virüsler hem de bakteriler neden olabilir ve her ikisi de vücutta ve ciltte olabilir. Örneğin zatürree, menenjit ve ishale virüsler veya bakteriler neden olabilir. Ayrıca virüslerin ve bakterilerin neden olduğu binlerce cilt hastalığı vardır, örnekler suçiçeği döküntüleri, roseola ve zonadır. Antibakteriyel ilaçlar bazen bakteriyel hastalıkları durdurabilir, ancak tıp henüz viral enfeksiyonları durduracak bir şey geliştirmedi. Neyse ki, MMS'in hem viral hem de bakteriyel hastalıkları durdurduğu bilinmektedir. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar için, Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Ciltte viral veya bakteriyel hastalıklar olması durumunda, MMS1 veya MMS2 sprey şişesini kullanın (bkz. sayfa 76). Cilde püskürtülmesi batma veya yanmaya neden oluyorsa,

Machine Translated by Google

küf veya mantarın mevcut olduğunun göstergesi. Bu durumda, 106. sayfadaki küf/mantar harici prosedürü talimatlarını izleyin.

Böbrek veya Karaciğer Hastalığı: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Lyme Hastalığı: Başlangıç Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e devam etmeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin ve gerektiğinde HRP'yi takip edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözlemleyerek).

Sıtma: Sıtma Protokolünü takip edin (bkz. sayfa 180).

MRSA: MRSA Protokolünü izleyin (bkz. sayfa 196).

Obezite: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin. Diyet ve yaşam tarzında bazı değişiklikler gerekli olabilir.

Parazitler: Başlatma Prosedürü ile başlayın ve kuyuya kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Prostat (yüksek PSA): Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Sinüs Sorunları: MMS1 Burun Prosedürünü Yapın. Eşzamanlı olarak, Başlatma Prosedürü ile başlayın ve gerekirse, iyileşene kadar HRP'yi (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek) takip etmeye devam edin.

Cilt Sorunları: Başlatma Prosedürü ile başlayın ve HRP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). Bir MMS sprey şişesi kullanın ve

Machine Translated by Google

etkilenen bölge günde 5 defaya kadar. Hemen spreyin üzerine DMSO ekleyin ve nazikçe ovalayın. (Sadece MMS1 ise spreyin üzerine DMSO ekleyin. DMSO'yu bir MMS2 sprey şişesiyle kullanmayın, bkz. sayfa 78).

Tümörler ve Kistler: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve HRP'yi takip ederek devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). Tümör veya kist vücudun dışındaysa, her seferinde DMSO kullanarak günde 5 kez bir MMS sprey şişesi kullanın. (MMS2 sprey şişesi kullanıyorsanız DMSO kullanmayın (bkz. sayfa 78).

MMS1/DMSO Yaması ayrıca dış tümörlere ve kistlere de uygulanabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları: Başlangıç Prosedürü ile başlayın ve HRP'yi takip etmeye devam edin (her zaman Üç Altın Kuralı gözeterek). Ek olarak, hem erkekler hem de kadınlar için, idrar yoluna nazikçe enjekte etmek için bir göz damlası kullanın (erkeklerde penisin başındaki açıklıktan ve kadınlarda idrar açıklığından [üretranın dış açıklığından]), tam bir MMS1 sprey şişesinin talimatlarına göre yapılmış bir MMS1 sprey şişesinden MMS1 sıvısının sıkılması (bkz. sayfa 76-77).

Bu, günde 4 veya 5 kez yapılabilir.

Hastalıklar
Genel Olarak Tedavi Edilemez

Tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık vardır . Bununla birlikte, dünya çapında MMS kullanarak tedavi edilemez olduğu varsayılan bu hastalıkların çoğundan tamamen sağlığa kavuşan insanlardan sayısız rapor aldık. Bunlardan bazıları ALS (Lou Gehrig Hastalığı), Alzheimer, otizm, kanser (her türlü), lösemi, multipl skleroz, Parkinson, çocuk felci, romatoid artrit ve diğer yaşamı tehdit eden hastalıkları içerir.

Machine Translated by Google

Siz veya sevdiğiniz biri, tedavisi olmayan veya yaşamı tehdit eden bir hastalığa yakalanıyorsa, aşağıdakileri öneriyorum:

➤ Başlatma Prosedürü ile başlayın. Ardından, Protokol 1000'e geçmeden ve gerektiğinde HRP'yi takip etmeden önce Küf/Mantar Protokolüne geçin. Bir sonraki adıma veya bir sonraki protokole ne zaman geçeceğinizi söyleyen MMS'in Üç Altın Kuralına daima uyun. Gerekirse Protokol 3000'e kadar ilerlemeye devam edin.

Ü Protokol 3000'e ulaştıysanız ve hala tamamen iyi değilseniz, Destek Protokollerini eklemeye başlayın. Bu noktada fikir, MMS'i vücuda daha fazla ve çeşitli şekillerde sokmaya çalışmaktır. Hastalığı mümkün olan her açıdan vurmak olarak düşünün. Buradaki fikir, her bir Destekleyici Protokolü aynı gün içinde eklemek değildir. Ama ilerledikçe daha fazlasını eklemeye çalışın. İlk başta bunlardan bazılarını yapamıyorsanız, endişelenmeyin, hepsini yapana kadar devam edin. Destekleyici Protokoller eklemeye başladığınızda, MMS1 ve MMS2 oral dozları almaya ve MMS1 ve DMSO'yu harici olarak, Anahtar Protokoller ile ilerlemenizde nerede olduğunuza göre devam edin.

Unutma, çok önemli bir ilke ekle, ama zaten yaptığın şeyi çıkarma. Her zaman MMS'in Üç Altın Kuralına uyun.

Not: Çoğunlukla, aşağıda listelenen sırayla Destekleyici Protokoller eklemenizi öneririm. Hastalığınıza, nasıl hissettiğinize ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğine bağlı olarak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen Destekleme Protokolleri— Onları Ekleme Zamanı (sayfa 71) bölümünü okuyun.

Banyolar: MMS1 ile tam banyo yapın. Mümkünse birkaç gün içinde MMS2 banyolarına geçin. MMS banyolarına devam etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, banyoları MMS1 ve MMS2 arasında değiştirin—sizin için en uygun olanı görün. (bkz. sayfa 142-

Machine Translated by Google

148.) Tam banyo yapmak mümkün değilse ayak banyosunu yapın. Üç farklı banyoyu bir arada yapmak isteyebilirsiniz. Banyolarla ilgili ilerlemeyi fark edin ve sizin için neyin işe yaradığını takip edin.

Lavmanlar: Günde iki lavman da deneyebilirsiniz. Ciddi bir hastalık durumunda, lavmanların yerini alan ve bir lavmandan daha geniş kapsamlı olan haftada en az iki kolonik öneriyorum (bkz. sayfa 148-153).

MMS Çanta Protokolü: Bunlardan birkaçını haftada bir yapmayı deneyin (bkz. sayfa 156).

Duş Protokolü: Kadınlar ayrıca sağlık kurtarma planlarına duş ekleyebilirler (bkz. sayfa 153).

MMS1/DMSO Yama Protokolü: Sorunun ne olduğuna bağlı olarak, örneğin harici tümörler durumunda, bu süre zarfında MMS1/DMSO Yamasını da yapmak isteyebilirsiniz.

Hint Bitkisi: Sağlık İyileştirme Planında ve Destekleyici Protokollerde belirtilen tüm protokolleri uyguladıktan sonra sağlığınıza kavuşamadıysanız, bir sonraki adım Hint Bitkisini kullanmaktır (bkz. Bölüm 10).

Bu zor bir program gibi görünebilir. İyileşip iyileşmediğinizi bileceksiniz. Bu zor bir iştir ve kararlılık gerektirir, ancak birçok insan bunda başarılı oldu ve belirli hastalıklarının üstesinden geldi ve bunun sonucunda mutlu, üretken hayatlar yaşadı.

Machine Translated by Google

Lyme Başarısı: Geçen martta grip olduğunu düşündüğüm şeyi aldım. Hayatımda geçirdiğim en kötü gripti. Vücudumun her gözenekinden acı çekiyorum. Makine almaya başladım ama faydası olmadı. Evde MMS olduğu için denemeye karar verdim. Peki bu hile yaptı! Kısa sürede tekrar iyi hissettim. Eski halime döndüğüm için almayı bıraktım. Birkaç gün sonra semptomlar geri geldi ve o zaman griple değil başka bir hastalıkla uğraştığımı anladım. Lyme hastalığım olduğunu keşfetmek için çok araştırma yapmak gerekti. Doktorum kesinlikle yardımcı olmadı. Aslında o bir engeldi. İnternete girdim ve bir semptom denetleyicisi kullandım ve muhtemelen MS veya Lyme olduğumu gösterdi. MMS yardımcı olduğu için tekrar kullanmaya başladım ve semptomlarımı nasıl tedavi edeceğimi olabildiğince araştırdım. Protokol 2000'e başladım. Destek için şehrimdeki bir naturopatik doktorla da temasa geçtim. Şaşırtıcı bir şekilde, MMS kullanmayı destekledi. Çok yardımcı olan bir lavmanda MMS kullanılmasını önerdi. Ben de MMS2 kullanıyorum. Her iki protokol de birlikte iyi çalışır. MMS olmasaydı şu an hastanede yaşam savaşı veriyor olurdum. Belirtilerim şiddetliydi ve ağrı korkunçtu. MMS bence bir mucize! —Brenda B., Kanada

eğer

Boğaz Kanseri: Boğaz kanseri olan bir adamı tedavi etmek. Kan sayımı düzeldi, biraz kilo aldı ve doktoru ne yaparsa yapsın işe yaradığı için yapmaya devam edeceğini söyledi. GÜNCELLEME: Boğaz kanseri olan adam gırtlak kanserinden tamamen temizlendi. Onun ve bunun insanları daha iyi hale getirmesi gerçeği için çok heyecanlıyım.—CP, Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

Bölüm 8

Gerçeklik kontrolü

Sahip Olamamanızın Nedenleri MMS ile Başarıyı Tamamlayın

1. Protokole Yeterince Dikkatli Uymamak: Bu protokoller, 20 yıllık insanların sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmanın sonucudur. Verilen kesin işlemin nedenleri vardır. Süreci değiştirmeye çalışanlar veya prosedürleri tam olarak takip etmeyenler başarısız olabilir. Sağlığınızın iyi olmasını isteme konusunda ciddiyseniz veya ölümcül bir hastalığınız varsa yaşamak istiyorsanız, lütfen protokollere tam olarak uyun.

Sayısız sağlık sorunu için çeşitli protokol ve doz önerileri (MMS kullanarak) sunan birçok internet sitesi olduğunu belirtmekte fayda var. Bu sitelerin çoğu doğru değil ve son 20 yılda etkili olduğunu bulmadığımız bilgiler veriyor. MMS çetesine atlayan ve yanlış bilgi veren herkes üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. En güncel bilgilerim olan bu kitaptaki talimatlara uymanızı rica ederim. İnternetten daha fazla bilgi toplamak istiyorsanız, bunun güvenilir bir siteden olduğundan emin olun. (Bu kitabın arkasındaki referans sayfasına bakın.)

2. Kişi İyileşirken Dozu Değiştirme: Unutmayın, büyük veya küçük bir gelişme fark ettiğinizde hiçbir şeyi değiştirmeyin, ancak yapmaya devam edin.

Machine Translated by Google

beş ila altı günlük bir süre için daha fazla gelişme kalmayana kadar ne yaptığınızı. Genellikle biri iyileştiğini hissettiğinde, "Bu kadar MMS ile daha iyiye gidiyorsam, daha fazla MMS daha çabuk iyileşmeme yardımcı olur" diye düşünür. Yani gelişiyor olsa da dozunu artırıyor. Bu olduğunda, ek MMS1 aynı anda çok fazla patojeni öldürebilir ve baş ağrısı, aşırı yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve/veya ishale neden olabilecek bir Herxheimer reaksiyonuna neden olabilir. Kişi cesareti kırılabilir ve MMS almayı tamamen bırakabilir. Bu yüzden unutmayın, iyileştiğiniz sürece hiçbir şeyi değiştirmeyin ve yalnızca beş ila altı günlük bir süre boyunca herhangi bir gelişme görmediğinizde bir sonraki yüksek protokole geçin.

3. Vücuttaki MMS'i Nötralize Etmek: Kahve, kafeinsiz kahve, kafeinli çay, bazı bitki çayları, süt, alkol, hindistancevizi suyu, portakal suyu, mandalina suyu ve C Vitamini veya askorbik asit eklenmiş tüm meyve suları MMS'i doğrudan nötralize eder. (Meyve ve sebzelerde orta derecede doğal olarak bulunan C vitamini uygundur.) Moringa gibi son derece yüksek miktarda antioksidan içeren gıdalar ve takviyeler, MMS protokolleri sırasında alınmamalıdır. (42-45, 52, 56. sayfalara bakın.)

4. İlaçlar: Bu zamana kadar, MMS ve tıbbi ilaçlarla herhangi bir reaksiyon fark etmedik, ancak bunun her zaman böyle olacağını garanti edemeyiz. Farmasötik ilaçları alıp almama kararı kişiseldir. İlaçlar her insanın vücudunu farklı şekillerde etkiler. Reçeteli ilaç almanın MMS ile sağlığın iyileşmesini engelleyeceğini her durumda genel olarak söyleyemeyiz. Bununla birlikte, MMS protokollerini uygularken ilaç almaya devam etmenin genellikle sağlığın iyileşmesini yavaşlatacağına veya hep birlikte önleyeceğine dair bir eğilim gördük. İlaç almama kararı verilmişse, bazen ilaç tedavisine (MMS protokolündeyken) devam etmesi gerekebilir.

Machine Translated by Google

birkaç gün veya bir hafta veya daha fazla (duruma ve bırakmanız gereken ilaçların türüne ve miktarına bağlı olarak). Bu, ilaçlar ilk kesildiğinde "ilaç şoku" nedeniyle ilk birkaç gün içinde meydana gelen kötü reaksiyonları önlemek içindir. Genellikle ilacı kademeli olarak azaltarak yavaş yavaş yavaşlamak en iyisidir. Doğru nitelikli alternatif sağlık uzmanı, kendinizi ilaçlardan güvenli bir şekilde kesmenize yardımcı olabilir.

5. MMS ve Aktivatörünüzün Kalitesi ve Gücü: Bazen gerekli etkiye sahip olmayan (genellikle onaylanmamış bir kaynaktan) MMS şişeleri satın alınabilir ve bu nedenle damlalar daha zayıf bir doz yapacaktır. Dozun doğru kuvvette olduğundan emin olmanın bir yolu, MMS ve aktivatör damlalarını karıştırıp 30 saniye saydıktan sonra damlaların kehribar rengine dönmesini sağlamaktır (bkz. sayfa 39); değilse bir şeyler yanlıştır. Kehribar rengine dönmeyip yalnızca sararırlarsa, bu damlaları yalnızca MMS ve aktivatör gibi iyi malzemeler elde edene kadar birkaç gün boyunca kullanın. Biri veya ikisi de kötü olabilir. Damlalar sararmıyorsa bile kullanmayın.

6. MMS Protokollerinde Takviye Almak: Diyete eklenebilecek vitaminler, mineraller ve diğer takviyeler, MMS protokollerinde bir süreliğine ara verilmelidir. Bu özellikle yüksek miktarda antioksidan içeren yiyecekleri içerir. MMS zehirleri yok eder ve patojenleri koruyan biyofilmleri yok eder. Daha sonra patojenleri öldürür ve bu iyileşmeye yardımcı olur. Takviyeler sadece vücuda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda patojenleri de besler.

Ne yazık ki, çoğu zaman patojenler takviyelerden beslenmek için ilk sırada yer alır ve bu nedenle kişi hastalığa besin sağlarken aynı zamanda onu öldürmeye çalışır. Bu nedenle, takviyeler sağlığın iyileşmesini yavaşlatabilir veya hatta tamamen durdurabilir. Öte yandan, iki veya üç hafta boyunca bir protokolde kaldıktan ve tüm kuralları takip ettikten sonra, MMS protokolüne devam ederken, esnek olmayı düşünebilirler.

Machine Translated by Google

ihtiyaç hissederlerse. Unutmayın, herhangi bir takviyeyi MMS dozajlarından en az iki saat ayırın.
Vücudun kılavuzunu takip edin ve takviyelerin MMS'in tam olarak çalışmasına yardımcı olup olmadığını veya muhtemelen engellediğini belirleyin. Tam açıklama için lütfen 53. sayfada başlayan besin takviyesi bölümünü okuyun.

7. Önceki Tedaviler: Çok sayıda kemoterapi tedavisi, radyasyon ve ameliyat geçiren ve bu nedenle sağlığına kavuşmayı zorlaştıran son ayaklarında bize gelen insanlar oldu. MMS, toksik kemoterapi ilaçlarını ortadan kaldırma ek yüküne sahiptir. Bu durumda, genellikle bağışıklık sistemi tehlikeye girer ve çeşitli organların çıkarılması, iyileşmeyi biraz daha uzun veya çoğu zaman önemli ölçüde uzatır. Bu nedenle, önceki tedaviler, miktarına ve takip edilen dereceye bağlı olarak, sağlığın iyileşmesini uzatabilir. Beklenenden daha uzun süre tutmak zorunda kalabilirsiniz.

8. Tutum İyileşmeyi Yavaşlatabilir: Hasta olduğunuzda ve kendinizi kötü hissettiğinizde şikayet etmeye veya olumsuz olmaya başlamanız anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, birçok çalışma, olumlu bir tutuma sahip olmanın ve şikayet etmeyi minimumda tutmanın daha hızlı iyileşmeye katkıda bulunduğunu kanıtlamıştır.
Tutum çok nadiren MMS'in tamamen çalışmasını engeller, ancak zayıf bir tutum bağışıklık sistemini etkileyebilir ve bazen önemli ölçüde iyileşme sürecini yavaşlatabilir.

9. Kan Testi: Kan testlerinin MMS çalışmıyor gibi görünmesine neden olabileceği birçok durum vardır. MMS'in işe yarayıp yaramadığını belirlemenin en iyi yolu somut sonuçlardır.
Nasıl hissediyorsun? Gerektiğinde kilo alıyor veya veriyor musunuz? Yaralar iyileşiyor mu ve deri dökümtüleri kayboluyor mu? Genel bir esenlik duygusu yeniden sağlanıyor mu? Tüm bu pozitif işaretlere sahipseniz ve yine de bir kan testi bir sorun gösteriyorsa, test muhtemelen yanlıştır.

Machine Translated by Google

HIV/AIDS, hepatit C ve diğer bazı hastalıklarda, çoğu zaman bir MMS temizliği sırasında ve sonrasında ilk testte, kan virüsü sayısı aşırı derecede yükselebilir. Bu her zaman MMS'in çalıştığının iyi bir göstergesidir ve sayım yakında düşecektir. Olan şey, MMS virüsleri yok eder. Bununla birlikte, beyaz kan hücreleri ölü veya ölmekte olan virüsleri emmeye devam eder. Bu olduğunda, hücreler patlayana kadar giderek daha fazla dolar ve büyük miktarlarda ölü/ ölmekte olan virüsleri serbest bırakır. Bu ölü/ölmekte olan virüsler viral yükte sayılır, ancak sonunda hepsi vücut tarafından doğal olarak kandan temizlenir. Bu temizleme işlemi tamamlandığında viral yük sıfıra inecektir. MMS kullanan biri bunu anlamıyorsa, iyileşmediğini düşünebilir ve MMS kullanmayı bırakabilir.

Kan testlerinin doğru bir şekilde okunması için yeterli bir süre bırakmalısınız ve bu hastalığa bağlıdır. Ayrıca unutmayın, birçok laboratuvar hata yapar, bu nedenle birden fazla görüş genellikle akıllıca bir seçimdir. Ama en çok nasıl hissettiğinize göre hareket edin. Enerji geri yüklenir ve yaralar kaybolursa, iyileştiğinizi veya en azından iyileştiğinizi hemen hemen bilebilirsiniz.

10. Aşılar: Aşıların çoğu zaman birçok hastalığın zayıf patojenlerini içerdiği bilinen bir gerçektir. Bu hastalıkların çoğu vücudu aktif olarak etkileyebilir. Hastalığa ek olarak, çoğu aşının aşırı derecede zehirli olan cıva ve diğer kimyasalları içerdiği ve çoğu durumda bu toksinlerin iyileşmeyi önemli ölçüde yavaşlattığı da bilinen bir gerçektir. Ancak MMS protokollerinin aşıların neden olduğu zehirleri eninde sonunda yendiğini ve daha sonra sağlığa kavuştuğunu hemen hemen her zaman gördük. MMS protokolündeyken aşı olmanız gerekiyorsa, aşıyı aldığınız gün (bkz. sayfa 173) Aşı Prosedürünü uygulamanızı ve ardından MMS protokolüne devam etmenizi öneririm. Genel olarak, MMS aşıların çoğunun veya tamamının olumsuz etkilerinin üstesinden gelebilir.

Machine Translated by Google

11. Aileden ve Arkadaşlardan Baskı: Aile ve arkadaşlar, alınan şey hakkında olumsuz davranarak ve hatta işe yarayacağından şüphe ederek kişinin protokolleri yapmaktan caydırabilir. Bu dış etki çoğu zaman kişinin MMS almayı tamamen bırakmaya veya protokolleri doğru bir şekilde yapmamaya karar vermesine neden olabilir.

12. Çevresel Zehirler: Çevremizde hepimizin düzenli olarak temas ettiği yüzlerce hatta binlerce zehir kaynağı vardır. Kişi sağlığına kavuşmaya çalışıyorsa ve sürekli toksinlerle temas halindeyse, vücudun bağışıklık sistemi bu toksinleri yok etmeye çalışmakla meşgul olabilir ve iyileşme yavaşlayabilir veya tamamen durdurulabilir. Bu durumda, tam iyileşme gerçekleşmeden önce kişi kendini toksik durumdan uzaklaştırmak zorunda kalabilir.

13. Küf/Mantar: Küf bir mantar türüdür. MMS'den etkilenmeyen bazı küf türleri vardır. Vücudun içini ve dışını etkilerler.
Küf/mantar ağız ve sindirim sistemine girerek kişinin sağlığına büyük zararlar verdiği gibi ciltte kötü yaralar ve kızarıklıklar da oluşturabilir. MMS belirli küf/mantar türlerine karşı etkili olmadığında, kil genellikle sorunu çözebilir. Küf/mantarı diğer yaralardan ve patojenlerden MMS uygulandığında sadece sokma ve yanma değil, aynı zamanda durumu daha da kötüleştirebileceği gerçeğiyle ayırt edebileceğinizi unutmamak önemlidir. Bentonit kil veya montmorillinit kil olarak da adlandırılan Aztek kili, genellikle MMS'nin yok etmeyeceği küfü/mantarı öldürür.
(Vücudunuzdaki veya üzerinizdeki küfü nasıl tanıyacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı da dahil olmak üzere, tam Küf/Mantar Protokolü için 99. sayfaya bakın.)

14. Yeniden enfeksiyon: Bir kişinin sağlığına tamamen kavuşmuş olması, kendisine tekrar bulaşamayacakları anlamına gelmez. Bir yaşam tarzı veya alışkanlıkları devam ederse

Machine Translated by Google

Hastalığın başlamasına neden olan veya sağlıklarını geri kazandıktan sonra tekrar belirli bir hastalığa veya toksine sürekli olarak maruz kalanlar, yeniden enfeksiyon meydana gelebilir. Bir yaşam tarzı değişikliği düşünün ve ardından protokolü tekrarlayın.

15. Kendini Aldatma: İnsanlar, aslında hala hasta oldukları halde, kendilerini iyi olduklarını düşünerek aldatabilirler. Kişi gerçeği kabul etmeli ve sağlığı için kişisel sorumluluk almalı ve ne kadar sürerse sürsün tüm belirtiler geçene kadar protokollere devam etmelidir.

16. Yüksek Gerilim Telleri ve Mikrodalgalar: Uzun zamandır, yüksek gerilim tellerine ve mikrodalga kulelerine yakın yaşayanların, yaşamayanlara göre kanser ve hastalık insidansının çok daha yüksek olduğu düşünülüyordu. En azından teller ve kuleler şüpheli. Alternatif tıp uygulayıcıları genellikle hasta insanlara bu tür kabloların ve kulelerin yakınındaki yerlerden uzaklaşmalarını tavsiye eder. Bazı insanlar, taşındıktan sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini söylediler. Bu nedenle, bir kişi bir protokol yaptıktan sonra hala kendini kötü hissettiğini ve buna rağmen bu şeylere yakın olduğunu tespit ederse, bu dikkate alınması gereken bir şeydir. Evde WiFi yerine kablolu internet kullanmak ve cep telefonlarını kulağa tutmak yerine hoparlörde çalışacak şekilde kullanmak gibi basit değişiklikler bile yardımcı olabilir.

Mikrodalga fırında ısıtılan veya pişirilen yiyeceklerin güvenliği veya tehlikeleri konusunda pek çok tartışma var. Sağlığımı geri kazanmaya çalışsaydım, evimde mikrodalga fırın bulundurmadan önce şahsen iki kez düşünürdüm. MMS protokollerinizde yeterli ilerleme kaydedemiyorsanız ve bir mikrodalga fırın kullanıyorsanız, bir süreliğine kullanımına ara vermek ve yardımcı olup olmadığına bakmak isteyebilirsiniz.
Mikrodalga fırın kullanma konusunda kendi kararınızı vermenize yardımcı olabilecek makalelere ilişkin bazı bağlantılar aşağıda verilmiştir:

Machine Translated by Google

An thony Wayne ve Lawrence Newell tarafından Mikrodalga Pişirmenin Gizli Tehlikeleri : http://www.health science.com/ microwave_hazards.html

Mikrodalga Fırınlarda Mercola: http:// articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/ 05/18/microwave-hazards.aspx

Mikrodalga Fırınlar, Yiyeceklerinizin Besin Değerini Yok Ediyor, Mike Adams: http://www.naturalnews.com/021966_microwaves_mic rowave_ovens.html

17. Klor ve Florür: Bu iki zehir, dünyadaki birçok kamu su sisteminde bulunur. Florür adı verilen endüstriyel atıkları suya atmalarına izin verilmeyen yerlerde klor kullanabilmişlerdir. Her ikisi de toksiktir ve her ikisi de kanserojendir (kansere neden olur). En azından, florür veya klor içeren su kullanan bir MMS protokolünün ardından geri kazanım sürecini yavaşlatabilir. Lütfen bu zehirlerden herhangi birinin eklenmemiş veya herhangi bir şekilde kullanılmamış ters ozmoz suyu, damıtılmış su veya şişelenmiş su kullanmayı düşünün.

18. Oral Patoloji: Tam iyileşmenin önündeki önemli bir engel çoğu zaman oral patolojidir. Ölümcül anaer obik bakteriler rutin olarak kök kanallarında, kronların altında ve hatta önceki çekim yerlerinde bulunur (çene kemiğinin çürümesine neden olarak kavitasyon denir). Bu bakterilerin çoğuna bağışıklık sistemi tarafından ulaşılamaz ve yıllarca devam eden düşük dereceli enfeksiyonlara neden olarak kalp rahatsızlıklarına, oto-bağışıklık hastalıklarına, artrite ve daha fazlasına neden olabilir. Çoğu zaman vücutta çeşitli sorunlara neden olan oral patoloji, MMS1 ve DMSO ile doğru fırçalama ile üstesinden gelinebilir (bkz. sayfa 73), ancak nadir durumlarda bu sorunu çözmez ve bu durumda

Machine Translated by Google

MMS1'in sağlığı tamamen geri kazanmasına yardımcı olmak için üst düzey bir biyolojik diş hekimi ile vaka danışmanlığı gerekli olabilir.

19. Biyofilm: Vücutta bir biyofilm varsa iyileşmeyi uzatabilir veya önleyebilir. Bir biyofilmin varlığından haberdar olmayan kişi, MMS'nin çalışmadığını veya yeterince çalışmadığını düşünebilir ve protokolü yapmaktan vazgeçebilir. Biyofilm hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfa 273'e bakın.

Mesane Kanseri: Bir arkadaşım kan yaptığı için acile gitti. Bundan sonra doktorlar mesane kanseri olduğunu öğrendi. Eve gönderildi. Sonra doktorlar kemoterapiye başlamak istedi ama sigortası yoktu, bu yüzden doktora dönmesi zaman aldı. Ona MMS verdim ve her saat başı almaya başladı. 2 hafta boyunca MMS aldı. Sonra durdu çünkü ishal ve kusmaya başladı ve buna doydu. Bu süre zarfında sigortalı olmaya hak kazandı. Kemoterapi almak için doktora geri döndü, ancak daha önce kemoterapi doktoru kanserin boyutunu kontrol etmek için mesanesine girdi. Kanser olmadığını öğrendiklerinde çok şaşırdılar.

—Tadeusz, Amerika Birleşik Devletleri

eğer

MMS İşleri: Güvenlidir. Günde bir ila dört kez 2 ila 12 damla arasında değişen dozlar kullandım. 56 yaşındayım ve on yıldır aralıklı olarak MMS kullanıyorum. Ve neredeyse kızımın hayatını kurtardı. —Wayne F., Kanada

Machine Translated by Google

In Brief...

Three Golden Rules of MMS

1. Getting better?

Do not change anything.
Continue with what you are doing.

2. Feeling worse?

Reduce your MMS intake by 50%.

3. Not getting better/not getting worse?

If there are no signs of improvement,
do the next increase or go to the next
protocol according to the HRP.

Machine Translated by Google

9. Bölüm
Destekleyici Protokoller

öksürük Protokolü

Birçok hastalık öksürüğe neden olur ve bazıları aşırı sürekli öksürüğe neden olur. Öksürük, bir kişiyi enerjiden, genellikle hastalığın üstesinden gelmeye yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan enerjiden mahrum eder. Öksürüğün haftalarca ve hatta bazen aylarca devam ettiğini gördüm.

Öksürük sağlığın iyileşmesini önleyebilir ve sıklıkla bir hastalığın kötüleşmesine neden olabilir. Kişinin midesindeki kaslar aşırı derecede ağrıyabilir ve aynı şekilde boğazı da öksürükten ağrıyabilir. Öksürük, aynı zamanda zayıflatıcı olan uykuyu da önleyebilir. Gerçek şu ki, uzun süreli öksürük büyük bir sorun teşkil ediyor. Aşağıdaki protokol, genellikle ciddi yan etkileri olan ilaçları (sürekli öksürük için) almaya bir alternatif sunar. Bu çalışmayı başkaları ve kendim için gördüm; İşinize yarayabileceğine inanıyorum.

Öksürük, mukustan ve vücudun buna nasıl tepki verdiğinden kaynaklanır. Hemen hemen tüm hastalıklar bulundukları bölgede mukus üretirler. Örneğin, akciğerlerdeki hastalık akciğerlerde mukus üretir ve aynı şekilde bağırsaktaki hastalık da genellikle bağırsakta mukus üretir. Öksürük, özellikle güçlü öksürük, vücudun nefes borusunu (tra chea) mukustan uzak tutma çabasıdır. Nefes borusunun tıkanması aşırı bir sorundur. Vücut bunun olmasına veya ölümle sonuçlanmasına izin veremez, bu nedenle vücudun doğal tepkisi derindir,

Machine Translated by Google

nefes borusundan mukus atmak için ağır, kontrol edilemeyen öksürük. En küçük miktarı bile nefes almayı engellemekle tehdit eder.

Mukus suludan çok serte kadar değişebilir. Nefes borusunun bazı bölgelerinden küçük bir miktar mukus atmak için saatlerce öksürebilir. Bazı durumlarda, ağız ve boğazda bazı mukus türleri hala mevcut olabileceğinden, solunum tüplerinden tüm mukus çıkarıldığında öksürük durmaz. Bu mukus, öksürüğün asıl nedeni ile ilgili olmayan diğer patojenlerden kaynaklanabilir. Ağızda veya boğazda belirli mukus türleri olduğu sürece öksürük meydana gelir. Bu mukus o kadar ince olabilir ki, sulanır ve hatta öksürürken burundan damlar veya çok kalın olabilir ve boğazda toplanmaya devam edebilir ve tükürülmesi gerekir.

Bu nedenle, dişleri, diş etlerini, yanakların kenarlarını ve boğazı içeren tüm ağzın içindeki tüm mukusun çıkarılması gerekir.

Bu yapıldıktan sonra öksürük durmalıdır, bu neredeyse her zaman böyledir, ancak öksürük durmazsa, aşağıda verilen adımları ikinci kez tekrarlamanız gerekir.

Mukus Kaldırma Talimatları

Ağızdan mukusun uzaklaştırılması, çeşitli asitlerin seyreltilmiş halde kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. %50 sitrik asit veya %4 hidroklorik asit (HCl) veya 1/2 sıkılmış limon veya misket limonu gibi bir şişe MMS aktivatöründen damlalar kullanılabilir.

Not: Bu seyreltik formlarda asit veya limon kullanmak dişlerinize zarar vermez. Her seansı bitirdiğinizde ağzınızı sade temiz su ile çalkalayabilirsiniz. ben değillim

Machine Translated by Google

asidi nötralize etmek için kabartma tozu veya alkali su kullanmanızı öneririz, temiz su ile durulama yeterlidir.

Aşama 1

q 1/2 fincan (4 ons/120 ml) suya 20 damla %50 sitrik asit veya %4 HCl asit (bir şişe MMS aktivatöründen) ekleyin. Veya 1/2 bardak suya 1/2 sıkılmış limon veya misket limonu kullanın. (Yarım bardak suya yirmi damla MMS aktivatör asidi çok zayıf bir asittir.

Limon suyundan çok daha zayıftır ve kullanımı kolaydır.)

q Bu solüsyona 1 damla etkinleştirilmemiş MMS ekleyin ve kullanmadan önce üç dakika bekleyin.

Adım 2

q Adım 1'de yaptığınız 1/2 fincandan karışımdan bir yudum (yaklaşık 1 yemek kaşığı) alın. Suyu ağzınızda birkaç kez çalkalayın, dişlerinizi ve ağzınızın kenarlarını tamamen kapladığından emin olun. Takma dişleriniz varsa, suyun dişlerin altına da girdiğinden emin olun.

q Terlettikten sonra başınızı geriye yatırın ve birkaç saniye gargara yapın ve ardından su/asit karışımını tükürün.

q Bu adımı 1 kez daha tekrarlayın.

Aşama 3

q Yumuşak bir diş fırçası kullanarak (diş fırçasının temiz olduğundan ve üzerinde diş macunu olmadığından emin olun) Adımda yaptığınız 1/2 fincan (4 ons/120 ml) asitli sudan kalan solüsyondan biraz dökün. 1 diş fırçasının üzerine. Dişlerinizi ve diş etlerinizi bir dakika fırçalayın.
Bu, dişlerinizde mukus filmi kalmadığından emin olmak içindir.

Machine Translated by Google

4. Adım

Adım 1'de hazırlanan 1/2 bardak asitli sudan bir yudum (1 yemek kaşığı ya da öylesine) alarak ağzınızı 1 kez daha çalkalayın.

Notlar

Ü Her öksürük nöbeti geldiğinde bu dört adımı uygulayın. Öksürük için bu ekstra işlemi yaparken hangi protokolde olursanız olun (varsa) uyguladığınızdan emin olun.

Ü Öksürük devam ederse, diğer birçok profesyonel gibi küfün öksürüğe neden olan mukus oluşturan hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları koruyabileceğine inandığım için Küf/Mantar Protokolü'nü (bkz. sayfa 99) yapmanızı öneririm.

Ü Küf/Mantar Protokolünü tamamladıktan sonra, öksürük hala bir sorunsa, şunu öneririm: Başlangıç Prosedürü ile yeniden başlayın ve Sağlığı İyileştirme Planı ile çalışın. Öksürük Protokolünü yapmadan önce, Protokol 1000 veya 2000 gibi bir MMS protokolü üzerindeydiniz veya herhangi bir MMS protokolü üzerinde değilseniz, durum ne olursa olsun, Başlatma Prosedürüne gidin. Eşzamanlı olarak, bu noktada lütfen Bölüm 8'i gözden geçirin ve sağlığınızın iyileşmesinin önünde bir engel olup olmadığını dikkatlice değerlendirin. Ne zaman bir MMS protokolü kullanıyorsanız, kural olarak öksürük durmalıdır.

Bu nedenle, iyileşmenizi engelleyen şeyleri gözden geçirmenizi, yanlış olabilecek herhangi bir şeyi düzeltmenizi ve baştan başlamanızı öneririm.

Machine Translated by Google

MMS1/DMSO Yama Protokolü

MMS1 yaması, MMS1 ve DMSO'yu topikal olarak kullanmanın başka bir yoludur. Bu Protokol 3000 ile aynı değildir, ancak MMS1/DMSO'nun her tür cilt sorununu iyileştirmek için harici olarak nasıl etkili bir şekilde kullanılacağının bir çeşididir. Birçok tümör türü, kanser tümörü ve MRSA, diyabetik ülser ve diğer cilt hastalıkları gibi enfeksiyonlarda başarı elde ettik. Özellikle kanser varlığında ağrılı bölgelere rahatlama getirmiştir. Protokol 3000, cilt yoluyla klor dioksiti vücuda emmenin bir yolu olsa da, yama cildin belirli bir bölgesini hedef alacak şekilde tasarlanmıştır.

Not: Bir çocuk için MMS1/DMSO yaması hazırlama talimatları için 265. sayfaya bakın.

MMS1/DMSO Yaması için Talimatlar

Aşama 1

q Temiz bir kapta 10 damla MMS ile 10 damla %50 sitrik asit veya %4 HCl'yi etkinleştirin. Aktivasyon için 30 saniye sayın.

q Hemen 10 damla saf su ekleyin.

q Ardından 10 damla DMSO ekleyin. Bu çözeltinin iyice karıştırıldığından emin olun.

Adım 2

q Çözeltiyi pamuklu bir gazlı bezin üzerine dökün ve sıvının ped tarafından tamamen emildiğinden emin olun.

q Sorunlu bölgeyi gazlı bezle örtün ve yedi dakika bekletin. Bu yamayı ilk yaptığınızda, sadece yedi dakika uygulamanızı öneririm.

Machine Translated by Google

cildin nasıl tepki verdiğini test edin. İyi giderse, sonraki yamalar her seferinde 15 dakika tutulabilir. Cilt aşırı derecede tahriş olmuşsa, solüsyonu aşağıdaki notlarda anlatıldığı gibi ayarlayın.

q Islatılmış gazlı bez üzerine bant koymak DMSO ile reaksiyona girebileceğinden yamayı yerinde tutmak en iyisidir.

Aşama 3

q Ayrılan süreden sonra yamayı çıkarın.

Notlar

Ü Yukarıdaki adımlar ciltte yanma veya tahrişe neden olursa, yamaya 10 damla daha su ekleyin. Sonraki yamada 10 damla su yanmayı durdurmazsa, 10 damla daha su ekleyin ve yanma veya tahriş olmayana kadar eklemeye devam edin.

Ü Kaplanacak alanın büyüklüğüne göre bu formül ikiye, üçe katlanıp, ikiye bölünebilir. İyileşene kadar günde bir veya iki kez uygulayın.

Gözler, Kulaklar ve Burun Protokolleri

Gözlerinizi, kulaklarınızı ve burnunuzu MMS ile temizlemek, başka hiçbir şey olmayacakken iyileşmelerini sağlayabilir. MMS, vücudun bu hassas bölgelerine çok nazik davranır. Aşağıda verilen yönergeleri izleyin.

MMS dozlarınız için asla musluk suyu kullanmanızı önermiyoruz. Özellikle gözler, kulaklar ve burun için, karışımınızı oluşturmak için musluğunuzdaki musluk suyunu kullanmadığınızdan emin olmak istersiniz, çünkü ABD ve diğer birçok ülkede neredeyse tüm musluk suları florür ve genellikle klor içerir.

Machine Translated by Google

kuyu. Bu zehirlerin gözlerinize, kulaklarınıza veya burnunuza girmesine izin vermeyin. Damıtılmış su varsa Gözler, Kulaklar ve Burun Protokolleri ve ikinci olarak arıtılmış su için en iyi seçimdir. Musluk suyundan tamamen kaçının. Bu farklı formülleri (hepsi aynı olmayan) oluştururken, neyin ne olduğunu karıştırmamak için tüm şişeleri açıkça işaretlediğinizden emin olun.

Gözler

Geçmişte, 1 ons/30 ml damıtılmış suya 1 aktifleştirilmiş MMS damlası ve bazen 1/2 damla MMS1 ila 1 ons/30 ml damıtılmış su içeren bir göz formülü kullandım. Bu çözümlerin her ikisi de bazı vücut tipleri için işe yarayabilir. Bununla birlikte, MMS1'in gözler için bu gücü bazı durumlarda rahatsızlığa neden olmuştur. O zamandan beri yeni bir göz formülü geliştirdim (aşağıda) ve bu daha zayıf çözümü bulmaya geldim, aynı amacı göz problemlerinin üstesinden gelmek için gerçekleştirecek. Göz damlası birkaç saniyeden fazla (birkaç saniye normaldir) veya rahatsız edici bir derecede batıyorsa veya yanıyorsa, solüsyonunuzu saf su ile seyreltmek en iyisidir. Test şeritleriniz varsa ve göz formülünüzü test edebiliyorsanız, aşağıda özetlenen MMS1 göz solüsyonu için milyon başına kısım 6 ila 10 ppm arasında okunmalıdır.

Gözler için MMS1 Formülü

q 1 damla MMS'i 1 damla %4 HCl (gözler için tercih edilir) veya %50 sitrik asit ile etkinleştirin. Doğru süreyi (30 saniye) beklediğinizden ve MMS sıvısının kehribar rengine döndüğünden emin olun.

q 1 aktif damlaya 120 ml distile veya saf su ekleyin.

Machine Translated by Google

q Bu solüsyonu bir damlalıklı şişeye veya şişelere dökün.
sprey şişesi.

Notlar

Ü Bu, gözler için temel formül—120 ml arıtılmış suya 1 aktif MMS damlası.

Ü Bu karışım sıkı kapaklı bir şişede ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilirse yaklaşık bir hafta dayanır. Bu nedenle, gerekirse her hafta yeni bir parti hazırladığınızdan emin olun. Bu, bir kişi için bir haftalık bir süre için göz damlası veya sprey için fazlasıyla yeterli olabilir. Gözler için gerçek formül, 1 ons/30 ml damıtılmış suya 1/4 aktif damla olmalıdır. Ancak tek başına bir damlanın 1/4'ünü ölçmek mümkün olmadığı için göz solüsyonunuzu bu şekilde karıştırmanızı öneririz.

MMS1 Göz Prosedürü

Bunlar bizim tercih ettiğimiz iki uygulama yöntemidir.
Gözlere MMS1 karışımı:

1. Gözler için sprey şişesi.

q Yukarıda açıklanan göz formülü solüsyonunu (1 aktif MMS damlası 4 ons/120 ml suya), temiz bir sprey şişesine koyun.

q En iyi iyileşme etkisi için gözünüzü veya her iki gözünüzü bu karışımla yıkayın. Başınız hafifçe geriye eğik, gözler tamamen açık ve tavana doğru bakarken, uygulama başına her göze 4 ila 8 kez püskürtün.
Püskürtme sırasında gözlerinizi açık tutmaya çalışın ve ardından kızarmaya yardımcı olmak için birkaç kez göz kırpın. İlk başta biraz yanabilir, ancak karışımınız doğruysa, bu hızla geçecektir.

Machine Translated by Google

q En iyi sonucu almak için bunu günde 3 ila 4 kez yapın.

2. Gözler için damlalıklı şişe.

q Bir damlalık şişesine eklenen aynı göz formülü karışımını (1 aktif damla MMS ila 4 ons/120 ml su) kullanın.

q Göz açıp kapayıncaya kadar her göze 3 veya 4 damla damlatın. etrafında.

q Bunu günde 3 veya 4 kez yapın.

Notlar

Ü Çoğu göz problemi için MMS, bazı vakalarda bir hafta kadar bir süreye kadar bir ila dört gün içinde durumu temizler, ancak gerekirse göz solüsyonunu iyileşene kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ü Çocuklar için aynı karışımı ve prosedürü kullanın.

Ü Bakım için haftada 1-2 kez göz spreyi veya damlalıklı şişeyi kullanın.

Ü Şişelerinizi net bir şekilde işaretlemeye özen gösterin. Gözler için bir sprey şişesiyle cilt için bir sprey şişesini karıştırmak istemezsiniz - bunlar tamamen farklı iki çözümdür.

Kulaklar

Not: Aktive edilmiş damlaların suya oranının formülü, kulaklar ve burun için gözlerden farklıdır.

Kulaklar için MMS1 Formülü

q 1 damla MMS'i 1 damla %4 HC1 veya %50 sitrik asit ile etkinleştirin. Doğru miktarı beklediğinizden emin olun

Machine Translated by Google

(30 saniye) ve MMS1 sıvısının kehribar rengine dönüşmesi.

q 1 ons/30 ml distile veya saf su ekleyin.
1 aktif damla.

q Bu, kulaklar için temel formüldür—30 ml saf suya 1 aktif damla. Kulak karışımı sıkı kapaklı bir şişede ve serin ve karanlık bir yerde saklandığında yaklaşık bir hafta dayanır. Bu nedenle, gerekirse her hafta yeni bir parti hazırladığınızdan emin olun.

MMS1 Kulak Prosedürü

Aşama 1

q Yukarıdaki solüsyonu kullanın, 1 ons/30 ml suya 1 aktif damla. Yetişkinler için, standart bir damlalığı ampulü 1 sıkı (tam) sıkarak doldurun (bu yaklaşık 18 damladır). Bir çocuk için bu miktarın yarısını kullanın.

Kişiyi, başı vücuduyla aynı hizada olacak şekilde yan yatırın. Bir yatakta yatıyorsanız, bir yastık kullanmanız gerekecektir, baş, boyun ve omuzlardan daha yüksek veya daha düşük değil, vücutla aynı hizada olmalıdır.

Adım 2

q Damlalığı yavaşça ve dikkatli bir şekilde kulağa sokun ve ardından ampulü 5 veya 6 kez hafifçe sıkın ve damlalıktan gelen sıvının her seferinde kulağa girip çıkmasını sağlayın. Bu, sıvıyı kulağın dibine götürmek için yeterli olmalıdır. Amaç sıvıyı kulağın dibine ulaştırmaktır. (Deri sprey şişesi konsantrasyonu gibi daha güçlü bir MMS1 solüsyonu ile göz damlasını birkaç kez, ampulü sıkarak durulayın.

Machine Translated by Google

Çözümü şişenize geri koymadan önce içeri ve dışarı almak için.)

Notlar

Ü Normalde, özellikle çocuklarda (çünkü çocuklar genellikle yetişkinlerden daha hızlı iyileşirler) bu işlem çoğu ağrıyı hemen giderir, ancak değilse, ağrı geçene kadar bu işleme her saat başı devam edin.

Ü Ağrı azalabilir, ancak bu işleme günde 2 ila 3 kez tamamen iyileşene kadar (herhangi bir enfeksiyon olmadan) devam etmelisiniz, bu bir gün ila bir haftayı geçmemelidir.

Burun

Not: Aktive edilmiş damlaların suya oranının formülü, kulaklar ve burun için gözlerden farklıdır.

Burun için MMS1 Formülü (bu, kulaklarla aynı formüldür)

q 1 damla MMS'i 1 damla %4 HC1 veya %50 sitrik asit ile etkinleştirin. Doğru süreyi (30 saniye) beklediğinizden ve MMS1 sıvısının kehribar rengine döndüğünden emin olun.

q 1 ons/30 ml distile veya saf su ekleyin.
1 aktif damla.

q Bu, burun için temel formüldür—30 ml saf suya 1 aktif damla. Sıkı kapaklı bir şişede muhafaza edilirse ve serin ve karanlık bir yerde saklanırsa, bu yaklaşık bir hafta sürecektir. Bu nedenle, gerekirse her hafta yeni bir parti hazırladığınızdan emin olun.

Machine Translated by Google

MMS1 Burun Prosedürü

Aşağıdaki prosedür, bir kişinin burnu tıkandığında ve/veya üşüttüğünde etkilidir. Buna ek olarak, aynı yöntem genellikle, bir kişinin devam eden sinüs sorunları ve haftalarca hatta yıllarca sürekli tıkalı bir burnu olduğunda işe yarar. Aynı teknik, gribin üstesinden gelinirken Protokol 1000'e ek olarak kullanılabilir.

Aşama 1

q Yukarıdaki formülü kullanın—30 ml suya 1 etkinleştirilmiş MMS damlası.

q Bir yatağa sırt üstü yatın. Başınızı yastığa koymayın.

Adım 2

Bir burun deliğine bu solüsyondan 4 ila 8 damla koyun. Burun sade suyla bile yanacağı için biraz yanacaktır ama MMS1 herhangi bir zarar vermeyecektir. Buradaki fikir, MMS1'in bir kısmının sinüslerinize akmasına izin vermek ve orada yaklaşık beş dakika kalmaktır. Ayağa kalktığınızda bunun bir kısmının bitmesini bekleyebilirsiniz. Elinizde bir mendil olmasına yardımcı olur.

q Diğer burun deliği için yukarıdaki adımı tekrarlayın.

Not: Bunu, iyileşene kadar günde 3 kez yapın, çoğu durumda dört günden fazla olmamalıdır. Dört gün içinde iyi değilseniz, iyileşene kadar devam edin.

Banyo ve Ayak Banyosu Protokolü

MMS1 veya MMS2'de banyo yapmak, başka bir alma yöntemidir. MMS1 (klor dioksit, ClO2 üreten), veya MMS2

Machine Translated by Google

(Su ile karıştırıldığında vücudun patojenleri yok etmek için kullandığı bir asit olan hipokloröz asit [HOCl] üretir), farklı bir yolla da olsa vücuda girer, böylece diğer bölgelere ulaşabilir ve dokulara daha derine inebilir.

MMS1 Banyoları için Talimatlar

Tam Banyo

Not: MMS banyoları için içinde klor veya florür bulunan su kullanmayın. Musluk suyunuzun klor veya florür içerip içermediğini bulmaya çalışın; varsa, ters ozmoz su filtresi kullanın veya büyük şişelerde arıtılmış su satın alın. Bir başka olası seçenek de, birçok insanın boraksın banyo suyundan florür ve kloru ortadan kaldırabileceğini söylemesidir. İnternette çok sayıda anekdot kanıtı var ve bazı kimya, borakstaki borunun sudaki florürden bor florür oluşturduğunu gösteriyor. Bu zehirli bir kimyasal değildir ve sağlığınız için tehlikeli değildir. Benzer bir zehirsiz kimyasal da klordan üretilir. Standart boyutlu bir küvet için iki yuvarlak yemek kaşığı boraks kullanın. Boraksı suya karıştırdıktan sonra en az 15 dakika bekleyin (soğuk veya sıcak su uygundur), ardından MMS'inizi ekleyin.

Aşama 1

q 20 MMS damlasını etkinleştirin, 30 saniyeye kadar sayın ve kehribar rengine döndüğünden emin olun.

q Etkinleştirilmiş damlaları 6 ila 12 inç (15 ila 30 cm) su içeren bir küvete ekleyin. Rahatça dayanabileceğiniz kadar sıcak su kullanın.

q Küvete girin ve uzanın ya da mümkün olduğunca fazla su almak için kendinizi konumlandırmaya çalışın. Tamamen suya batmadıysanız, suyu vücudunuza nazikçe sürmek için ellerinizi kullanın.

Machine Translated by Google

q Yaklaşık 20 dakika suda kalın.

Not: Banyo başına 20 etkinleştirilmiş MMS damlası kullanarak başlayın, bir dahaki sefere 40 etkinleştirilmiş damla ve ardından 60 damla kullanın.

Adım 2

q Günde 1 ila 3 kez ve genellikle banyo başına 60 damladan fazla olmayan bir MMS1 banyosu yapın.

Aşama 3

q İkinci veya üçüncü günde, aktivasyon süresi tamamlandıktan sonra MMS1 solüsyonuna DMSO damlaları eklemeye başlayın.

(Küvetinizin tamamen temiz olduğundan ve sabun vb. kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun .) İlk önce aktif MMS damlalarının yarısı kadar DMSO kullanın ve ardından her banyo hazırladığınızda DMSO damlalarını artırın. her 1 damla etkinleştirilmiş MMS (MMS1) için 3 damla DMSO kullanana kadar. Etkinleştirilen her MMS damlası için 3 damladan fazla DMSO kullanılması gerekli değildir. (1 damla MMS1 dediğimizde bunun 1 damla aktif MMS olduğunu unutmayın.

Teknik olarak 1 damla MMS1 2 damla sıvıdır, [1 damla MMS + 1 damla aktivatör asit = 2 damla sıvı].
Ancak biz buna 1 damla MMS1 dozu diyoruz.
Bu durumda, aktivatörün düşüşünü saymıyoruz. Bu nedenle, 3 damlalık bir MMS1 dozu, her 1 damla MMS1 [aktif MMS] için 3 damla DMSO olan 9 damla DMSO gerektirir.)

q İster sadece MMS1 ile banyo yapıyor olun, ister suya DMSO eklemiş olun, yaklaşık 20 dakika suda kalın.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Banyolar çok önemli olabilir ve kendinizi daha iyi hissettiğinizi fark ederseniz, elde edilecek başka bir şey kalmadığından emin olana kadar MMS1 banyolarını (günde üç banyoya kadar) almayı bırakmayın.

Ü Günde en fazla üç MMS1 banyosu yapılmasını ve ikinci veya üçüncü günde banyoya DMSO eklenmesini öneren yukarıdaki talimat, belirli bir hastalıkla mücadele eden ve/ veya hayatı tehdit eden bir hastalık. Ancak MMS1 banyosu (veya MMS2 banyosu—aşağıya bakın) birçok amaca hizmet edebilir. Bu banyolar genel bir detoksifikasyon için harikadır, özellikle de seyahat/uçak uçuşları veya büyük kirli bir şehirde bir veya birkaç gün geçirme gibi bazı sert toksinlere "maruz kaldıkları" biliniyorsa veya herhangi bir genel toksik ortamda. Maruz kaldığınız şeylerden dolayı ekstra detoksifikasyona ihtiyaç duyuyorsanız, MMS banyosunu deneyin.

Ü Büyük ve kirli bir şehirde yaşıyor ve çalışıyorsanız, haftada 1 ila 3 kez MMS banyosu yapmayı düşünebilirsiniz. Ya da sadece rahatlamak ve cildi güzelleştirmek için haftada birkaç kez bu banyoların keyfini çıkarmak isteyebilirsiniz.

Ü Bir MMS banyosu bir güzellik bakımı işlevi görebilir ve birçoğu, haftalık programlarına MMS banyolarını ekledikten sonra daha temiz, pürüzsüz ve yumuşak bir cilt bildirmiştir. MMS1 veya MMS2 banyosunu deneyin, vücudunuzun neler yapabileceğini görün, ardından ihtiyaç duyulduğunda ve/veya yönlendirildiğini hissettikçe bu banyoları rutininize ekleyin.

Ayak banyosu

Tam bir MMS banyosu, bir MMS ayak banyosundan çok daha etkilidir ve bu nedenle daha arzu edilir. Bunun nedeni, cildin daha fazlasının MMS çözümü ile doğrudan temas halinde olması ve

Machine Translated by Google

vücudun çeşitli bölümleri, hedeflenen bir bölgedeki deriden MMS'i doğrudan alma şansına sahiptir. Örneğin, meme kanseriniz varsa ve kendinizi (ve göğüslerinizi) suyun altına sokabiliyorsanız, faydası olabilir. Veya sorun mahrem yerlerinizdeyse ve MMS suyuna dalmışsanız, sorunlu bölgeye daha fazlası doğrudan emilebilir.

Küveti olmayanlar, şu ya da bu nedenle küvete girip çıkamayanlar ya da belki de tam bir banyo için yeterince temiz suyu olmayanlar için ayak banyosunu öneriyorum. Ayak banyoları, rahatlamak için harika bir yoldur ve bu yöntemle, iyi miktarda MMS hala sisteme girebilir ve biraz iyi sonuç verebilir. Lütfen dikkat, ayak banyosu için tüm vücut banyosu ile aynı miktarda damla öneriyorum. Bunun nedeni, ayaklardaki, ayak bileklerindeki ve hatta bacaklardaki cildin göğüs, sırt, kollar, mide ve özel kısımlardan daha güçlü veya daha sert olma eğiliminde olmasıdır.

Aşama 1

Küçük plastik bir leğende ayak bileği yüksekliğinde su kullanın.

q Aynı miktarda MMS1 ve DMSO damlası içeren tam banyo için yukarıda verilen talimatların aynısını izleyin.

Varyasyonlar

Ü Su az ise ayak banyosunu ayağın üst kısmına ulaşamayacak kadar az su ile hazırlayabilirsiniz.
Ayağın üstüne bir bez koyun ve ayağın altında hala bir miktar su kalırken suyun bezin içine girmesine izin verin.
Bu bir tür kompres görevi görür ve yine de daha fazla MMS'in deriye/ dokulara girmesine yardımcı olur.

Ü Ayak banyosunu su için daha derin bir kap kullanarak, örneğin bir kova kullanarak, suyun yüzeye ulaşması için hazırlayın.

Machine Translated by Google

buzağıya veya dizlere. Aynı formülü uygulayın—banyo başına 60'a kadar etkinleştirilmiş MMS damlası ekleyin. Bu, daha büyük bir cilt alanının kaplanmasını sağlar.

MMS2 Banyoları için Talimatlar

Dikkat: MMS1 banyosunun aksine, bir MMS2 banyosuna asla DMSO eklemeyin! (Daha fazla ayrıntı için 23-24. sayfalardaki uyarıya bakın.)

Aşama 1

q Banyo veya ayak banyosu suyunuzu Tam Banyo bölümü, sayfa 143'teki notta verilen talimatlara göre hazırlayın.

Adım 2

q Tam bir banyo için ilk defa 3 seviyeli çay kaşığı (15 ml) MMS2 (kalsiyum hipoklorit) kullanın. Cilt iyiyse, banyo başına 10 seviye çay kaşığı (50 ml) MMS2'ye kadar dikkatli bir şekilde artırabilirsiniz. MMS2 granüllerini suya dokunmadan serpmek isteyebilirsiniz, daha sonra suya bir kez elinizle karıştırın. Elinize kuru granüllerin bir kısmı bulaşırsa, iyice durulanana kadar gözlerinize dokunmamaya dikkat edin.

q Ayak banyosu için, yukarıda ana hatları verilen MMS2 tam banyo ile aynı ölçüleri kullanın.

Not: Cilt tipleri kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Cildinizde herhangi bir tahriş veya yanma fark ederseniz hemen sudan çıkın ve durulayın. Bir dahaki sefere sadece 1/2 kadar MMS2 kullanın.

Varyasyon :

MMS1 banyosu, MMS2 banyoları için geçerli olabilir.

Machine Translated by Google

Yine, ikisi uyumlu olmadığından bir MMS2 banyosuna asla ve asla DMSO eklememeniz istisnasıdır.

Lavman Protokolü

Lavmanlar binlerce yıldır birçok kültürde vücudu temizlemek, ateşi düşürmek ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılmıştır. Yakın zamana kadar doktorların yaygın olarak kullandığı bir araçtı. Ayrıca, özellikle tolere edilebilir maksimum oral doza ulaşıldığında MMS1 için etkili bir dağıtım sistemi olabilir.

Bir MMS1 lavmanı kullanmak, sağlığın iyileşmesi için genellikle çok önemlidir. Lavman karaciğere ve kan dolaşımına klor dioksit verir, ayrıca bağırsaktaki toksinleri nötralize eder ve parazitleri öldürür. Ayrıca lavmana MMS1 eklenmesi kolondaki patojenleri öldürür ve MMS1'in çoğu kolon duvarlarından kan plazmasına emilir. Çoğu durumda lavman, kolona çok ihtiyaç duyulan bir temizlik sağlayacaktır.

Kendinize nasıl lavman yapacağınızı bilmiyorsanız, denemeden önce lütfen çalışın ve süreci öğrenin. İnternette bu amaçla birçok eğitim sitesi bulunmaktadır. Herhangi bir arama motoruna “lavman nasıl yapılır” kelimesini yazmanız yeterlidir ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız.

Çoğu lavman ekipmanı veya kiti, rektuma ve kolona yaklaşık 6 ila 8 inç kadar yerleştirilen sert bir ağızlığa sahiptir. Sert lavman nozülünü kullanmaya alternatif olarak, sert plastik nozül yerine lavman torbası olan basit bir kateter kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Kateter esnek bir tüptür ve bu nedenle, bazılarının yaptığı gibi, daha sert ucu kullanarak kolonun yan tarafına muhtemelen bir delik açılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Hangi ekipmanı kullanmaya karar verirseniz verin, yavaş gidin ve ilerlemeyin

Machine Translated by Google

rahatsızlık varsa. (Bazı lavman torbaları kateter tüpünü de içerir veya bunlar, kateteri lavman torbası tüpüne bağlayan bir konektörle birlikte ayrı olarak satın alınabilir. Bu ekipman çoğu eczanede veya daha fazla seçenek için çevrimiçi olarak mevcuttur.)

Lavman Protokolü Talimatları

Notlar

Ü İster mesane güçlükleri gibi çeşitli problemler için tek başına lavman kullanıyor olun, ister aynı anda başka protokollerde olun, 1000 ml (1 litre/litre) arıtılmış suya (ılık veya vücut ısısı) lavman torbasında başlamak için iyi bir miktar olacaktır. 30 damlaya ulaşana kadar her lavmandaki damlaları artırın. Herhangi bir zamanda rahatsızlık hissederseniz veya çözelti çok güçlüyse, damlaları yarıya bölün ve oradan yavaşça tekrar çalışıp rahat edebileceğiniz şeye kadar çalışın.

Ü Aktivatör asit olarak sitrik asit kullanmak, özellikle 20 damlayı geçtikten sonra, damlalarıyla çok yükselirse yanma eğilimi gösterebilir. Lavmanlar için, %4 HC1 (hidroklorik asit), kullanılması tercih edilen aktivatör asittir.

Ü Paslanmaz çelik lavman torbası kullanmayın. Bazı insanlar bunları en iyisi olarak görür, ancak paslanmaz çelik MMS ile kimyasal olarak reaksiyona girebilir ve bu nedenle iyi bir seçim değildir.

Dikkat: DMSO'yu asla lavmanda kullanmayın! Neden? Niye? Kolon, vücudun dışarı attığı birçok toksin içerir. DMSO'yu kolona koyarsanız, bu toksinlerin bir kısmını kan dolaşımına geri verebilirsiniz.

Machine Translated by Google

Aşama 1

q Lavman çantanız için suyu 1000 ml (1 litre/quart) distile, ters ozmoz veya şişelenmiş suyu vücut sıcaklığına ısıtarak hazırlayın. (Soğuk su kullanmak şiddetli kramplara neden olabileceğinden, lavman torbası suyunu vücut sıcaklığına kadar ısıtmak önemlidir.)

q Kullanmak istediğiniz damla sayısını seçin (ilk seferde 5 damla). Temiz, kuru bir bardakta damlalarınızı etkinleştirin ve 30 saniye sayın. (Unutmayın, sitrik asit kullanıyorsanız, lavman başına 20 damlayı geçmek istemeyeceksiniz. Lavman için tercih edilen aktivatör %4 HCl'dir.)

q Aktifleşen damlaları hazırladığınız ılık suya ekleyin. MMS aktive edici bardağa ılık suyun bir kısmını dökün ve ardından bu solüsyonu ılık su içeren kaba geri dökün. Artık lavman torbası çözümünüz var. (Bu hazırlık için kullanılan tüm kapların çok temiz olduğundan emin olun.)

Adım 2

q Lavman torbanızı solüsyonla doldurun. İlk birkaç lavman için bu solüsyonun yarısını veya daha fazlasını kullanmakta rahat değilseniz lavman çantanızda daha azını kullanmanız kabul edilebilir. 1000 ml (1 litre/quart) solüsyonun tamamını kullanana kadar her seferinde sıvı miktarını biraz artırabilirsiniz. Kendi hızınızda gidin, kendinizi aşırı derecede rahatsız etmeyin. Rahatsızlık hissederseniz 1000 ml'ye (1 litre/litre) ulaşmadan durun.

Aşama 3

q Lavmana başlayın. Suyun akmasına izin verin. Mümkünse 5 ila 10 dakika tutmaya çalışın. Tutamıyorsan,

Machine Translated by Google

sorun değil. Daha küçük bir miktar tutmayı deneyin, bazen daha kolaydır, sonra tekrarlayın.

Notlar

Ü 5 damlalık bir solüsyonla başlıyorsanız, bunu bir veya iki kez yapın ve ardından 10 damla solüsyon yapın, vb.

Ü Çalışırsanız 20-30 damlaya kadar çıkabilirsiniz ama sorun yaratıyorsa devam etmeyin.

Ü Günde 2 ila 3 lavman yapabilirsiniz.

Ü 4 veya 5 lavman yaptıktan sonra iyileşme görüyorsanız, başka bir gelişme belirtisi kalmayana kadar lavman yapmaya devam edin. Ancak 4 veya 5 lavmandan sonra düzelme olmazsa bunlara devam etmeyin. Dediğim gibi, lavmanlar sağlığın iyileşmesinin çok önemli bir parçası olabilir; ancak, vücut için zor olabileceğinden uzun süreli lavman kullanımını önermiyorum. Bu durumda 4 veya 5 lavmandan sonra herhangi bir ilerleme belirtisi görmüyorsanız devam etmeyin. Sağlık Kurtarma Planında belirtilen sonraki protokole veya prosedüre geçin.

İstisna: Diğer protokollerde iseniz ve hayati tehlike oluşturan bir hastalıkla mücadele ediyorsanız lavmandaki damlaları buna göre artırabilirsiniz. Örneğin, daha fazla miktarda MMS1'i tolere eden kişilerden biriyseniz - örneğin oral dozunuzda saatte 9 ila 12 damla veya daha fazla alıyorsanız - o zaman koyduğunuz MMS1 miktarını artırabilirsiniz. lavman çantanız. Ancak lavman başına 1000 ml (1 litre/ quart) suya 60 damlayı aşmayın.

Unutma, bu bir istisna, kural değil.

Lavman ile prostat ve mesane problemlerinde ve diğer birçok problemde iyi sonuçlar alınmıştır.

Machine Translated by Google

koloniler

Kolonik (ayrıca kolonik hidroterapi veya kolon irrigasyonu olarak da adlandırılır), kolonu temizlemek ve temizlemek için bir kolon terapisti tarafından rektuma su infüzyonudur. Kolonikler ve lavmanlar, rektum yoluyla su vererek kolonu temizlemeyi amaçlar. İki yöntem yaklaşım ve sağlık yararları açısından benzer olsa da, kolonikler ve ene arasında bazı belirgin farklılıklar vardır.

ancak.

Lavmanlar, kolona bir kerelik su infüzyonunu içerir. Kolonikler, kolona birden fazla su infüzyonu içerir. Lavmanların temel amacı alt kolonu boşaltmak iken, kolonikler kolonun daha büyük bir bölümünü temizlemek içindir. Kolonik daha kapsamlıdır ve sorunun ve hastalığın ne olduğuna bağlı olarak daha faydalı olabilir.

Kendin yap kitlerinin yardımıyla evde yapılabilecek lavmanlardan farklı olarak, kolonikler özel ekipman gerektirir ve eğitimli bir kolon terapisti tarafından uygulanmalıdır.

Kolon sıcaklığı sırasında, filtrelenmiş su yavaşça kolona salınır. Su, kolon kaslarının peristalsis adı verilen kasılmasına neden olur. Peristalsis, kapalı bir atık sistemine atılmak üzere dışkıyı hortumdan "iter". Bu işlem sırasında kolon terapisti işlemi kolaylaştırmak için müşterinin karın bölgesine hafif masaj uygulayabilir.

Ne yaptığını bilen deneyimli bir kolonik terapisti bulmak isteyeceksiniz. Terapist, kolonları almanız için herhangi bir kontrendikasyon olmadığından emin olmak için sağlık geçmişiniz hakkında sorular sormalıdır. Ek olarak, terapist basit bir harici uygulama yapmalıdır.

Machine Translated by Google

kolon ve bağırsağın kontrolünün yanı sıra, kolonileri almanız için koşulların uygun olduğundan emin olmak için çok basit bir rektal muayene.

Ayrıca tavsiyeniz üzerine kolonda MMS1 kullanacak bir terapist bulmak isteyeceksiniz. MMS1 ile deneyimli olabilir veya olmayabilirler (damlaların nasıl kullanılacağı konusunda onları yönlendirebilirsiniz). Genellikle içinde klor ve/veya florür olacağından, musluktan su değil de iyi su kullanıp kullanmadıklarını iki kez kontrol ettiğinizden emin olun. Rutin olarak, bir önlük giymenizi ve kolon için bir masaya yatırmanızı isteyeceklerdir.

İlk defa 20 damla MMS1 (aktif MMS), ikinci defa 50 damla MMS1 kullanmanızı öneririm.
Her şey yolunda giderse ve kolonilerle devam ederseniz, sonraki kolonik seanslar için 100 MMS1 damlaya kadar çıkabilirsiniz.
(Bu damla miktarı 20 ila 25 litre/litre su içindir. Kolonikte daha fazla su kullanılıyorsa damlalar buna göre ayarlanabilir.)

Unutmayın, bir kolonda kullanılan çok fazla su vardır, bu nedenle bu miktarda MMS1 sorun olmaz.

Duş Protokolü

Bu Protokol vajinal problemler, kötü enfeksiyonlar, ayrıca kanser ve kadın üreme organlarının (yumurtalıklar, rahim ve meme) diğer hastalıkları ve sorunları (miyomlar, polipler ve kistler gibi) için önerilir.
Meme kanseri durumunda, serviks MMS1'i emer ve onu lenfatik sisteme ve memeye taşır.
Duştaki MMS1, bölgedeki patojenleri öldürür ve vücudun orada sağlık yaratmasını sağlar. Genel olarak, duşlar yalnızca bir şeyin düzeltilmesi gerektiğinde gereklidir.

Machine Translated by Google

MMS1 Duş için Talimatlar

Aşağıdaki talimatlar, birinin nasıl duş yapılacağını bildiğini varsayar. Değilse, lütfen bu protokolü uygulamadan önce süreç hakkında kendinizi yeterince eğitin.

Aşama 1

q 2 fincan/500 ml'lik bir duş torbasına ihtiyacınız olacak. Daha büyük bir duş torbası kullanabilirsiniz, ancak 2 bardak/500 ml'den fazla su kullanmanıza gerek yoktur.

q Çözümünüzü hazırlayın. 2 bardak/500 ml saf, damıtılmış veya ters ozmoz suyuna 5 damla MMS1 ile başlayın. Lavman gibi, %4 HCI, bir duş ile kullanmak için tercih edilen aktivatör asittir, ancak %50 sitrik asit kullanılabilir. Duş için suyu vücut sıcaklığına ısıtmak en iyisidir.

q Duş yaparken, tekrar akmaya başlayana kadar suyun akmasına izin verin, ardından akışı kapatın. (Douche çantanızın bulunduğu tüp genellikle su akışını açmak ve kapatmak için bir kelepçe ile birlikte gelir.)

q Olabildiğince uzun süre tutmak için pelvik/vajinal kasları sıkın ve sonra bırakın. Torba boşalana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Adım 2

q Herhangi bir advers reaksiyonunuz yoksa, bir sonraki duş için MMS1 damla miktarını artırın.

q Bir dahaki sefere duş torbasına döktüğünüz suya 10 aktif damla ekleyin ve ağrı veya problem olmadığı sürece 30 damlaya kadar artırmaya devam edin, ancak 30 damladan fazla kullanmayın. Bu miktara yavaş yavaş artırın.

Machine Translated by Google

Duşa DMSO Eklemek

q Duşunuz, MMS1'in dokuların daha derinlerine nüfuz etmesine yardımcı olabilecek DMSO kullanımıyla daha etkili olabilir. Çantanızda kullandığınız her 1 damla MMS1'e 3 damla DMSO ekleyin.

Dikkat: Bir duşa DMSO eklerken, kauçuktan veya lateksten (kauçuğun rafine bir şekli olan) yapılmamış bir duş çantanız olması önemlidir . Çeşitli tipte duş kapları mevcuttur, eğer DMSO eklemek isterseniz kauçuktan değil plastikten (hortum dahil) yapılmış olanı kullanın, çünkü kauçuk DMSO ile birlikte vücuda sızabilir.

Notlar

Ü Yanma ve/veya batma hissediyorsanız, bu genellikle mantarın varlığının bir göstergesidir. Bu durumda, kil bir duş yapmanızı öneririm. Duşunuz için 2 bardak su içinde 1 çay kaşığı kil (Aztek kili, bentonit, kil veya montmorillonit kili) kullanın. Bu kil duşları için duş kabını iyice çalkalayın. Günde iki veya üç kil duşu yapın ve bir saat sonra kili her zaman (douche torbası ve temiz su kullanarak) “yıkayın”. Üç gün sonra, yanmaya ve/veya batmaya neden olan aynı MMS1 solüsyonunu kullanarak mantarın geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz. Artık batma ve/veya yanma hissetmiyorsanız, bu mantarın gittiği anlamına gelir, ancak daha fazla kil olmayan duşlara ihtiyaç duyulabilir. Bu Duş Protokolündeki talimatlara göre MMS1 duşlarınıza devam edebilirsiniz.

Ü Kanser veya kötü enfeksiyon durumunda günde 4 ila 5 kez duş yapabilirsiniz (buna kadar çalışın). Duşun tahrişe neden olmadığından emin olun.

Machine Translated by Google

Ü Normalde, sorunun ciddiyetine bağlı olarak günde 1 ila 4 kez duş alın. Günde bir kez yeterli olabilir.
Her gün kaç kez belirlemek size kalmış.
Kuralı hatırla, kendini geliştirdiğin sürece durma, faydası yoksa devam etme.

Ü Uyurken emilim ve detoks için günün son duşunu yatmadan önce yapın. Unutmayın, yaklaşık bir hafta sonra herhangi bir gelişme görmezseniz devam etmeyin, gelişme olduğu sürece devam edin.

Ü Ne zaman Douche Protokolü yapıyorsanız, duruma göre Protokol 1000 veya Protokol 2000 olmak üzere sözlü protokolü almak her zaman iyi bir fikirdir.

MMS Çanta Protokolü

Bu işlem, patojenlerin, zehirlerin ve ağır metallerin üstesinden gelmeye yardımcı olarak, MMS1 klor dioksitin vücuda girmesine ve vücuda girmesine ek bir şekilde yardımcı olur. Bu gaz verme işlemi, bir sprey şişesi kullanmaktan daha yoğundur.

Dikkat: Herhangi bir dumanı solumaktan kaçının. MMS1'in kontrollü cilt teması iyidir, ancak ciğerleriniz çok fazla klor dioksit gazına tahammül edemez. Bunu yaparken odada bir pencere açın. MMS1 dumanını birkaç kez solumanız durumunda, ilk başta çok fazla reaksiyon göstermeyebilirsiniz, ancak solumanız durumunda, bir süre sonra (dört saat kadar) zorluk yaşayabilirsiniz. bir süre nefes almak. Başlamak için doğrudan solumaktan kaçınmak en iyisidir.

MMS1 Torba Protokolü Talimatları

Bu işlem günde 2 defa, gerekirse birkaç gün arayla yapılabilir. Belirli sayıda etkinleştirilmiş damla ile başlamak ve

Machine Translated by Google

üç gün boyunca miktar. Bu protokolü denemeden önce aşağıdaki her noktayı dikkatlice okuduğunuzdan ve iyice anladığınızdan emin olun.

Aşama 1

q İki büyük çöp torbası alın (büyük siyah olanlar en iyisidir) ve bunlardan bir torba yapın. Onları bir masaya ya da yere koyun, her torbanın açılışında birleştirin. Bu bağlantı noktasında, her bir torbanın ağzı diğerine bantlanarak uzun bir torba oluşturacak şekilde 2" (5 cm) genişliğinde nakliye/paketleme bandıyla bunları tamamen bantlayın. (Bunları bir arada tutmak için küçük bant parçaları kullanarak başlayabilir ve ardından geniş bantla, önce bir tarafı sonra diğer tarafını bantlayarak baştan sona bantlayabilirsiniz.)

q Torbanın bir ucunu kesip açın ve ardından iki torbayı birbirine bantladığınız merkezde birbirine yapışmadığını kontrol edin.

Adım 2

q Tamamen soyunun veya mümkün olduğunca az kıyafet giyin.

q Çantayı açın ve içine girin. Bu noktada, oturabilmeniz için kullanışlı bir sandalyeye sahip olmak yardımcı olur. Ayaklarınız çantadayken bel hizasına kadar çekin, sonra sandalyeye oturun ve damlalarınızı hazırlayın.

q İlk gün, bir bardağa 20 damla MMS ve 20 damla %50 sitrik asit veya %4 HCl koyun ve hemen (30 saniye saymayı beklemeyin) bardağı poşetin içine oturacak şekilde yerleştirin. yere dökülmemesine dikkat ederek ayaklarınızın yanına koyun. Dökülürse, ayağınıza bulaştırmamaya dikkat edin, ancak devam edin ve aynı şekilde klor dioksit dumanı oluşturacağı için kullanın.

Machine Translated by Google

q Dikkatlice ayağa kalkın ve torbayı omuzlarınızın ve boynunuzun etrafına çekin, plastiği sarın ve katlayın, böylece duman çıkmasın.

Dikkat: Başınızı torbanın içine sokmayın veya herhangi bir dumanı solumayın.

Aşama 3

q İlk gün, çantada beş dakika daha fazla kalmayın. Cildinizde herhangi bir yanma hissederseniz, beş dakika geçmemiş olsa bile hemen çantadan çıkın. (Bu durumda, durulayın ve/veya duş alın.)

q Bu prosedürün tamamını ilk gün 1 kez daha tekrarlayın, (başka bir deyişle, günde 2 kez).

4. Adım

q Ciltte tahriş olmadığı sürece bu işlemi iki gün daha uygulayın. İkinci gün 30 etkinleştirilmiş damla kullanın ve üçüncü gün 40 etkinleştirilmiş damla kullanın. Ciltte tahriş olmadığı sürece poşetteki süreyi 10 dakikaya kadar uzatabilirsiniz ama artık değil. Cildinizde herhangi bir yanma hissederseniz hemen çantadan çıkın ve duş alın. Yanma hissi olsun veya olmasın , çantada 10 dakikayı geçmeyin. Yanma hissi olmadığı sürece bu işlemden sonra duş almaya gerek yoktur.

Adım 5

q İşler iyi gidiyorsa, yardımcı olup olmadığına karar verene kadar bunu birkaç gün daha sürdürebilirsiniz. İyileşme fark ederseniz, yardımcı olduğu sürece devam edin.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Bu protokolü cilt sorunları için veya vücudunuza daha fazla MMS almak için kullanın. Eğer yardımcı oluyorsa, unutmayın, devam edin!

Ü Bu protokol için CDS veya CDH kullanamazsınız.

Akciğer Protokolü (Kupa)

Bu protokolün açıkça takip edilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir . Lütfen bu protokolü birkaç kez baştan sona okuduğunuzdan ve bunu denemeden önce her adımı net bir şekilde anladığınızdan emin olun. Klor dioksit gazı, bu prosedürde kullanıldığı için, onu yutmamızın en güçlü yoludur. Bu nedenle , talimatları yakından takip etme gereğini yeterince vurgulayamam , aksi takdirde tehlikeli olabilir.

Aynı şekilde, talimatları dikkatli bir şekilde takip ederseniz, ciğerlerinize de yeni bir soluk getirebilir.

Bu talimatları harfi harfine uygularsanız hiçbir tehlike yoktur, ancak insanlar genellikle çok heveslenirler ve çok fazla şey yaparlar ve o zaman acı çekebilirler. Dünyaya bu protokolü anlatmakta tereddüt ediyorum, size burada anlattıklarımla değil, ama hevesli insanlar bir an önce iyileşmek istedikleri için bazen aşırıya kaçtıkları için. Bazıları burada söylediklerimi alıp fazla ileri götürebilir. Bu yüzden yavaş gidin ve aşırıya kaçmayın. Bu durumda daha fazlası kesinlikle daha iyi değildir.

Akciğer Sorunları

Size akciğerler için birçok hastalık adı verebilirim: astım, KOAH, kistik fibroz, bakteriyel pnömoni, amfizem, pulmoner emboli ve soğuk algınlığı, krup, tüberküloz ve akciğer kanseri gibi her türlü hafif ila ciddi solunum yolu hastalıkları. Hastalıkların çoğu

Machine Translated by Google

akciğerler hissedebileceğiniz semptomlara neden olur ve çoğu öksürmenize neden olur. Öksürüğe genellikle boğazdaki gıdıklanma neden olmaz, bunun nedeni vücudun solunum tüplerini tıkayan mukusları öksürmeye çalışmasıdır. Mukus ayrıca çeşitli hastalıkları gizleyebilir. Akciğerlerdeki mukustan kurtulmak, akciğerleri iyileştirmenin anahtarıdır. Benim "kupa" olarak adlandırmaktan hoşlandığım bu protokol bunun için. MMS1'den (aktive edilmiş MMS) salınan klor dioksit gazı, mukustan kurtulmanın yanı sıra, mukusta saklanmayan akciğerlerdeki hastalık patojenlerini de öldürebilir.

MMS1 Gazı ile Akciğerlerinize Nasıl Yardım Edebilirsiniz (bardak kullanarak)

Aşama 1

q 8 ons sıvı alan temiz, kuru bir bardak veya bardak kullanın. (Üstte yaklaşık 3 inç/7,6 cm çapında bir bardak idealdir.) Karışımla olumsuz reaksiyona gireceği için kesinlikle metal bir kap kullanmayın .

q 2 damla %50 sitrik asit veya %4 HCl ile 2 damla MMS'i etkinleştirin. Elinizi hemen bardağın ağzını tamamen kapatacak şekilde tutun ve 10 saniye sayın. (Sayarken, iyice karıştırmak için bardaktaki damlaları hafifçe döndürün.)

Adım 2

q 10 saniye sonra bardağı yavaşça burnunuza getirin ve ardından elinizi çekin. Burnunuzu bardağın ağzına dayayarak, burnunuzun ucunda bir "ısırık" (batma veya acıma hissi) hissedene kadar yavaşça nefes alın. Bir ısırık hissettiğinizde hemen durun. Bunu sadece bir kez yapın, burundan nefes alın.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Ardından elinizi 10 saniye daha bardağın ağzına koyun.

q İkinci 10 saniyelik sayımın ardından bardağı ağzınıza getirin, elinizi fincandan çekin ve ciğerlerinizde bir "ısırık" hissetmeye başlayana kadar bardağın ağzından ağzınızdan yavaşça nefes alın, ardından Dur.

Bu seans için bu kadar.

Unutma

• Burundan ve ağızdan nefes alırken—yavaş nefes alın.

• Yalnızca bir ısırık (acıma veya acıma hissi) hissetmeye başlayacak kadar derin nefes almaya özellikle dikkat etmek istiyorsunuz . Anahtar, o noktaya ulaşmaktır, ama daha fazlası değil.

• Isırmanın başlangıcı, durma sinyalidir.

4. Adım

q Sekiz ila on saat kadar sonra, yukarıda belirtildiği gibi Adım 1 ila 3'ü tekrarlayın. Bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere günde sadece 2 kez yapın.

Bakılacak şey

Muhtemelen bu işlemi yaparken aranması ve akılda tutulması gereken en önemli şey, MMS'in sizi daha kötü değil, daha iyi hissettirmesi gerektiğidir. Bu akciğer protokolünü kullanırken daha kötü hissediyorsanız, bir şeyler yanlıştır ve geri çekilmelisiniz. Damla miktarını azaltın

Machine Translated by Google

fincandan 1 damla MMS1'e kadar, biraz daha az nefes alın veya bir süre tamamen durun. Kendinizi daha iyi hissedene kadar yavaşça gidin.

Kupa Prosedürü İçin Önemli Noktalar

1. Kupa işlemini uygularken: Eğer ciddi bir akciğer rahatsızlığınız varsa MMS protokollerini de yapıyor olmalısınız. Normalde Başlatma Prosedürü ile başlar ve Protokol 1000, Protokol 1000 Plus'a kadar çalışır ve gerekirse Protokol 2000'e geçersiniz (bu kitapta ana hatları verilen Sağlık İyileştirme Planına göre). Unutmayın, dozunuzu yavaşça oluşturun.

2. Tüm talimatları izleyin: Bu işlemin zamanlaması ve kullandığınız bardak veya bardağın boyutu son derece önemlidir. Bardak/bardak en az 8 ons (yaklaşık 250 ml) olmalıdır, bu kapasitenin biraz üzerinde olabilir, ancak mümkün olduğunca 8 ons'a yakın olsun. Bu, fincan içinde yeterli gaz oluşturabilmek için tercih edilen boyuttur. 10 saniye sayımı da çok önemlidir, sanki çok daha uzun süre beklerseniz , solunacak gaz miktarı daha güçlü olacak ve bir kerede almak için çok fazla olabilir. Yukarıda belirttiğim gibi, lütfen bu yönergeleri açıkça izleyin.

3. Öksürük: Kupayı soluduktan hemen sonra, bu işlemi yaptıktan birkaç saat hatta bir gün sonrasına kadar herhangi bir yerde öksürük nöbeti geçirebilirsiniz. Klor dioksit gazı mukusu parçalamaya çalıştığından ve atılması gerektiğinden bu normaldir. Akciğerlerinizde oluşan ve patojenleri tutabilen mukusun bir kısmını gevşetecektir. Bu mukus daha sonra ya midenize inecek ve yavaş yavaş sisteminizden dışarı çıkacak ya da vücudunuz mukusu öksürecek ve tükürebileceksiniz. Birazcık mukus almak için uzun ve sert, muhtemelen bir saat kadar öksürebilirsiniz - bu sürecin bir parçasıdır. bunu büyük bulabilirsin

Machine Translated by Google

burnunuzdan bol miktarda mukus çıkacaktır, bu nedenle elinizde bol miktarda doku bulundurun.

Durmayan bir öksürük nöbeti durumunda, bir saatten fazla devam ederse, çok sıkı tutan (solunum tüplerinin kenarlarına yapışan) mukusu biraz daha gevşetmeniz gerekebilir. Bu özel durumda, öksürük nedeniyle biraz daha kötü hissedebilirsiniz. Bu durumda bir sonraki adım, Aztek kilini (veya bentonit kilini veya montmorillonit kilini) almaya başlamaktır. Öksürük durana kadar üç veya dört saat boyunca her saat başı 1/2 bardak su veya uygun meyve suyuna bir çay kaşığı kil alın.

Bu özel prosedürle, uyanık olduğunuzda, genellikle ciğerlerinizden veya solunum tüplerinizden arınmış mukus öksürürsünüz, ancak uyuduğunuzda mukus genellikle midenize akar ve bu kötü değildir. Vücudunuz bununla kendi mide asidinizle ilgilenecek ve sisteminiz aracılığıyla işleyecek ve size zarar vermeyecektir.

Notlar

Ü Yukarıda bahsedilen (kupa soluduktan sonra oluşabilecek) öksürük nöbetleri bir saatten uzun sürerse, bardaktaki damlaları 2 damla yerine 1 damlaya indirmeniz gerektiğinin göstergesidir.

Ü Öksürük hiçbir şey çıkmama noktasına geldiyse, Öksürük Protokolü'ne (sayfa 131) gidin ve oradaki yönergeleri izleyin.

4. Soğuk Almak: Bu protokolü yaparken soğuk algınlığına yakalanmak mümkündür. Bunun nedeni, mukusun akciğerlerden boşalması ve nadiren de mukus tarafından korunan soğuk mikropları salabilmesidir. Soğuk algınlığına yakalanırsanız, işleme devam edin ve bir gün içinde geçecektir.

Machine Translated by Google

veya iki tanesi, ihtiyacınıza göre Protokol 1000 veya 2000'e göre ağızdan MMS1 veya MMS2 almanız şartıyla.

5. Yavaş gidin: Akciğer süreci, kolayca aşırıya kaçabileceğiniz bir şeydir. Ama unutmayın, altın kurallarımdan biri: İyileştiğiniz sürece yaptığınız şeyi değiştirmeyin. Durumunuz kötüleşiyor gibi görünüyorsa, durun veya daha az miktarda MMS yapın. Ciğerleriniz sağlıklı olana kadar devam edin. Unutma, kolay gelsin. Ve gerektiğinde kil kullanın (yukarıda öksürük ile ilgili 3. maddede belirtildiği gibi).

Bronşit: Arka arkaya 5 yıl boyunca her yıl kış aylarında ciddi bir bronşit vakası geçirdim. MMS buldum ve semptomların ilk belirtisinde almaya başladım. 3 yıldır bronşit olmadım. Soğuk mevsimde haftada bir kez önlem olarak alıyorum ve evimizdeki herhangi biri soğuk algınlığı, grip vb. Belirtileri gösterdiğinde, MMS'i alıp dozlamaya başlıyoruz. Her seferinde çalışır. -M.

R., Amerika Birleşik Devletleri

eğer

Kolay Nefes Alın: Uzun yıllardır sigara içiyorum. Bir grup MMS'i karıştırıp 4 ons suda 3 damla dozu almaya başladığımda, nefes almam çok daha kolay. Herhangi bir solunum probleminiz veya akciğer tıkanıklığınız varsa, her saat başı 3 damla MMS almaya başlayın. -BS, Amerika Birleşik Devletleri

eğer

Egzama: MMS'in iki yıldır çok acı çektiğim yüz egzamasını tamamen temizlediğini buldum. Her şeyi denedim, hiçbir şey işe yaramadı ama birkaç gün içinde MMS kafasına vurdu. Harika. —Peter, Yeni Zelanda

Machine Translated by Google

10. Bölüm
Hint Bitkisi - Nihai Sağlık Kurtarma Çabası

Sağlık İyileştirme Planında belirtilen tüm protokolleri uyguladıktan sonra sağlığınıza kavuşamadıysanız, bir sonraki adım Hint Bitkisini kullanmaktır. Ancak, bu son prosedüre geçmeden önce, MMS ile şimdiye kadar tam bir başarı elde edememiş olmanızın olası nedenlerinin listesini bir kez daha dikkatlice gözden geçirin.

(Bkz. Bölüm 8, Gerçeklik Kontrolü.)

Bu prosedür, kişinin sağlığına kavuşmasının çok önemli bir parçası olabilir. MMS'in bir tümörün küçülmesine yardımcı olmadığı görülen bazı durumlar vardır. Bu geçici olabilir, ama belki de değil. Protokoller 1000, 1000 Plus, 2000, 3000, Küf/Mantar ve bu kitapta açıklanan tüm çeşitli Destekleyici Protokolleri uygulandıkları şekilde kullandıktan sonra, yeterli ilerleme görülmezse, ancak o zaman Hint Bitkisi almayı düşünmenin zamanı gelmiştir.

Indian Herb, son 80 yılda binlerce insana yardım etti. Bu merhem MMS'in yaptığı gibi çalışmaz, bu nedenle farklı yan etkiler bekleyin. Bu bitkisel karışım ağrıya, şişmeye, kaşıntıya ve bazen de ateşe neden olabilir, bu nedenle MMS'i tercih ediyoruz. Ancak, bugün hayatta olan ve Hint Bitkisini kullanmasalardı burada olmayacak insanlar var. Birçok kişi bitkinin acısına dayanmak için ağrı kesiciler kullandı, ancak çoğu kullanmadı.

Machine Translated by Google

Hint otu için talimatlar

Aşama 1

q MMS almayı bırakmayın. Protokolünüze eklediğiniz çeşitli şeylerle devam edin: MMS1, MMS2, DMSO, lavmanlar, banyolar, vb. Başka bir deyişle, halihazırda kullanmakta olduğunuz her şeyle devam edin.

Adım 2

q Halihazırda yaptığınız şeyin bir parçası olarak Hint Bitkisini dahil edin. Kathleen'den (McDaniel Life-Line Water) şu adresten sipariş verebilirsiniz:

http://www.lifelinewater.com

Aşama 3

q Indian Herb ile gönderilen talimatları izleyin.

Talimatlar, 4 kısım Vazelin ile 1 kısım Hint Bitkisi ile seyreltmenizi önerir. Bazı zorlu durumlarda, Hint Bitkisi Vazelin ile karıştırıldığında işi yapmıyorsa, otu tam gücüyle kullanmanız gerekebilir. Sadece önerilen 4'e 1 karışımı denedikten sonra tam güç kullanın. Lütfen unutmayın, karışım ne kadar güçlü olursa, o kadar fazla acı yaşarsınız.

Başka bir deyişle, talimatlarda verilen miktarın iki katı kadar ve tam güçte Hint Bitkisi kadar güçlü kullanabilirsiniz. Ancak tam gücü hemen kullanmayın, çünkü daha az miktar (4'e 1) muhtemelen işi yapacak ve daha az acı verecektir. (4'e 1, tam güce geçmeden önce yardımcı olup olmadığını görmek için sonuç almıyorsa, daha güçlü bir 2'ye 1 karışımı deneyebilirsiniz.)

Machine Translated by Google

4. Adım

q Vücuttaki kanser için Hint otu ağızdan alınmalıdır. Genellikle 1/2 dolu bir 1 boy sebze veya jel kapsül kullanırız, ancak başlamak için sadece 1/4'e kadar doldurun ve günde iki kez alın. Indian Herb ile birlikte gelen talimatları izleyin, ancak lütfen yukarıdaki yorumları dikkate alın. Hint otunu ağızdan alırken, MMS dozlarınızdan iki saat ayırın.

Siyah merhem

Avustralya'da Adrian Jones tarafından satılan Kara Merhem, yukarıda bahsedilen Hint Bitkisine benzer - neredeyse aynı talimatlar geçerlidir. Bu merhemdeki ana bileşen Hint Bitkisindeki ile aynıdır ve bu çinko klorürdür. Diğer bileşenler çok güçlü bitkilerdir ve dört bitkiden sadece ikisi Hint Bitki formülünden farklıdır.

Adrian'dan Kara Merhem alırsanız, talimatlarını harfi harfine uyguladığınızdan emin olun. Herhangi bir nedenle Adrian'ın talimat sayfalarına sahip değilseniz, Hint Bitkisi talimatlarını takip etmeniz kabul edilebilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Bir şekilde benzer başka şifalı merhem formülleri de mevcuttur. “Kara Merhem” ve “Hint Bitkisi” terimleri genellikle genel olarak kanser merhemleri ile ilgilidir. Farklı amaçlar için birçok farklı tarif var. Hint Otu ve Kara Merhem dediğimde, Kathleen'den Hint Otu ve Adrian Jones'tan Kara Merhem'e atıfta bulunuyorum, çünkü bunlar aşina olduğum iki formül. Hint otunu kanserleri yenmek için yoğun bir şekilde kullandım. Indian Herb, 70 yılı aşkın bir süredir Teksas'ta Kathleen ve ondan önce babası tarafından satıldı. Kanserlere ve diğer tümörlere karşı başarıyı anlatan yüzlerce mektup aldı. Adrian Jones'un Kara Merhemi çok benzer bir başarı elde etti.

Machine Translated by Google

Kitaplar ve ürünler için şu adresten Adrian ile iletişime geçin:

http://www.adrianjonesnaturopath.com/products.htm

Safra Kesesi: Oğlum (24), tıkalı safra kanalı ve safra taşı ile hastaneye kaldırıldı. Çok acı çekiyordu ve hepsini geri getirdiği için yiyemiyordu. Doktorlar safra kesesini çıkarmak istediler ama o bir amaç için orada olduğu için reddetti. Doktorlar safra kesesi olmadan tıkanıklığı gidermek istemedikleri için 10 gün hastanede kaldı. Ayrıca çok sarılıydı. Her saat başı [dikkatle] MMS verdiğim için hep yanında kaldım... Her gün kan testi yaptılar ve dokuzuncu gün pankreatit (hayatı tehdit eden) olduğunu ve sabah ameliyat olacaklarını söylediler. O öğleden sonra tıkanıklığı aştı ve kendini çok daha iyi hissetmeye başladı. Sabah kan testi yaptıklarında her şey normale dönüyordu. Tıkanıklığı kaldırmak için hala içeri girdiler ama gitmişti. Bunun yerine geride kalan tüm çöpleri boşaltmak için bir stent yerleştirdiler. Üç ay sonra geri döndüğünde safra taşları da kaybolmuştu. Safra kesesi ile ilgili daha fazla problem yaşamadı. —Ruth B., Avustralya

eğer

Şeker Hastalığı: Teşekkür ederim, harika bir ürün, dede artık diyabet haplarını (birçoğu) bırakmış ve yeniden çok daha mutlu ve hayat dolu. Mucize bir üründür. —Nikki

Machine Translated by Google

Bölüm 11
Ek Protokoller

Protokol 6 ve 6

Protokol 6 ve 6, üzerinde kullanılabilecek bir şeydir.
kendi—diğer tüm protokollerden ayrı. Bu protokol
6 damlalık bir MMS1 dozu alıp bir tane beklemekten ibarettir.
saat ve ardından 6 damlalık bir MMS1 dozu daha alarak. bu
Bu protokolün amacı birçok akut şeyi ele almaktır.
soğuk algınlığı gibi zaman zaman ortaya çıkıyor gibi görünüyor
veya grip, baş ağrısı, ateş, bir miktar gıda zehirlenmesi veya yeni başlamış
gibi görünen herhangi bir hastalık veya kötü bir hastalığa maruz kaldıktan
hemen sonra, mikroplar. Aylarca veya yıllarca devam eden kronik
ağrılarda bile başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Her türlü kazadan hemen
sonra kullanılmalıdır, ne kadar erken olursa o kadar iyi, hatta

kaza mahallinde. Protokol 6 ve 6'nın çok çeşitli durumlarda başarılı
olduğu kanıtlanmıştır, bu nedenle ihtiyaç duyduğunuzda bir MMS1
dozunu karıştırabilmeniz için bazı MMS ve asit aktivatörlerini her zaman
elinizin altında bulundurmanızı öneririz.

Protokol 6 ve 6 için Talimatlar

Aşama 1

q içindeki talimatlara göre 6 damlalık bir doz hazırlayın.
MMS'in Etkinleştirilmesi ve Temel Bir MMS Dozunun Karıştırılması1
sayfa 32. (Damlaların kehribar rengine döndüğünden emin olun.)

Machine Translated by Google

q 41-45. sayfalardaki talimatlara göre 1/2 bardak (4 ons/120 ml) su veya MMS1 ile uyumlu başka bir onaylanmış sıvı ekleyin.

q 6 damlalık dozu azaltın.

Adım 2

q Bir saat içinde 6 damlalık bir doz daha hazırlayın ve için aşağı.

Aşama 3

q Sonraki bir saat, ikinci 6 damlalık dozunuzu aldıktan sonra, kendinizi iyi hissediyorsanız, o kadar.

4. Adım

q İkinci saatin sonunda kendinizi iyi hissetmiyorsanız, Sağlık İyileştirme planının Temel Protokollerine başlamanın zamanı gelmiştir—Başlatma Prosedürü ile başlayın (bkz. sayfa 79). Son 6 damla dozunuzu aldığınız andan itibaren (Protokol 6 ve 6'dan), günün geri kalanında her saat başı 1/4 damla dozla başlayın.

Adım 5

q Ertesi gün (ikinci gün), sekiz saat boyunca her saat başı 1/2-damla dozlar alan Başlangıç Prosedürünün ikinci gününe gidin.

q Başlatma Prosedürünün üçüncü ve dördüncü günlerini tamamlamak için devam edin.

Machine Translated by Google

6. Adım

q Başlatma Prosedürü bittiğinde, oradan Protokol 1000'e ilerleyin ve gerektiğinde HRP ile devam edin (bkz. Bölüm 5).

Not: Protokol 6 ve 6, patojenleri vücutta güçlü bir şekilde ele geçirmeden önce yok ederek çoğu zaman çeşitli yaklaşan hastalıkları hızlı bir şekilde ele alır. Bununla birlikte, bu ilk iki 6 damlalık dozun sorunu tomurcukta kesmediği zaman, HRP'ye göre saatlik dozlara geçmenin en iyisi olduğunu bulduk (bkz. Bölüm 5). Her saat başı 6 damla doz almaya devam etmek, muhtemelen bir Herxheimer reaksiyonuna neden olacaktır ve bu, uzun vadede iyileşmeyi yavaşlatacaktır. Bu nedenle, 6 damlalık iki dozdan sonra iyi değilseniz, Başlangıç Prosedürüne başlayın ve gerektiğinde HRP ile devam edin.

Protokol 4000

Bu protokol, MMS2'nin (kalsiyum hipoklorit) tek başına, yani aynı anda MMS1 kullanılmadan kullanılmasını gerektirir.
Protokol 4000, adından da anlaşılacağı gibi, Protokol 3000'den sonraki adım olarak HRP'nin (Sağlık İyileştirme Planı) sıralamasında kullanılmamaktadır. Başlangıçta, sodyum kloritin (MMS) bulunmadığı acil durumlarda kullanılması gerekiyordu.

Protokol 4000 temel olarak günde 5 kapsül MMS2 alıyor.

Protokol 4000 için Talimatlar

Aşama 1

q Bazı MMS2 kapsülleri hazırlayın ve Protokol 2000, Adım 3 ve 4'teki talimatlara göre dozlarınızı nasıl artıracağınıza ilişkin prosedürleri izleyin (bkz.

Machine Translated by Google

93). İlk gün toplam 5 kapsül MMS2 alın.
İlk 2 kapsülü Adım 3'te önerildiği gibi doldurun ve ardından Adım 4'teki talimatlara göre miktarı yavaşça artırmaya devam edin
(Ayrıca bkz. MMS2—Ayrıntılar, sayfa 274.)

Adım 2

q Maksimum boyut dozuna ulaştığınızda, günde 5 kapsül MMS2 almaya devam edin. Her dozu iki saat boşluk bırakın.

Aşama 3

q Bunu 21 gün boyunca veya iyileşene kadar yapın. mutlaka izleyin MMS'in Üç Altın Kuralı.

Notlar

Ü Unutmayın, mide bulantısı veya ishal durumunda her bir kapsüldeki kalsiyum hipoklorit miktarını %50 oranında azaltın.
Bu belirtiler azaldığında, miktarı yavaşça 94. sayfada verilen önerilen miktarlara yükseltin.

Ü Asla bir MMS2 kapsülü ile DMSO içeren bir dozu aynı anda almayınız! Tam açıklama için 23-24. sayfalara bakın.

Ü MMS2 kapsülleri için bakım: Bakım için her gün bir kez (sabah veya akşam) MMS2 için verilen maksimum dozdan bir kapsül (sayfa 94) alın. İdame dozuna başlamadan önce MMS2 almadıysanız, önerilen bu doza kadar kademeli olarak çalışın.

Machine Translated by Google

Aşı Prosedürü

20 yıllık tecrübeye dayanarak, bildiğim kadarıyla
MMS ile çalışırken, MMS'in kaçınmaya yardımcı olabileceğine inanıyorum.
aşağıda açıklanan süreç olduğunda aşı yaralanmaları
takip etti. Kullanmış binlerce kişiden
MMS, MMS'in zehirleri ortadan kaldırdığına dair yeterli kanıt vardır.
Toksinler ve hastalığa neden olan patojenleri öldürür. Binaen
aşılarla birlikte verilen bilgi sayfalarına göre, çoğu aşı bu
şeyleri içerir. Bu nedenle
MMS'in dakikalar içinde kullanılan aşıların olası olumsuz yan
etkilerini nötralize etmede etkili olmasının nedeni,
aşıdan saatler, hatta birkaç gün sonra. (Her ne olursa olsun,
aşı yapıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede yapılması
en iyi.)

Pek çok insan olası aşı yaralanmalarından endişe duyuyor
ve giderek artan sayıda ebeveyn aşılarını istemiyor.
çocuklar bunlara maruz kalır. bu yüzden istiyorum
aşağıdaki prosedürü sunun. Dahil
olduğunu tespit ettiğimiz MMS1/DMSO Yama Protokolü
cilt zehirlerini ve toksinlerini nötralize etmede çok etkilidir.

ABD'de ve mümkün olan diğer ülkelerde bulunanlarınız,
aşılardan dinsel muafiyetin nasıl talep edileceğini araştırmak
isteyebilir . Ancak, eğer bir pozisyondaysanız
aşı olmaktan başka çareniz yoksa
bu protokolü denemek isteyebilir.

Not: Bu prosedürün MMS1 kullanılarak izlenmesini öneriyorum.
diğer MMS biçimleri (CDS veya
CDH).

Machine Translated by Google

Aşı Prosedürü Talimatları—Dozaj
yetişkinler

Aşıdan İki Hafta Önce

q Başlatma Prosedürünü ve ardından Protokol 1000'i yapın
(bkz. sayfa 79-87).

Aşı Günü

q Sekiz saatlik bir süre boyunca her iki saatte bir (toplam 4 kez) 6 damla
MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) alın. Bu dozlamaya aşıyı almadan bir ila
iki saat önce başlayın.

q Aşı yapıldıktan hemen sonra (tercihen arabanıza döndüğünüzde veya
eve vardığınız an - ne kadar erken olursa o kadar iyi), MMS1/DMSO
Yama Protokolünü yapın (bkz. sayfa 135).

MMS1/DMSO Yaması, aşıdaki toksinleri nötralize etmeye
yardımcı olacaktır.

q Bu yamayı, ilk uygulamadan üç saat sonra, aşı gününde 1 kez daha
uygulayın. Üç saat içinde üçüncü bir yama uygulamanız
gerektiğini düşünüyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Ancak toplamda
üç yama yeterli olacaktır.

Not: Lütfen sayfa 135'deki MMS1/DMSO yaması yapma
talimatlarını yakından takip etmeye özen gösterin. Yamaya
daha fazla su ekleyin veya herhangi bir yanma veya tahriş
varsa kullanmayı bırakın. Yakından takip edin.

Aşıdan Sonraki Gün

q Bir hafta boyunca Protokol 1000'e devam edin ve tüm
toksinler vücuttan atılır.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Bu dozları alırken herhangi bir zamanda mide bulantısı veya ishal hissederseniz, MMS1 alımınızı azaltın. Aldığınız miktarı yarıya indirin, ardından kötü hisler geçtiğinde oradan tekrar çalışın.

Ü Aşı yaptırmadan önce uyarı almadığınız zamanlar olabilir. Bazen seyahat ederken çeşitli ülkelere girmek için aşılar gerekebilir. Eğer aşı yaptırmadan önce uyarınız yoksa yukarıda belirtilen "Aşı Günü" noktaları ile başlamanız yeterlidir. Bu durumda, vücudunuzun nasıl tepki verdiğine bağlı olarak, bir hafta yerine aşıdan sonra üç hafta boyunca Protokol 1000'e devam etmek isteyebilirsiniz.

Ü Aynı prosedür, MMS1/DMSO Yama Protokolüne gerek olmaması dışında, oral aşılar için de geçerlidir.

Aşı Prosedürü Talimatları—Dozaj
Çocuklar

Çocuklar için Aşı Prosedürü, yetişkinler için olduğu gibi benzer bir rutini takip eder. Yani, bir aşının protokole başlamasından iki hafta önce. Daha sonra aşı günü için özel doz önerileri ve aşıdan sonraki gün için ek talimatlar vs. vardır. Çocuklara verilen MMS1 damlalarının miktarı çocuğun kilosuna göre ayarlanmalıdır .

Yetişkinler, aşılar için bu prosedürün çoğu için standart Başlatma Prosedürünü ve Proto col 1000'i takip eder. Çocuklar söz konusu olduğunda, ayrıca, çocuklar için (çocuğun ağırlığına göre hesaplanan) 256-258. sayfalarda listelenen standart Başlangıç Prosedürü ve Protokol 1000'i yapmanızı öneririm. Bu, bir aşı almadan önce bir veya iki hafta önceden haber verildiği sürece geçerlidir. daha az varsa

Machine Translated by Google

bir haftadan fazla önceden uyarı, çocuğu aşıdan mümkün olduğunca çok gün önce Çocuklar için Aşı Dozaj Tablosuna göre (aşağıda) dozlayın. Veya herhangi bir uyarı yoksa aşının yapıldığı gün Aşı Günü Tablosu ile başlayabilirsiniz.

Aşıdan İki Hafta Önce

q Çocuklar için Protokol 1000'i takip eden Başlatma Prosedürü ile başlayın (sayfa 256-258) ve aşı gününe kadar buna sadık kalın.

q Bir veya iki hafta önceden başlayamıyorsanız, yine de, bir hafta önceden, üç gün önceden veya durum ne olursa olsun, mümkün olan her zaman Çocuklar için Aşı Dozaj Tablosuna göre dozlamaya başlayın.

Çocuklar İçin Aşı Dozaj Tablosu	
Ağırlık	MMS1 Dozajı
7 libreden (3,2 kg) daha hafif bebekler	İlk gün saatte 1/4 damla ile başlayın ve ardından bir saat sonra 1/2 damla ile başlayın.
7-24 libre (3,2-10 kg)	İlk gün saatte 1/2 damla ve daha sonra saatte 3/4 damla ile başlayın.
25 librenin (11 kg) üzerinde, temel kural, bir çocuk için her ek 25 libre için 1 damla MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) vermektir.	
25-49 libre (11-22 kg)	saatte 1 damla
50-74 libre (22-33 kg)	saatte 2 damla
75 lbs (34 kg) ve saatte 3 damladan fazla	

Machine Translated by Google

Aşı Günü

q Çocuğa, Çocuklar için Aşı Tablosunun Gününe göre uygun miktarda MMS1 damlası (aktif MMS) verin (aşağıya bakın). Bunu sekiz saatlik bir süre boyunca her iki saatte bir (toplam 4 kez) yapın. Bu dozlamaya aşı uygulanmadan bir ila iki saat önce başlayın.

q Aşı yapıldıktan hemen sonra (tercihen arabanıza döndüğünüzde veya eve vardığınız an - ne kadar erken olursa o kadar iyi), MMS1/DMSO Yama Protokolünü yapın (bir sonraki sayfaya bakın). Veya, çok hassas cilde sahip bir bebek veya çocuklar söz konusu olduğunda, bebekler ve hassas cilde sahip kişiler için yama protokolünü ayarlama talimatlarını izleyin (sonraki sayfaya bakın). MMS1/DMSO Yaması, aşıdaki toksinleri nötralize etmeye yardımcı olacaktır.

q Bu yamayı, ilk uygulamadan üç saat sonra, aşı gününde 1 kez daha uygulayın. Üç saat içinde üçüncü bir yama uygulamanız gerektiğini düşünüyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Ancak toplamda üç yama yeterli olacaktır.

Not: Lütfen sayfa 135'deki MMS1/DMSO yaması yapma talimatlarını yakından takip etmeye özen gösterin. Yamaya daha fazla su ekleyin veya herhangi bir yanma veya tahriş varsa kullanmayı bırakın. Yakından takip edin.

Çocuklar İçin Aşı Günü MMS1 Dozajları	
Ağırlık MMS1 Dozaj	7 librenin (3,2 kg) altındaki bebekler 2 saatte bir 3/4 düşüş 7-24 libre (3,2-10 kg) 2 saatte bir 1 damla 25-49 libre (11-22 kg) 50-74 libre (22-33 kg) 2 saatte bir 4 damla. 75 lbs (34 kg) ve üzeri 2 saatte bir

Machine Translated by Google

Bebekler ve Hassas Ciltli Kişiler için MMS1/DMSO Yama Protokolünü Ayarlama

Lütfen standart MMS1/DMSO Yama Protokolü (sayfa 135) talimatlarını okuyun ve iyice anlayın. Bu protokol temelde aynı prosedürdür, ancak MMS1 damla/su miktarları ve yamanın uygulanma zamanlaması hassas cilde uyum sağlayacak şekilde ayarlanır.

q 5 damla MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) ile başlayın. Çözeltiyi seyreltmek için 5 damla DMSO ve 10 ilave su damlası ekleyin.

q İlk uygulama için yamayı beş dakikadan fazla uygulamayın.

q Yama çıkarıldığında tahriş olup olmadığına dikkat edin. İlk yama ile beş dakika sonra tahriş olmazsa, iki saat içinde başka bir yama uygulayın, bu sefer 15 dakika bekletin. Sonraki 15 dakikalık uygulamada ciltte tahriş veya yanma yoksa, ihtiyaç hissediyorsanız bir uygulama daha (aşı olması durumunda) ile devam etmenizde bir sakınca yoktur.

q Herhangi bir zamanda ciltte tahriş veya yanma olursa, son uygulamada kullanılanın üzerine ilave su miktarını iki katına çıkarın.

Aşıdan Sonraki Gün

q Tüm toksinlerin vücuttan atıldığından emin olmak için 1 hafta boyunca Çocuklara Yönelik Aşı Dozaj Tablosuna (sayfa 176) göre çocuğu dozlamaya devam edin.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Bir damlanın bir kısmının nasıl ölçüleceğine ilişkin talimatlar için, bkz. Başlatma Prosedürü, sayfa 79.

Ü Her ağırlık kategorisi için saat başına maksimum MMS1 miktarını asla aşmayın.

Ü Unutmayın, bu dozları alırken herhangi bir zamanda çocuğunuz mide bulantısı veya ishal yaşamaya başlarsa, MMS1 alımını azaltın. Miktarı yarıya indirin, ardından kötü hisler geçtiğinde oradan tekrar çalışın.

Sinüs Enfeksiyonu: Yıllardır sinüs rahatsızlığım var. Sinüslerim özellikle sabahları hep tıkalıydı. Ayrıca tıkanıklıkları gidermek için burnumu sümkürdüğümde dokulara oldukça sık kan geliyordu. Başlangıçta her zaman aç olduğum ve aşırı kilolu olduğum için MMS alıyordum. Bu, diğer insanların başarı hikayelerini okuduktan sonra karanlıkta çekilmiş bir fotoğraftı. MMS almamın sonuçları, sürekli açlığımın ortadan kalkması ve şaşırtıcı bir şekilde sinüs durumunun da ortadan kalkmasıydı. O kadar uzun süredir sinüs rahatsızlığım var ki normal görünüyordu. Geriye dönüp baktığımda, her ikisinin de candidadan kaynaklandığına inanıyorum. —Chris, Birleşik Devletler

eğer

Nefrit İyileşmesi: Nefrit vardı ve iki ayağım iki yıldan fazla şişti. Protokol 1000 yaptım ve 10 gün içinde şişlik azaldı ve şimdi iki ayağım da normale döndü. Jim'e teşekkür ederim. —Andy Z., Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

Sıtma Protokolü

Sıtma, yalnızca 1 veya 2 doz MMS1 damlası gerektirdiğinden, MMS ile baş edilmesi en basit hastalıklardan biridir. Bununla birlikte, MMS1'i diğer rahatsızlıklar için kullanmanın aksine, sıtma için 1 başlangıç çok güçlü dozda aktive edilmiş damla (MMS1) ve ardından bir veya iki saat sonra 1 güçlü doz daha verirsiniz. Diğer koşullar altında, normalde bu kadar güçlü bir doz vermezsiniz ve eğer verdiyseniz, bu miktara yavaş yavaş çalışmadıkça kişi muhtemelen midesi bulanacak veya muhtemelen kusacaktır. Ancak, sıtmada bu çok nadiren olur ve büyük doz, normalde mide bulantısı veya ek hastalıklar olmaksızın yaklaşık dört saat içinde sıtma parazitini öldürür gibi görünmektedir.

Geçmiş kitaplarımda, sıtmayı tedavi etmek için 15 damla MMS1 dozu kullanmayı önermiştim. Ancak sıtma paraziti, vücuttayken MMS1'in (klor dioksit) neden olduğu oksidasyona dayanma kabiliyeti açısından büyük ölçüde farklılık gösterdiğinden, bu dozu ayarlama ihtiyacı buldum. Hala insanları etkileyen sadece dört sıtma türü var. Bununla birlikte, bu dört suş, güç veya zayıflıkları açısından bölgeden bölgeye ve dolayısıyla MMS1 oksidasyon gücüne karşı dirençlerinde büyük farklılıklar gösterir.

Normalde aktifleştirilmiş 18 damla MMS'nin tek bir dozu bir yetişkinde çoğu sıtma suşunu öldürür, ancak ne yazık ki her zaman değil. Dünyadaki bazı sıtma bölgelerinde sıtmayı ortadan kaldırmak için tek bir dozda 30 damlaya kadar, diğer bölgelerde ise bir yetişkinde sıtmayı tamamen öldürmek için 6 damlaya kadar ihtiyaç vardır. Yukarıda söylediğim gibi, normalde 18 damlalık bir doz çoğu sıtmayı halledecektir ve benim temel sıtma dozu için önerdiğim şey bu. Gerekmiyorsa, 30 damlalık MMS1 dozuyla birini başlatmak istemezsiniz, çünkü bu, insanları aşırı derecede mide bulan

Machine Translated by Google

Bu nedenle, özellikle birisi sıtma bölgesindeyken ve birçok sıtma vakasına yardım etmeye çalışırken, sıtmayı öldürmek için gereken minimum dozu kendi bölgesinde belirlemelidir. Bu bölümde bunun nasıl devam edeceğini ana hatlarıyla anlatacağım.

Dişi Anopheles sivrisinek, sıtma parazitinin taşıyıcısıdır. Birisi sıtma taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldığında, sıtma parazitleri çoğaldıkları karaciğere gider ve yedi gün veya daha uzun bir süre sonra nihayet kana geçerler. Kandayken, kırmızı kan hücrelerini ele geçirmeye ve yok etmeye başlarlar. Bu, kurbanın hastalandığı ve sıtmanın tüm semptomlarını hissettiği noktadır. Sıtma karaciğerden kana geçene kadar kişi herhangi bir semptom hissetmeyecektir.

MMS1, sıtma parazitlerini karaciğerden çıkmadan öldürebilir veya kandaki parazitleri öldürebilir.

MMS1 ağızdan alındığında sıtmaya karşı en iyi etkiye sahip görünüyor. Normalde, tüm sıtmanın %98'i 2 oral doz MMS1 ile tedavi edilir ve sıtma kurbanına yardım etmek için daha fazla ileri gitmenize gerek yoktur. Ancak, daha büyük dozların gerekli olduğu durumlar ve ayrıca 18 damla gibi büyük dozlar gerektirmeyen alanlar için aşağıya ekstra talimatlar ekledim.

Bir kişinin sıtması olup olmadığını belirlemek için kullanılan hızlı test şeritleri (sıtma RDT'leri için hızlı tanı testleri) etkili kabul edilir. Bununla birlikte, hızlı test şeritleri, bir kişinin MMS1 veya sıtma için diğer çeşitli tedavilerden herhangi birini aldıktan sonra sıtmanın olup olmadığını söylemek için kullanılamaz. Bunun nedeni, sıtma antijenlerinin haftalarca kanda bulunmasıdır. Antijenler, yanlış olabilecek pozitif bir okuma veren şeydir. Bir kişinin sıtma olup olmadığını belirlemek için doğru testler, mikroskop altında kana bakmayı içerir. (bkz. sayfa 185.)

Machine Translated by Google

Bir Ons Önleme...

Bilinen bir sıtma bölgesinde yaşayan veya bu bölgeye seyahat eden herkes için, düzenli olarak günlük bir MMS1 idame dozunu öneriyorum. Önleme hastalıktan daha iyidir.

(Hem yetişkinler hem de çocuklar için idame dozuyla ilgili ayrıntılar için sayfa 200'e bakın.)

Sıtma Protokolü Talimatları

yetişkinler

Aşama 1

q Bir kişi, mümkünse 3/4 fincan (6 oz veya 180 ml) saf su içinde 18 damlalık bir MMS1 dozu (aktif MMS) almalıdır.

Adım 2

q İlk dozdan bir ila iki saat sonra, yukarıdaki 1. Adımı tekrarlayın— yani, 18 damlalık bir MMS1 dozu daha alın.

Not: İki adet 18 damlalık doz, tüm sıtma vakalarının %90'ının üstesinden gelecektir. Aslında, genellikle ilk 18 damlalık doz sıtmayı öldürür, ancak sıtmanın tamamen geçtiğinden emin olmak için ikinci bir 18 damlalık doz vermenizi öneririm. Bu, sıtma için temel dozlama prosedürüdür.

için Gerekebilecek Ek Eylemler
Temel Sıtma Dozu

Ü Sıtma için temel dozajı takip ederken (yukarıda verilmiştir), ilk 18 damlalık doz sıtmayı yapıyor gibi görünüyorsa

Machine Translated by Google

kurban daha hasta, bu daha az MMS1'in gerekli olduğunu gösterir. Kişi MMS1 dozunun getirdiği hastalık geçene kadar su içmeli ve durumu iyi olmalıdır. Sıtma semptomları azalmadıysa ve kendini daha iyi hissetmiyorsa, ikinci bir MMS1 dozu almasını öneririm, ancak %25 daha az damla ile bu 13 damlalık bir doz olacaktır. İlk 18 damlalık dozdan sonra sıtma semptomları gitmiş olsa bile ve bu doz başlangıçta onu biraz daha hasta etmiş olsa bile, tüm sıtmayı kesin olarak kontrol etmek için ona bir 13 damla doz daha vermek akıllıca olacaktır. eradike edilir.

Ü İlk 2 doz (iki adet 18'lik doz veya bir adet 18'lik ve bir adet 13'lük doz) toplam dört saat içinde, yani kişi kendinizi çok daha iyi hissedin, ardından dört saatin sonunda üçüncü bir doz verin. Sıtma kurbanı ilk iki 18 damlalık dozda ek bir hastalık yaşamadıysa, bu üçüncü doz 18 damla MMS1 olmalıdır. Veya kişi yukarıdaki paragrafta açıklandığı gibi zaten 13 damla doza inmek zorunda kaldıysa 3. doz için 13 damla daha verin. Bu 3. dozdan sonra iki saat bekleyin. Sıtma semptomları kaybolursa, her şeyin yolunda olduğunu ve kişinin eve gidebileceğini varsayabilirsiniz. (Ertesi gün tekrar kötü hissetmeye başlarlarsa, geri dönmeleri ve daha fazla MMS1 almaları gerekir. Kişinin tekrar kendini kötü hissetmeye başlamasının çeşitli nedenleri olabilir. Aşağıda daha fazla açıklamaya bakın.)

Ü 3 doz MMS1 aldıktan sonra sıtma semptomları devam ederse, mağdur her saat başı MMS1 almaya devam etmeli, ancak dozu saatte 6 damla MMS1'e indirmelidir.
Kurban saatte 6 damla alırken hastalanırsa, MMS1'i hemen durdurun; MMS1'in neden olduğu ek hastalığı geçene kadar kişiye daha fazla MMS1 vermemelisiniz.

Ü Bir kişinin 6 damlalık dozdan vazgeçmek zorunda kaldığı bir durumda, eklenen hastalık geçene kadar bekleyin ve ardından

Machine Translated by Google

Bu kitaptaki talimatları izleyerek, Sağlık İyileştirme Planında (HRP) önerildiği gibi artırarak veya bir sonraki protokole giderek devam etmesi gereken Protokol 1000'de başlamalıdır. Protokol 1000'i uygulamaya devam etmeyi ve MMS'nin Üç Altın Kuralını takip etmeyi de gösteren ek bir hastalık veya hastalık mevcut değilse, sıtma ortadan kalktığında MMS1 almayı bırakabilir.

Notlar

Ü Yukarıda bahsettiğim gibi, iki adet 18 damlalık standart MMS1 dozu çoğunlukla sıtmayı yok edecektir. Yukarıda açıkladığım gibi MMS1 dozlarını vermeye devam etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, bu çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Denklemde, MMS1 ile devam etmeyi gerektirecek birçok faktör olabilir. Örneğin, başlıca sebeplerden biri, sıtma kurbanının sıtmaya ek olarak başka bir hastalığı veya hatta birden fazla hastalığı olması olabilir ve bu, daha fazla MMS1 ve muhtemelen MMS2 gerektirecektir.

Ü Ayrıca, MMS'in bu kitabın 8. Bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği gibi bir etkisi olmayabileceğinin tüm nedenlerini de aklınızda bulundurun. Neyse ki MMS1 ile sıtma çok hızlı bir şekilde yok ediliyor, ancak kişinin dozlarını alırken MMS1'e uygun olmayan şeyleri yememesi, içmemesi vb. Unutmayın, MMS1 çalışmıyor gibi görünüyorsa bunun birçok nedeni olabilir. Bu nedenle, MMS1'in çalışmıyor gibi göründüğü bir durumda, kişinin Protokol 1000'e saatte 1 aktif düşüşle başlaması ve Sağlık İyileştirme Planına göre protokol talimatlarında verilen şekilde takip etmesi en iyi eylem planı olacaktır.

Ü Birinin ertesi gün hala sıtması olduğu ve tadı beğenmediği ve kimsenin haberi olmadan dozu tükürdüğü ortaya çıkan durumlar oldu. Eğer

Machine Translated by Google

kişi dozun tamamını almaz, pekala işe yaramayabilir. Bu, tat ile ilgili sorunları olan küçük çocuklar için bir sorun olabilir.

Kitlelerin Sıtmadan Kurtulmasına Yardımcı Olmak

Aşağıdaki talimatlar, birçok insanın sıtmadan kurtulmasına yardımcı olma niyetiyle dünyanın bir sıtma bölgesinde olduğunu dikkate almaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi, insanların sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için standart sıtma dozunun biraz daha fazlasını veya daha azını vermeniz gereken zamanlar olduğunu buldum. Yine bunun nedeni, farklı sıtma türlerinin, burada girmeyeceğim bir dizi nedenden dolayı farklı alanlarda daha güçlü veya daha zayıf görünmesidir. Ancak sonuç olarak, bulunduğunuz bölgede yaygın olan belirli sıtma türü için standart MMS1 dozunun ne olması gerektiğini belirlemek isteyeceksiniz.

Sadece bir veya iki sıtma vakasının ele alındığı bir durumda, sıtma kurbanlarına birkaç doz vermek için zaman ayırmanız gerekip gerekmediğinin önemi olmayabilir - biraz daha uzun sürse de iyileşeceklerdir. Ancak yardım edecek yüzlerce, hatta binlerce insanın olduğu bir durumda, sıtmayı ilk dozla, ardından ikinci dozla iki saat içinde öldürmek isteyeceksiniz, çünkü birçoğu daha fazla doz için geri dönemeyecektir. çeşitli sebepler. Bu nedenle, mümkün olduğunca çabuk halletmek en iyisidir. Bu, herhangi bir bölgede sıtmayı hızlı bir şekilde yok etmek için hangi dozla başlayacağınızı belirlemenizi önermemin ana ve çok önemli nedenidir.

Mikroskop

Sıtmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yola çıkan birçok kişi, sıtmanın var olup olmadığını ve ne zaman ortadan kaldırıldığını belirlemek için bir mikroskoba sahip olmaları gerektiğini düşünür. biri olsa güzel olurdu

Machine Translated by Google

sıtmanın tamamen geçip geçmediğini belirlemek için bir mikroskop ve bir teknisyene sahip olacaktı, ancak ne yazık ki Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde bu, mali ve diğer nedenlerle her zaman mümkün olmuyor. Bir mikroskobunuz varsa ve kanda sıtmanın varlığını veya yokluğunu belirleyebilirseniz, bu yararlıdır, ancak bu mutlak bir zorunluluk olmaktan çok uzaktır.

İnanın bana, dünyanın sıtma bölgelerinde insanlar sıtma olup olmadığını biliyorlar. Her yıl onunla yaşıyorlar; maalesef hayatlarının bir parçası. Ne zaman hasta olduklarını ve ne zaman iyi hissettiklerini biliyorlar.
Bu nedenle, kişinin nasıl hissettiğini belirleyin, çünkü MMS kullanırken kişi çok daha iyi hissediyorsa, bu normalde sıtmayı yendiğinin açık bir göstergesidir. Bu, diğer sıtma ilaçları için doğru olmayabilir, ancak MMS1 aldıktan ve sıtma kurbanı iyi hissettiğini söyledikten sonra, sıtma olmadığından oldukça emin olabilirsiniz. Mikroskobu kullanırken tüm sıtmanın geçtiğini kanıtlamak için 24 saat beklemeniz gerekecek, ancak kişiye sadece nasıl hissettiğini sorarak sadece dört saat yeterli olacaktır.

Binlerce sıtma kurbanına yardım ettikten sonra edindiğim deneyime göre, kişi ikinci doz MMS aldıktan sonra kendini iyi hissettiğinde, sıtma olmadığından oldukça emin olabilirsiniz.

Kendini iyi hisseden birçok insan dört saat sonra eve gider ve bir daha geri gelmez. Bununla birlikte, MMS1'i aldıktan sonra, yalnızca dört saat sonra bir mikroskop testinin doğru olması muhtemel değildir . Bunun nedeni, MMS'in zehirleri öldürmesine rağmen, ölü parazitlerin ve diğer maddelerin kanda bir süre daha kalmasıdır. Birinin sıtma olup olmadığını görmek için mikroskopla test etmeden önce standart zaman çerçevesi, sıtmanın gittiğinden emin olmak için kişinin son dozundan sonra tam 24 saat beklemek olacaktır.

Machine Translated by Google

Normal Sıtma Suşlarından Daha Zayıf - Ne Zaman Yapılmalı?

Standart 18 Damla Dozdan Damlaları Azaltın

Ü Birkaç sıtma kurbanı 18 damlalık doz aldıktan sonra ve ilk başta daha hasta görünüyorlarsa, bu, bölgedeki sıtma türünün daha zayıf olduğunu ve başlangıçta daha az damla verebileceğinizi gösterir. Bu durumda, sıradaki bir sonraki sıtma kurbanı daha az damla alabilir. Standart 18 damlalık dozdan damlaları %25 oranında azaltın. Bu, 13 damla MMS1 dozu vermeye başlayacağınız anlamına gelir. Bu, insanların iyileşmesine yardımcı olmaya başlarsa veya ilk dozu aldıktan iki saat sonra kendilerini daha hasta hissetmiyorlarsa, sıtmanın tamamen geçtiğinden emin olmak için her zaman ikinci bir 13 damlalık doz (iki saat sonra) verin.

Ü Daha önce dünyanın 6 damlalık MMS1 dozuyla sıtmanın tedavi edildiği bölgelerde bulunduğumdan bahsetmiştim. MMS'in genel kuralı ve temel ilkesi, eğer kurban, hastalığının MMS1 dozları ile onu zaten yaptığından daha fazla hastalanıyorsa, o zaman dozu düşürmeniz gerekir, ancak MMS1 vermeyi kesmemelisiniz. Bu nedenle, 13 damlalık doz hala hasta ediyorsa, dozu tekrar azaltın. Bir dahaki sefere veya bir sonraki kişi için 8 damlalık bir doz deneyin, o bölgedeki insanların iyileşmesine yardımcı olan ve onları daha da hasta etmeyen rahat dozu bulana kadar işleme devam edin. Bu durumda, genel olarak, sıradaki kişiye daha küçük bir doz vermekten bahsediyoruz.

Not: Unutmayın, ilk doz çok fazlaysa veya ilk 2 doz çok fazlaysa ve sıtma hastasını herhangi bir şekilde daha da hasta ettiyse, o zaman geri çekilin ve birkaç saat boyunca hiçbir şey yapmayın, çünkü kişi muhtemelen en kısa sürede iyileşecektir. Vücut zehirlerin çoğunu ortadan kaldırır. Kendini iyi hissedene kadar içmesi için su verin ama asla zorla su vermeyin.

Machine Translated by Google

Normal Sıtma Suşlarından Daha Güçlü - Ne Zaman Yapılmalı?
Standart 18-drop'tan Dropları Arttırın
MMS1 Dozu

Ü Bir kişinin sıtmadan kurtulmak için üç adet 18 damlalık doza ihtiyaç duyması durumunda, aynı bölgedeki insanların sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmaya devam ediyorsanız, o bölgeden size gelecek bir sonraki kişilerin size yardımcı olacağından oldukça emin olabilirsiniz. 18 damladan daha güçlü bir ilk doza ihtiyaç duyar. Üç adet 18 damla doza ihtiyaç duyan birkaç kişiniz varsa, bu, sıtmayı tek bir dozda ele almak ve ardından emin olmak için önerilen ikinci dozu takip etmek istiyorsanız, dozlamadaki damla miktarını artırma zamanının geldiğinin bir göstergesidir. (Birçok sıtma bölgesinde, insanlar dozlarını almak için birkaç saat oyalanamazlar. Çoğu zaman onlara yardım etmek için küçük bir zaman aralığı vardır. Sıtma daha az dozla ve daha hızlı ortadan kaldırılabiliyorsa, o zaman daha iyi olur). Bu durumda, MMS1'i ilk doz için 25 damlaya yükseltirdim (daha güçlü bir sıtma türü olduğu için %25'ten biraz fazla), ardından iki saat içinde 25 damlalık ikinci bir doz alırdım.

Ü 18 damlalık bir dozun yeterli etki göstermediği ve 3 dozdan sonra (birkaç sıtma hastası için) kişinin iyileşmediği durumda, neyin işe yaradığını bulana kadar artırmaya başlayın. Önce 25 damla doz deneyin ve sonra gerekirse 30'a çıkın. Bazı bölgelerde sıtmayı öldürmek 30 damla kadar sürebilir.

Not: Dozlarınızı karıştırmak için su kullanarak bulunduğunuz bölge için uygun bir dozaj belirledikten sonra, dozlar için soda veya MMS1 ile uyumlu bir meyve suyu (daha fazla bilgi için sayfa 42-45'e bakınız) kullanılması kabul edilebilir çünkü birçok insanların tadıyla ilgili sorunları var. O zaman herhangi bir nedenle soda veya meyve suyunun işe yaramadığı ortaya çıkarsa, başka bir deyişle, insanlar artık iyileşmiyorsa, her zaman suya geri dönebilirsiniz. Herhangi bir alandaki soda veya meyve suyunun MMS1'i yok etmeyeceğinden asla emin olamazsınız (bkz. sayfa 42-45).

Machine Translated by Google

Çocuklar

Çocukların sıtmadan kurtulmasına yardımcı olmak için standart dozaj, çocuğun ağırlığına göre belirlenmelidir.
Bunun dışında yukarıda belirtilen tüm aynı ilkeler geçerlidir. Başka bir deyişle, bir çocuğa sıtma için MMS1'in "normal" dozunu veriyorsanız ve çocuk 3 dozdan sonra hastalanıyor veya iyileşmiyorsa, yukarıda belirtilen prosedürü azaltmak veya artırmak için aynı prosedürü izlersiniz. damla. 190. sayfadaki çizelge, çocuklar için kiloya göre dozajın belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Ek MMS Dozları: Her durumda, yukarıda verilen sıtma dozları işe yaramazsa ve çocuk hala hastaysa, kurbanda ikinci bir hastalık olma olasılığı yüksektir. Bu durumda, halen hastalığı olanlar, 256-258. sayfalardaki çocuklar için talimatlara göre Protokol 1000'i takip eden Başlangıç Prosedürüne başlamalıdır.

Alzheimer: Anneme Al zheimer teşhisi konduktan sonra hapın etkilerinden o kadar nefret etti ki MMS'i denemek istedi. Belirtileri neredeyse bir gecede kayboldu. Ertesi sabah 3 kez 6 damla içtikten sonra bana 60 yıl kadar önce babamla nasıl tanıştığını anlattı, bir gün önce imkansızdı. Bir hafta boyunca almaya devam etti ve sonra kendini o kadar iyi hissetti ki, almayı bıraktı. Bir ay içinde semptomlar geri döndü. Tekrar MMS aldıktan sonra semptomlar tekrar kayboldu. Onu uzak tutmak için günlük bir bakım dozu alması gerekiyordu. Teşekkürler Jim Humble, sen benim kahramanımsın. —Keith P., Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

Not: Aşağıdaki çizelgedeki tüm düşüşler, etkinleştirilmiş MMS (MMS1) düşüşlerine atıfta bulunmaktadır.

Çocuklar için Sıtma Protokolü					
MMS1 Drop Gerekli					
Ağırlık	Asgari Kuvvet Sıtma	Düşük Kuvvet Sıtma	Normal Kuvvet Sıtma	Daha güçlü Kuvvet Sıtma	Maksimum Kuvvet Sıtma
12 librenin (5,5 kg) altındaki bebekler	1 damla doz	2 damla doz	2 damla doz	3 damla doz	3 damla doz
12-24 libre (5,5 -11 kg)	3 damla doz	3 damla doz	4 damla doz	5 damla doz	7 damla doz
25-49 libre (11-23 kg)	4 damla doz	5 damla doz	6 damla doz	8 damla doz	9 damla doz
50-74 kilo (23-34 kg)	6 damla doz	8 damla doz	10 damla doz	13 damla doz	15 damla doz
75-100 lbs (34-45 kg)	8 damla doz	11 damla doz	14 damla doz	18 damla doz	22 damla doz
100 lbs (45 kg) ve Üzeri	10 damla doz	13 damla doz	18 damla doz	23 damla doz	29 damla doz

Chikungunya ve Dang Ateşi Protokolü

Hem chikungunya hem de dang humması sivrisineklerin neden olduğu viral hastalıklardır. Dünyada giderek daha fazla ortaya çıkıyorlar. Her iki hastalığın da spesifik bir tıbbi tedavisi olmadığı iddia ediliyor. Bununla birlikte, bazen uzun süreli ıstıraplardan sonra ve/veya zor komplikasyonlarla vücut bu hastalıkların üstesinden gelebilir.

Her iki hastalık da ölüme neden olabilir. MMS, kişilerin hem chikungunya hem de dang humması hastalığından kısa sürede sağlığına kavuşmasına yardımcı olmada etkilidir.

Machine Translated by Google

Chikungunya: Genellikle bu hastalık, genellikle eklem ağrısının eşlik ettiği ani bir ateş başlangıcı ile başlar. Diğer yaygın semptomlar arasında kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve döküntü bulunur. Ayrıca gözleri, kulakları ve sindirimi de etkileyebilir. Dang hummasına bazı yönlerden benzer ve dang hummasının yaygın olduğu bölgelerde yanlış teşhis edilebilir. Vücut genellikle birkaç hafta içinde hastalıktan kendini iyileştirir, ancak bu hastalığın kronikleşmesi ve böylece aylar veya yıllar sürmesi mümkündür. Normalde chikungunya, virüsü taşıyan bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan dört ila on iki gün sonra ortaya çıkar.

Dang humması: Bu hastalık genellikle ateşle ortaya çıkar. Chikungunya'ya benzer, ancak bazı önemli farklılıklar vardır. Aşırı kas ve eklem ağrıları vardır ve genellikle kızarıklık ve sıklıkla göz arkasında ağrı vardır. Dört, beş gün veya daha fazla bir süre sonra kayboluyor gibi görünebilir, ancak iki ila dört gün sonra yüz hariç tüm vücudu kaplayan bir kızarıklıkla geri gelir. Döküntü genellikle ellerin avuçlarında ve ayak altlarında da olacaktır. Birkaç gün içinde geçebilir veya çok daha uzun sürebilir. Bu hastalık sırasında titreme de olabilir. Bazen çok şiddetli hale gelir ve özellikle küçük çocuklarda kanamaya ve ölüme neden olabilir.

Dang humması, dang virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra üç ila on beş gün içinde ortaya çıkar.

Hem dang humması hem de chikungunya, virüsü öldüren MMS1 veya MMS2 ile üstesinden gelinebilir ve ardından vücut hızla sağlığı yeniden inşa edebilir. Bu hastalıkların üstesinden gelmek sıtma ile aynı şey değildir. Sıtma, çok daha büyük bir mikroorganizma olan ve yok edilmesi için başlangıçta büyük bir MMS1 şoku (doz) gerektiren bir parazittir. Virüsler, onları yok etmek için belirli bir süre boyunca MMS 1 veya 2'nin varlığını gerektirir. Bu iki hastalıkta en iyi başarıyı, onları iki hastalıktan daha güçlü olanlarla baş

Machine Translated by Google

normal MMS1 dozları, ardından MMS1'i vücutta sekiz saat veya her gün biraz daha uzun süre tutan Protokol 1000'e geçer. MMS2, aşağıdaki talimatlara göre bu protokolde MMS1 (mevcut olmadığında) ile ikame edilebilir.

Talimatlar—Dang ve Chikun gunya için MMS1'i Kullanma

Aşama 1

6 damlalık MMS1 dozu alan Protokol 6 ve 6'yı yapın, ardından bir saat bekleyin ve ikinci bir 6 damla MMS1 dozu alın. (Protokol 6 ve 6 ile ilgili tüm talimatlar için sayfa 169'a bakın.)

Not: İlk 6 damlalık doz mide bulantısına neden oluyorsa, ikinci doz için bunun 1/2'sine (3 damlalık bir doz) düşürün.

Adım 2

q İki 6 damlalık dozdan sonra (veya azaltmanız gerekiyorsa 6 damla/3 damla dozdan sonra), 84. sayfadaki talimatlara göre Protokol 1000'e devam edin. En az üç hafta (21 gün) boyunca Protokol 1000'e devam edin.

Çocuklar

Ü Bir çocuğa yardım ediyorsanız, lütfen Protokol 6 ve 6 ve Protokol 1000 için çocuklar için uygun dozajları takip edin. Unutmayın, çocuklar için dozaj çocuğun kilosuna göre belirlenir. Çocuklar için protokol dozajlarının nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için Bölüm 13'e bakın.

Tüm kurallara uyun; örneğin, mide bulantısı veya artan hastalık ortaya çıktığında dozu azaltın.

Machine Translated by Google

Talimatlar—Dang ve Suçiçeği için MMS2 Kullanımı

MMS1 mevcut değilse, ancak MMS2 (kalsiyum hipoklorit) mevcutsa, dang ve chikungunya için MMS1 yerine MMS2'yi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları dikkatlice izleyin:

Aşama 1

q İlk olarak, MMS2 ile ilgili MMS2 Ayrıntıları, sayfa 274 bölümündeki talimatları baştan sona okuyun. Nasıl çalıştığını tam olarak anlamadan MMS2'yi kullanmayın.

Adım 2

q MMS2'yi anladığınızda ve onu kullanmak için gerekli önlemlerin tamamen farkında olduğunuzda, jel veya sebze kapsüllerinizi hazırlayın. 275-278. sayfalardaki talimatlara göre 0 veya 1 numaralı kapsülleri kullanın.

q Kapsülleri önce az miktarda MMS2 ile doldurmanız ve önerilen miktara kadar çalışmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bu protokol günde 5 doz (toplam 5 kapsül, doz başına 1 kapsül) MMS2 almayı gerektirir. İlk gün, ilk 2 doz için kapsülleri doldurmak için en düşük miktarla başlayın, ardından sayfa 276, Adım 3)'teki talimatlara göre artışlarla kapsülleri daha fazla MMS2 ile doldurmaya başlayın. Halihazırda hastalık nedeniyle yaşadıklarınızdan daha fazla bir hastalık yaşarsanız, MMS2 miktarını azaltın ve her kapsülde önerilen MMS2 miktarını oluşturmak için daha yavaş bir hızda gidin. MMS'in Üç Altın Kuralını izleyin.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q Günde 5 kapsül alana kadar her iki saatte bir 1 MMS2 kapsül alın.

q Hastalık geçene kadar günde 5 kapsül almaya devam edin. Genellikle dang humması ve chikungunya üç veya dört gün içinde geçer, ancak yine de bu protokole devam edilir. Tam üç hafta boyunca durmayın. Bu, hastalığın tamamen üstesinden gelmenizi sağlamak ve nüksetmeyi önlemek içindir.

Çocuklar

MMS2'yi küçük çocuklar için ya da yaşları veya kiloları ne olursa olsun tüm çocuklar için önermiyorum.
Bunun istisnaları vardır, ancak MMS2 ve çocuklarla ilgili 259-260. sayfalardaki yönergeleri ve talimatları okumadan çocuklara MMS2 vermeye devam etmeyin.
Okuduktan sonra çocuğun MMS2 kapsülleri alabileceğini belirlerseniz, aşağıdaki talimatlara göre hareket edin.

q Çocuklar için 3 boyutlu sebze veya jel kapsülleri kullanın, başlamak için 1/8'i MMS2 ile doldurulur ve 3/4'üne kadar doldurulur.

q Mide bulantısı veya artan hastalık ortaya çıkarsa, kapsüllerdeki tozu yarı yarıya azaltın. Gerekirse, kapsüller ek hastalık veya mide bulantısına neden olmayana kadar azaltmaya devam edin. Tozu önerilen doza yavaş yavaş artırmayı tekrar deneyebilirsiniz, ancak herhangi bir ek hastalık ortaya çıktığında azaltın.

q Unutmayın, bunu yalnızca yeterince büyük olan ve bu süreçte açmadan bir kapsülü düzgün bir şekilde yutması için güvenilen bir çocuğa verin .

Machine Translated by Google

Ebola Virüsü

Ebola virüsü hastalığı şiddetlidir ve genellikle ölümcüldür. Bu yazının yazıldığı sırada, enfekte olan kişilerin %50'sini öldürdüğü bildiriliyor. Çoğunlukla enfekte bir kişiyle temas yoluyla ve bazen de enfekte bir kişinin temas ettiği masa, sandalye veya masa gibi bir yüzeyle temas yoluyla yayılır. Semptomlar ateş, mide bulantısı, kusma, ishal, kırmızı gözler, kızarıklıklar, göğüs ağrısı, öksürük, mide ağrısı, kilo kaybı, gözlerden, kulaklardan, burundan, rektumdan kanama ve çok fazla iç kanamayı içerebilir.

Batı Afrika'da, Genesis II Kilisesi Sağlık Bakanları, insanların Ebola virüsü hastalığının üstesinden gelmelerine yardım etmede başarılı oldular. Bu, mümkün olduğunda, bazı vakalarda öncesi ve sonrası laboratuvar testlerinde doğrulandı.

Kullanılan protokol temelde Chikungunya/Dang Ateşi Protokolü ile aynıydı (bkz. sayfa 190).
Kurbanlar yedi ila on gün içinde sağlığına kavuştu. Bununla birlikte, bir hafta ila on gün içinde kendini iyi hissetse bile, olası bir nüksetmeyi önlemek için protokolün tam 21 gününü tamamlamasını şiddetle tavsiye ediyorum.

Zika virüsü

Bu kitabın yazıldığı sırada, hem chikungunya hem de dang humması ile benzerlik gösteren bir sivrisinek tarafından da yayılan Zika virüsü, dünyada daha yaygın hale geliyor.
Şu anda, CDC'ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre, Zika virüsü hastalığına yakalanmış çoğu insanda semptom görülmeyecektir. Zika virüs hastalığının kuluçka süresi bilinmemekle birlikte birkaç gün ile bir hafta arasında olması muhtemeldir. Zika'nın en yaygın semptomları ateş, döküntü, eklem ağrısı veya konjonktivit (kırmızı gözler), kas ağrısı ve baş ağrısıdır.

Machine Translated by Google

Bugüne kadar, Zika virüsü ile MMS1 veya MMS2'yi kullanarak yeterli ve devam eden bir başarı kanıtı almadık. Bununla birlikte, bazı Sağlık Bakanlarımızdan, bu kitapta chikungunya ve dang humması için ana hatlarıyla belirtilen protokolü izledikten sonra Zika'dan tamamen sağlığına kavuşan kişilerin onayını aldık.

Bir Zika bölgesindeyseniz ve enfekte olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya enfekte olan diğer kişilere yardım etmek istiyorsanız, aynı protokolü öneririm. Semptomlar tamamen geçene ve sağlık geri gelene kadar protokolde verilen saatlik dozları koruyun.

Sivrisinek ısırıkları

Bir sivrisinek tarafından ısırıldığında, ısırığın üzerine bir damla aktive edilmemiş MMS damlatın ve nazikçe ovalayın. Kaşıntı birkaç dakika içinde duracaktır. MMS'i ovaladıktan sonra yıkamak genellikle gerekli değildir, ancak isterseniz alanı en az beş dakika bekledikten sonra sabun ve suyla yıkayın.

MRSA Protokolü

MRSA (Metisilin dirençli Staphylococcus Aureus), yaygın olarak staf olarak bilinir. Hem vücudun içinde hem de dışında bu enfeksiyon oldukça sorun haline gelebilir. Bilinen tüm antibiyotiklere dirençli bir enfeksiyondur. Ne yazık ki, her yıl MRSA birçok insanı öldürüyor.

Neyse ki MMS ile kontrol etmek kolaydır.

MRSA, vücudun dışında ağrılı döküntülerle kendini gösteren, hem dahili hem de harici bir sorun olabilir. MRSA'sı olan herkes, Sağlık İyileştirme Planına göre, Başlatma Prosedürü ile başlayıp daha sonra Protokol 1000'e kadar MMS1 protokollerini almalı ve gerekirse, aşağıda belirtildiği gibi daha fazla protokolle devam etmelidir.

Machine Translated by Google

bu kitap. Deri döküntüsü olanlar da bu dış döküntülerde (aşağıdaki talimatlarda açıklandığı gibi) klor dioksit gazı kullanmalıdır, çünkü bu, enfeksiyonu kolayca halleder. Aynı prosedür, herhangi bir standart kaynatma için de etkilidir.

MRSA'nın (ve Kaynamaların) Üstesinden Gelmek İçin Talimatlar

Aşama 1

q Başlatma Prosedürü ile MMS1'i ve ardından Protokol 1000'i alarak başlayın (bkz. sayfa 79-87).

Not: Vücudun dışında kendini gösteren MRSA'sı olanlar veya çıbanları olanlar için, klor dioksit gazı kullanarak aşağıdaki adımlara hemen başlayın ve aynı anda yukarıdaki Adım 1'den başlayın. Tercih edilirse, MMS1/DMSO Yama Protokolü, aşağıdaki prosedürün yerine MRSA yaraları veya çıbanlarında da kullanılabilir (bkz. sayfa 135).

Adım 2

q MRSA enfeksiyonu veya çıban üzerine uyacak bir bardak, fincan veya kase bulun. Kasenin veya bardağın şeffaf cam olması en iyisidir, böylece içinden görebilir ve neler olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Cam tercih edilir, ancak şeffaf bir plastik kap işe yarar. Bunu bulamazsanız, normal bir kahve fincanı veya kasesi kullanın.

Aşama 3

q MRSA enfeksiyonunun etrafındaki alanı temizleyin veya fincan veya bardağın enfeksiyonun üzerine ve çevresine güvenli bir şekilde oturması ve hiçbir MMS gazının kaçamaması için kaynatın. Bardağı yerinde tutacaksın. Orada beş dakikadan fazla olmayacak.

Machine Translated by Google

4. Adım

q Kaç damla MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) kullanılacağını belirleyin. Enfeksiyonun boyutuna bağlı olarak, 5 ila 20 damla MMS1 kullanın (aktive etmek için %4 HCl veya %50 sitrik asit kullanarak). MRSA enfeksiyonu veya yaklaşık 1/2 inç (1,25 cm) çapında bir kaynama için 5 damla kullanın. MRSA enfeksiyonu için 10 damla MMS1 kullanın veya 1 inç (2,5 cm) kaynatın. Çapı 2 inç (5 cm) veya daha büyük olan herhangi bir yara için 15 ila 20 damla kullanın.

Adım 5

q Kullanılacak damla sayısı konusunda yukarıdaki Adım 4'ü kılavuz olarak kullanarak, bu damlaları kabınıza koyun ve enfeksiyonu veya kaynamayı hemen kapatın. MMS1'in cildinize akmaması ve gazın dışarı çıkmasına izin vermemeniz için kabı tutmaya dikkat edin. Kaynamanın konumuna bağlı olarak uzanmanız veya eğilmeniz gerekebilir.

q Cildi yakmamak için bunu maksimum beş dakikadan fazla uygulamayın . Özellikle hassas bir cilde sahipseniz, cildin nasıl tepki verdiğini görmek için bu prosedürü ilk kez sadece üç dakika yapmak en iyisidir. Cilt iyi tepki verirse, dört saat sonra (aşağıdaki talimatlara bakın) ve gerekirse ikinci kez beş dakikaya kadar tekrar edilebilir. Ama unutmayın, beş dakikadan fazla değil.

6. Adım

q Etkinleştirilen MMS tarafından üretilen klor dioksit gazı enfeksiyonu saniyeler içinde kaplayacak ve enfeksiyonun açıldığını görebileceksiniz ve enfeksiyonun içi birkaç dakika içinde boşalacaktır.
Ayağa kalkın, oturun ya da uzanın, böylece enfeksiyon - kolunuzun, yüzünüzün veya bacağınızın yanında olsun - akabilir,

Machine Translated by Google

irin kabınıza aşağı doğru akmasına izin verin.

q Kalanı emmek için elinizde bir miktar mendil bulundurun.
kabı çıkardığınızda irin.

7. Adım

q 1'den 6'ya kadar olan Adımları bir kez uyguladıktan sonra, daha fazla enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olacak olan alanı Vazelin ile kaplayın.

8. Adım

q Enfeksiyonda hala bir miktar irin kalmış gibi görünüyorsa, 1'den 6'ya kadar olan Adımları ikinci kez tekrarlayabilirsiniz. Bunu ancak ilk uygulamadan sonra en az dört saat bekledikten sonra ve Vazelini sabun ve suyla mümkün olduğunca iyice yıkadıktan sonra yapın.

q 1'den 6'ya kadar olan Adımları ikinci kez tekrarladıktan sonra, enfeksiyonu önlemek için bölgeyi bir kez daha Vazelin ile kaplayın.

9. Adım

q 1'den 6'ya kadar olan adımları üçüncü kez tekrarlayabilirsiniz, ancak yine, ancak ikinci uygulamadan sonra en az dört saat bekledikten sonra ve yalnızca Vazelini sabun ve suyla mümkün olduğunca iyice yıkadıktan sonra.

Adım 10

q Ağrı ve ağrının devam ettiği ender bir durumda, durum düzelene kadar her dört saatte bir Adım 1 ila 6'yı tekrarlayabilirsiniz. Bu noktada, Adım 1'den 6'ya kadar olan her uygulama arasında dört saat bekleyin.

Machine Translated by Google

Adım 1 ila 6'yı tekrarladığınızda, daha fazla enfeksiyonu önlemek için alanı Vazelin ile kaplamalısınız ve Adım 1 ila 6'nın diğer uygulamalarından önce Vazelini yıkadığınızdan emin olun.

11. Adım

q Büyük olasılıkla, enfeksiyonun bulunduğu deride ve ette bir delik olacaktır. Deliğe biraz vazelin koyabilirsiniz. İki veya üç gün içinde iyileşmeli. Vazelin daha fazla yeniden enfeksiyonu önler. MMS1 sprey şişesiyle püskürtebilirsiniz (sayfa 76'daki talimatlara bakın), ancak buna nadiren ihtiyaç duyulur.

Adım 1/2

q Yukarıdaki Adım 1'e göre, MRSA'lı kişi Başlangıç Prosedürü'nü, ardından Protokol 1000'i tamamlamalıdır. MMS1'i cilt yaralarında da kullanıyorlarsa ve yaralar Protokol 1000'in gerektirdiği 3 haftalık süre bitmeden önce düzeliyorsa , yine de Protokol 1000'in 21 gününü bitirmek en iyisi olacaktır. Bu, vücudu istenmeyen bakteri ve toksinlerden daha fazla temizleyecektir.

Günlük MMS1 Bakım Dozu

Günlük MMS idame dozu çok önemlidir.
Günümüz toplumunda hastalıklara neden olan muazzam miktarda toksinler, zehirler ve diğer sağlık tehlikeleri ile birlikte, kişinin sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için korunma şarttır. MMS1 bu hedefe ulaşmanıza yardımcı olabilir. İdame dozunuzu almak için iyi bir zaman, uyku sırasında detoksifikasyon sürecine yardımcı olan yatmadan öncedir. Stres zamanlarında veya yerel bir hastalık grip, öksürük, soğuk algınlığı vb. "etrafta dolaşırken" veya seyahatler vb. sırasında olduğu gibi toksinlere fazladan maruz kaldığınız her zaman, idame dozunu iki katına çıkarmanızı öneririm. Yani, eğer günlük alırsan

Machine Translated by Google

idame dozu ve fazladan maruziyetiniz varsa, alın
günde iki kez (sabah ve akşam) bir yerine. Eğer sen
haftada 3 kez bir idame dozu alın, bunun yerine onu alın
bu zamanlarda günlük.

Aşağıdaki dozaj çizelgelerinde fark edeceksiniz, 60 yaşın altındaki
yetişkinlerin bakım almasını öneriyorum.
haftada 3 kez doz ve yine de çocukların
günlük idame dozu (onlara göre ayarlanır)
ağırlık). Bunun nedeni, çocukların kural olarak
gün boyunca çok çeşitli toksinlere; oynarlar
yerde veya pislikte, kirli elleri
ağızlar vb.

Günlük Bakım Dozu—Çocuklar	
Yaş ve Ağırlık Günlük Dozaj	
12 lbs veya daha az (5,5 kg veya daha az) Günde 1 damla	
12-24 libre (5,5-11 kg) günde 2 damla	
25-49 lbs (11-23kg) Günde 3 damla	
50-74 lbs (23-34kg) günde 4 damla	
75-100lbs (34-45kg) Günde 5 damla	
100-lbs ve üzeri (45 kg ve üzeri) günde	6 damla

Günlük Bakım Dozu—Yetişkinler	
Yaş ve Ağırlık	Günlük Dozaj
60 yaş ve üzeri yetişkinler, 100 ila 200 libre	günde 6 damla
60 yaş ve üzeri yetişkinler, 200 kilo ve üzeri	günde 8 damla
60 yaş ve altı yetişkinler, 100 ila 200 libre	Haftada 3 kez 6 damla
60 yaş ve altı yetişkinler, 200 kilo ve üzeri	Haftada 3 kez 8 damla

Not: Günlük ana kullanım dozunuz için MMS2 kullanmanız gerekiyorsa, lütfen sayfadaki Protokol 4000 notlarına bakın.
172 talimatlar için.

Machine Translated by Google

Morgellans ve MMS: MMS'i elime almanın bir mucize olduğunu söylüyorum. Şimdi Morgellons olduğuna inandığım şeyle acı çekiyordum. Doktorum "Teşhis koyamam, tedavi edemem" dedi ve odadan çıktı. Ben de yıllardır Candida ile savaşıyordum ve hiçbir şey işe yaramadı, daha iyi olacak ve geri dönecekti. Kızım, bir sağlık sorununa yardımcı olan bir ürün bulmamı istedi. İstediğini düşündüğüm bir ürün buldum.

Kısa süre sonra MMS'imin gönderildiğini söyleyen bir e-posta aldım. MMS'i araştırdım. Gördüklerime inanamadım, tam da yaşadığım semptomlar için ihtiyacım olan şeydi. Protokolü başlattım ve neredeyse anında yaralar ve kaşıntılar düzeldi.

Bugün Morgellonlar ve Candidalar gitti. İridoloğa gittim ve beni görünce dedi. "Aman Allahım böyle iyileşen birini görmedim, ne yaptın?" Ona MMS'i nasıl aldığımı anlattım. Bunu bir kağıda yazman ve Morgellon'lardan muzdarip olabilecek başkalarıyla paylaşman gerektiğini söyledi. MMS sayesinde bugün hayatta ve sağlıklıyım.
Bu harika ürünü bulmadan önce bir yıl boyunca ağrı, kaşıntı ve uyuyamama nedeniyle intiharı düşünüyordum. Tanrı'nın vücudumu iyileştirecek ucuz bir ürün bulmama izin verdiğine inanıyorum. Jim Humble'a teşekkürler. —Joy S., Amerika Birleşik Devletleri

eğer

Ödem Geçti: Bacaklarımda kötü bir ödem vakası vardı ve kan pıhtısı olduğunu düşündüm. Kendime Protokol 1000 ile tedavi ettim ve birkaç gün içinde bacaklarım normale döndü.
Çukurlaşma, şişme vb. yok —CP, Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

12. Bölüm
Acil Durum Protokolleri

Acil bir durum meydana geldiğinde temel fikir hızlı hareket etmektir. Durumun üstesinden gelmeye ve mevcut olabilecek zehirleri öldürmeye yardımcı olacak bir şeyi vücuda sokmak istiyorsunuz. Aşağıda, MMS'in özellikle yararlı olduğunu bulduğumuz bazı acil durumları bulacaksınız. Bu, kesinlikle kapsamlı bir liste değildir.

MMS, diğer birçok acil durum için de çalışacaktır.
Bu protokollerle ilgili olarak, bu kitabın başka yerlerinde verilen çok fazla MMS almama ve aynı zamanda çok ileri gitmemeye dikkat etme tavsiyesini göz ardı etmek gerekebileceğini unutmayın. Bu talimatları izleyin ve vücudun size ne söylediğini dinleyin - ister sizin ister başka birinin olsun.

sorumluluk reddi

Bu acil durum protokolleri, kendilerini korkunç bir durumda bulan ve lojistik, finansal veya başka bir nedenle ana akım tıbbi yardım alamayacak durumda olan kişiler için bir alternatiftir, örneğin hastaneye gitmek istememe gibi kişisel bir karar gibi. hastaneye yatırın ve kendini alopatik prosedürlere tabi tutun. Bir alternatif seçme kararı kişisel bir seçimdir. Buradaki herhangi bir bilginin her türlü kullanımı için sorumluluk her bir kişiye %100'dür. Kişi kendi sağlığı için tam sorumluluk almaya hazır değilse, ciddi veya daha az ciddi bir vakada, geleneksel tıbbi yardım almalarını şiddetle tavsiye ederim.

Machine Translated by Google

Sokmalar ve Isırmalar

Böcekleri, akrepleri veya örümcekleri sokmak veya ısırmak kişinin sağlığına zararlı olabilir. Bu yaratıklardan kaynaklanan sokmaların veya ısırıkların sonuçları, rahatsız edici, ciddi ve tedavi edilmezse muhtemelen ölümcül olabilir. Aşağıda özetlenen bilgileri takip etme kararı kişiye kalmıştır. Herhangi bir durumda, herkes ne yapacağına karar vermelidir.

Arı sokmalarına ve zehirli olan diğer sokmalara alerjisi olanlar için, MMS'in bu durumun üstesinden gelmede etkili olduğu ve ilaçların ciddi yan etkileri riskini ortadan kaldırdığı kişisel deneyimim olmuştur. Örneğin, hem örümcek ısırığı hem de akrep antivenin neredeyse her zaman ölüm olasılığı da dahil olmak üzere birçok olumsuz yan etkiyi listeler. MMS bildiğimiz kadarıyla hiç kimsede kalıcı yan etkilere neden olmamıştır. Aşağıdaki ısırık ve sokma prosedürleri birçok insan için işe yaramıştır, ancak %100 garanti yoktur.

Akrep Sokmaları

Çoğu akrep sokması ölümcül değildir, sadece acı verir.
Ancak, sizi sokan kişinin ölümcül olmadığı fikrine güvenemezsiniz.
ABD'de ölümcül olan bir akrep türü vardır. Dünyada 2.000'den fazla akrep türü vardır ve bu türlerden sadece birkaçı ölümcül türlerdendir, ama yine de, sizi sokan akrebin ölümcül bir akrep olmadığını asla düşünmeyin. Bir akrep tarafından sokulursam, aşağıdaki adımları denerdim. Makul bir süre içinde iyileşmiyorsam ve daha da kötüleşiyor gibi görünüyorsam, antivenin serumu olan bir hastaneye veya kliniğe giderdim. Örümcek ısırıkları gibi akrep sokmaları için aynı sorun olduğu gibi, antivenin'in olumsuz bir etkisinin olmaması için dua edin, çünkü ölüm, antivenin için sıklıkla listelenen olası yan etkilerden biridir.

Machine Translated by Google

Akrep Tarafından Sokıldıktan Hemen Sonra

Aşama 1

q Akrep sokması durumunda hemen ağızdan MMS1 almaya başlayın. 1/2 bardak (4 ons/120 ml) su içinde 6 damlalık bir MMS1 dozunu ve ardından yarım saat sonra ikinci bir 6 damlalık MMS1 dozunu alın.

Not: Bu, Protokol 6 ve 6'ya benzerdir (bkz. sayfa 169), ancak bu durumda dozlar bir saat arayla değil, yarım saat arayla birbirine daha yakın alınır. Bir çocuk için bu prosedürün uygulanması durumunda, 265. sayfadaki tabloya göre dozu ağırlığa göre ayarlayarak Protokol 6 ve 6 ile aynı dozaj kurallarını izleyin.

q İlk MMS1 dozu midenizi bulandırıyorsa veya kusmanıza neden oluyorsa, daha fazla su (8 ons) için ve mümkünse tekrar kusmayı deneyin. Bu durumda kusma iyidir ve zehrin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Adım 2

Adım 1 ile eş zamanlı olarak, ilk oral MMS1 dozunuzu aldıktan hemen sonra - sokma zehrini nötralize etmeye başlayın:

q Temiz, kuru bir bardakta 3 damla MMS'i 3 damla asit aktivatörü ile etkinleştirin. 30 saniye sayın. Su eklemeyin.

q Parmağınızın ucunu MMS1 karışımına batırın ve iğnenin olduğu bölgeye sürün. (Doğrudan akrebin saldırdığı noktadan almaya çalışın ve çevredeki deriye çok fazla sürmeyin.) MMS1'i deliğin içine doğru zorlamak için basınç uygulamaya çalışın. Bunu her beş dakikada bir yapın. Her uygulamadan sonra parmağınızı durulayın.

Machine Translated by Google

q Talimatlara göre yeni bir MMS1 dozunu karıştırın
yukarıda, her 15 ila 20 dakikada bir.

q İğnenin ağrısı geçtiğinde, MMS1 karışımını doğrudan iğnenin
üzerine uygulamayı bırakın.

q Sokma acıtmaya veya kaşınmaya devam ederse daha uzun süre
devam edin.

Not: İğnenin çevresinde cilt ciddi şekilde tahriş olmaya başlarsa,
MMS1'i birkaç saat kullanmayı bırakın.

Aşama 3

q İkinci 6 damlalık MMS1 dozunu aldıktan sonra, tüm negatif belirtiler
geçene kadar her uyanık saatte bir 3 damlalık MMS1 dozu almaya
devam edin. Bunu birkaç gün sürse bile yapın.

Not: 3 damla doz, standart Protokol 1000 dozudur.
Bir çocuğun akrep tarafından sokulması durumunda, çocuklar için
Protokol 1000 için ağırlık başına dozaj kılavuzunu izleyin (bkz. sayfa
258).

Arı ve Yaban Arısı Sokmaları

Birçok insan için arı ve yaban arısı sokmaları büyük bir sorun
oluşturmaz ve çok az soruna neden olur. Arı sokması için kabartma
tozu yapmak veya yaban arısı sokması için sirke kullanmak gibi bu
sokmalar için etkili bazı ev ilaçları vardır. Aynı şekilde, bir sokmaya
karşı küçük bir tepkiniz varsa bu protokol yardımcı olabilir. Arı veya
yaban arısı sokmalarına alerjiniz varsa ve bunlara ciddi reaksiyon
gösteriyorsanız doğrudan bu protokole geçmenizi öneririm.

Arı sokması doğada asidiktir ve aktifleştirilmemiş MMS ile nötralize
edilebilir (sodyum klorit içinde %22.4 solüsyon).

Machine Translated by Google

su), bu, bir asit aktivatörü ile karıştırılmadan yapılır. Yaban arısı sokması alkalidir ve asitle nötralize edilmelidir. %4 HCl asit veya %50 sitrik asit kullanabilirsiniz.

Arı veya yaban arısı sokması bölgesinde zehiri nötralize etmek için talimatlar aşağıdadır.

Arı ve Yaban Arısı Sokmaları için Talimatlar

Aşama 1

q Arı veya yaban arısı sokması durumunda, hemen ağızdan MMS1 almaya başlayın. 1/2 bardak (4 ons/120 ml) su içinde 6 damlalık bir MMS1 dozunu ve ardından yarım saat sonra ikinci bir 6 damlalık MMS1 dozunu alın.

Not: Bu, Protokol 6 ve 6'ya benzerdir (bkz. sayfa 169), ancak bu durumda dozlar bir saat arayla değil, yarım saat arayla birbirine daha yakın alınır. Bir çocuk için bu prosedürün uygulanması durumunda, 265. sayfadaki tabloya göre dozu ağırlığa göre ayarlayarak Protokol 6 ve 6 ile aynı dozaj kurallarını izleyin.

q İlk MMS1 dozu midenizi bulandırıyorsa veya kusmanıza neden oluyorsa, daha fazla su (8 ons) için ve mümkünse tekrar kusmayı deneyin. Bu durumda kusma iyidir ve zehrin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Adım 2

q Adım 1 ile eş zamanlı olarak, ilk oral MMS1 dozunuzu aldıktan hemen sonra - sokma zehrini nötralize etmeye başlayın. Lütfen 2. Adımdaki bu talimatların arı ve yaban arısı sokması için farklı olduğunu unutmayın.

Arı sokması

q MMS kullanın (sodyum klorit, arıtılmış suda %22.4), ancak etkinleştirmeden. Etkinleştirilmemiş MMS

Machine Translated by Google

oldukça alkalidir ve arı sokmasının asidini nötralize eder.

q Temiz ve kuru bir bardağa 4 veya 5 damla MMS koyun. Su eklemeyin.

q Parmağınızın ucunu etkinleştirilmemiş MMS'e daldırın ve iğneyi dikkatlice ovalayın. Küçük bir miktarı sokmaya zorlamak için sertçe bastırın. Bunu her beş dakikada bir tekrarlayın.

q Sokmanın ağrısı geçtiğinde, sodyum kloriti (aktive edilmemiş MMS) doğrudan sokmanın üzerine uygulamayı bırakın.

q Sokma acıtmaya veya kaşınmaya devam ederse, bir saate kadar daha uzun bir süre devam edin.

q MMS uygulamasını durdurduktan sonra alanı temiz suyla iyice durulayın.

Bir Saat Sonra Acı Vermeye Devam Ediyorsa

q Alanı temiz suyla iyice durulayın.

q Bir saat boyunca sadece MMS (aktive edilmemiş MMS) uygulandıktan sonra, arı sokmasının asidik yapısı yeterince nötralize edilir. Hala acıyorsa, artık kalmış olabilecek zehirleri yok etmek için etkinleştirilmiş MMS (MMS1) uygulayabilirsiniz.
3 damla aktivatör asit ile 3 damla MMS (sodyum klorit) etkinleştirin ve 30 saniye sayın. Su eklemeyin.

q İğnenin üzerine sürün ve dikkatlice ovalayın.

q Bu, yarım saate kadar her beş dakikada bir tekrarlanabilir.

Machine Translated by Google

Eşek arısı iğnesi

q MMS kullanmayın. Aktivatör asidi tek başına kullanın (%4 HCl veya %50 sitrik asit). Bunlar yoksa, düz limon suyu veya sirke bir sonraki en iyi şeydir.

q Temiz ve kuru bir bardağa 4 veya 5 damla asit koyun. Su eklemeyin.

q Parmağınızın ucunu aside batırın ve iğnenin olduğu yere sürün. (Doğrudan sokma bölgesine almaya çalışın ve çevredeki deriye çok fazla sürmeyin.)
İğne deliğine dikkatlice sürün, ancak iğne zehrini nötralize etmek için deliğe biraz asit sokmak için sertçe bastırın.

q Bunu her beş dakikada bir yapın. Parmağınızı sonra durulayın her uygulama.

İğnenin ağrısı geçtiğinde, asidi doğrudan sokmanın üzerine uygulamayı bırakın.

q Sokma acıtmaya veya kaşınmaya devam ederse, bir saate kadar daha uzun bir süre devam edin.

q Asidi uygulamayı bıraktıktan sonra alanı temiz suyla iyice durulayın.

Bir Saat Sonra Acı Vermeye Devam Ediyorsa

q Alanı temiz suyla iyice durulayın.

q Yaban arısı sokmasına bir saat boyunca sadece asit uygulandıktan sonra , sokmanın alkali doğası nötralize edilmelidir.
Hala acıyorsa, kalan zehirlerden herhangi birini yok etmek için artık etkinleştirilmiş MMS (MMS1) uygulayabilirsiniz.
3 damla MMS'yi (sodyum klorit) 3 damla ile etkinleştirin

Machine Translated by Google

aktivatör asit ve 30 saniye sayın. Su eklemeyin.

q İğnenin üzerine sürün ve dikkatlice ovalayın.

q Bu, yarım saate kadar her beş dakikada bir tekrarlanabilir.

Aşama 3

q İkinci 6 damlalık MMS1 dozundan sonra, tüm negatif semptomlar azalana kadar her uyanık saatte bir 3 damlalık MMS1 dozu almaya devam edin. Bunu birkaç gün sürse bile yapın.

Not: 3 damla doz, standart Protokol 1000 dozudur.
Bir çocuğun bir arı veya yaban arısı tarafından sokulması durumunda, çocuklar için Protokol 1000 için ağırlık başına dozaj kılavuzunu izleyin (bkz. sayfa 258).

örümcek ısırıkları

Hem Black Widow hem de Brown Recluse örümcekleri sadece acı vermekle kalmaz, aynı zamanda ölümcüldürler. Onları ayrı ayrı listeledim, her biri ayrı bir protokole sahip. Isırdığınızın bir Black Widow veya Brown Recluse olduğundan şüpheleniyorsanız, bu protokollerin her seferinde (şimdiye kadar) çalıştığı bilindiğinden, lütfen sırasıyla belirli protokole bakın. (Sayfa 213, 217'ye bakın.)

Başka bir zehirli örümceğin sizi ısırdığından şüpheleniyorsanız (dünyada birçok zehirli örümcek vardır), aşağıdaki basit çözüm etkili olabilir. Bu ilaç makul bir süre içinde (birkaç saat) ağrı ve şişliği gidermezse, antivenin bulunan bir hastaneye veya kliniğe gitmenizi öneririm.

Machine Translated by Google

Not: MMS bir oksitleyicidir ve birçok zehri oksitleyip yok ettiği bilinmektedir. Bununla birlikte, MMS'in var olan yüzlerce tür örümcek zehirini kelimenin tam anlamıyla yok etme yeteneğini test etmemizin hiçbir yolu yoktur. MMS'in çoğu zehirlenme durumunda yardımcı olacağı bizim deneyimlerimizdir, ancak bir örümcek ısırığı durumunda MMS'i kullanıp kullanmama kararı tamamen bireyin sorumluluğundadır.

Zehirli Bir Örümcek Tarafından Isırıldıktan Hemen Sonra

Aşama 1

q Isırmanın bunlardan biri olmadığından emin olmak için hem Black Widow hem de Brown Recluse Spider Protokolleri'ndeki (bkz. sayfa 213, 217) giriş paragraflarını okuyun.

q Örümcek ısırığı durumunda, hemen ağızdan MMS1 almaya başlayın. 1/2 bardak (4 ons/120 ml) su içinde 6 damlalık bir MMS1 dozunu ve ardından yarım saat sonra ikinci bir 6 damlalık MMS1 dozunu alın.

Not: Bu, Protokol 6 ve 6'ya benzerdir (bkz. sayfa 169), ancak bu durumda dozlar bir saat arayla değil, yarım saat arayla birbirine daha yakın alınır. Bir çocuk için bu prosedürün uygulanması durumunda, 265. sayfadaki tabloya göre dozu ağırlığa göre ayarlayarak Protokol 6 ve 6 ile aynı dozaj kurallarını izleyin.

q İlk MMS1 dozu midenizi bulandırıyorsa veya kusmanıza neden oluyorsa, daha fazla su (8 ons) için ve mümkünse tekrar kusmayı deneyin. Bu durumda kusma iyidir ve zehrin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Machine Translated by Google

Adım 2

Adım 1 ile eş zamanlı olarak, ilk oral MMS1 dozunuzu aldıktan hemen sonra—ısırık zehrini nötralize etmeye başlayın.

q Temiz, kuru bir bardakta 3 damla MMS'i 3 damla asit aktivatörü ile etkinleştirin. 30 saniye sayın. Su eklemeyin.

q Parmağınızın ucunu MMS1 karışımına batırın ve ısırığın üzerine bastırın. (Doğrudan ısırığın üzerine ve çevredeki deriye çok fazla sürmemeye çalışın.) Bunu her beş dakikada bir yapın. Her uygulamadan sonra parmağınızı durulayın.

q Talimatlara göre yeni bir MMS1 dozunu karıştırın yukarıda, her 15 ila 20 dakikada bir.

Isırığın ağrısı geçtiğinde, MMS1 karışımını doğrudan ısırık üzerine uygulamayı bırakın.

q Isırık acıtmaya veya kaşınmaya devam ederse daha uzun süre devam edin.

Not: Cilt, ısırık çevresinde ciddi şekilde tahriş olmaya başlarsa, MMS1'i birkaç saat kullanmayı bırakın.

Aşama 3

q İkinci 6 damlalık MMS1 dozunu aldıktan sonra, tüm negatif belirtiler geçene kadar her uyanık saatte bir 3 damlalık MMS1 dozu almaya devam edin. Bunu birkaç gün sürse bile yapın.

Not: 3 damla doz, standart Protokol 1000 dozudur.
Bir çocuğun zehirli bir örümcek tarafından ısırılması durumunda,

Machine Translated by Google

Çocuklar için Protokol 1000 için ağırlığa göre dozaj kılavuzunu izleyin (bkz. sayfa 258).

Brown Recluse Protokolü

Genel olarak, Brown Recluse örümceği, herkesin alabileceği en tehlikeli örümcek ısırığı olarak kabul edilir (ormandaki nadir türler dışında). Brown Recluse ısırıklarından birçok insan öldü. Bir web sitesi, her yıl ısırılan insanların %25'inin ısırık nedeniyle öldüğünü listeliyor. Doğru olabilir de olmayabilir de; Ancak, böyle bir ısırığın insana çok büyük dertler açabileceğine şüphe yoktur. Brown Recluse ısırığı için başarılı bir tedavi önerebilecek bir tıp doktoruyla henüz tanışmadım. Ancak, aşağıdaki prosedürü oldukça etkili buldum. Brown Recluse ile, mümkün olan en kısa sürede herhangi bir ısırmaya eğilimli olduğunuzdan emin olmak istersiniz.

Not: 40 yıl Kaliforniya ve Nevada çöllerinde yaşadım, bu süre zarfında 20 ila 25 kişiyi Brown Recluse ısırıkları için aşağıda belirtilen çinko oksit merhemiyle kişisel olarak tedavi ettim. Son birkaç yılda MMS de ekledim. Çinko oksit merhemi her zaman MMS ile veya MMS olmadan çalıştı. Bu protokolü kullanıp kullanmama kararı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kanımca, tıbbi sistemin Brown Recluse örümcek ısırığı için etkili bir tedavisi olmadığı için bu protokol hayatınızı kurtarabilir.

Kahverengi Keşiş Isırığının Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Normalde, örümceğin sizi ısırdığını görmedikçe, bir Brown Recluse tarafından ısırıldığınızı hemen bilemezsiniz. Brown Recluse ile asla ısırığı hissetmezsiniz. Ancak ısırıldıysanız, genellikle yaklaşık dört saat sonra kaşıntı hissetmeye başlayacaksınız. İlk başta çok güçlü hissetmeyecek, çizecek kadar bile değil, ama sonra olacak.

Machine Translated by Google

daha yoğun hale gelir. Kaşınan bölgeye baktığınızda, buğday tanesi büyüklüğünde küçük kırmızı bir nokta fark edeceksiniz ve o zamana kadar muhtemelen onu birkaç kez çizmiş olacaksınız. Bu noktadan sonra işler oldukça hızlı bir şekilde kötüleşir. Kaşıntı aşırı derecede kötüleşir ve daha sonra ağrılı kaşıntıya dönüşür ve bu daha sonra akut ağrıya dönüşür. Bu akut ağrı noktasına ulaşmak için gereken süre, genellikle 8 ila 24 saat arasında değişebilir.

Hiçbir şey yapılmazsa, ağrı için ilacın reçete edildiği doktora gidene kadar ağrı daha da kötüleşir. Ağrı kesici muhtemelen ağrıyı ortadan kaldırabilir, ancak ağrının altında yatan nedeni ele almaz. Yakında küçük bir delik gelişmeye başlar. Delik daha da büyüyebilir ve sonunda kemiğe kadar gider. Isırığın nerede olduğuna bağlı olarak, insanların delik büyüdükçe bacaklarının yarısını veya yüzlerinin çoğunu kaybettiği bilinmektedir. Ağır vakalarda, bazı insanlar ölmeden önce iki yıla kadar acı çekerler. Bu durumun önüne geçebilmeniz ve gerekirse başka birine de yardımcı olmanız umuduyla bu detayları paylaşıyorum.

Brown Recluse Spider Bite için Talimatlar

Aşama 1

q Protokol 6 ve 6'nın küçük bir varyasyonunu başlatın (bkz. sayfa 169). 6 damlalık bir MMS1 dozu alın, ardından ikinci 6 damlalık dozu bir saat yerine sadece yarım saat sonra alın.

q İkinci 6 damlalık dozu aldıktan yarım saat sonra Protokol 1000'e başlayın. Ancak ilk saatte 1/2 damlalık bir doz alarak başlayın ve miktarı her saat başı 1/2 damla artırarak 3 damlaya kadar artırın her saatte bir doz.
Protokol 1000 ile iki hafta ve gerekirse üçüncü hafta veya gerektiği kadar devam edin.

Machine Translated by Google

Adım 2

q İlk MMS1 dozundan hemen sonra aynı anda çinko oksit uygulamaya başlayın. Eşit miktarda çinko oksit ve Vazelin Petrol Jelini karıştırın. Bunu bir macun haline getirin.

Aşama 3

q Isırma bölgesine bol miktarda merhem sürün ve bir veya iki dakika hafifçe ovalayın.

q Bir veya iki dakika sonra, güzel ve kalın olduğundan emin olmak için ısırılan bölgeye biraz daha merhem sürün. Alanı gazlı bez ve yapışkan bantla kapatın. İyice sarın ama hava almayacak kadar sıkı değil.

4. Adım

q Dört saat sonra Adım 3'ü (yukarıdaki) tekrarlayın. Eski uygulamayı yıkamak gerekli değildir.

Adım 5

q Dört saat daha sonra Adım 3'ü (yukarıdaki) tekrarlayın. Bu çinko oksit merheminin üçüncü uygulaması olacak.

6. Adım

• Çinko oksit merheminin üç kez uygulanmasından sonra (her biri dört saat arayla) ağrı ve kaşıntı azalmalıdır. Bununla birlikte, yine de rahatsızlık varsa, 1 ons arıtılmış suya 10 aktif MMS damlası çözeltisi olan MMS1 sprey şişesini kullanmaya başlayın (bkz. sayfa 76). Sprey şişesini kullanmadan önce alanı yıkayın.

q Etkilenen bölgeye 20 dakikada bir püskürtün. her şey temizlendi.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Unutmayın, bu prosedür boyunca mağdur, günde sekiz ardışık saat boyunca her saat başı Protokol 1000'e göre MMS1 almalıdır. İki hafta veya gerekirse daha uzun süre devam edin.

Ü Çinko oksit alamıyorsanız, bunun yerine kullanılabilecek çinko klorür bulabilirsiniz. Çinko klorür veya oksit genellikle dört saatten daha kısa sürede sonuç verir, ancak çinko klorür kullanmaktan kaynaklanan herhangi bir sorununuz varsa, biraz çinko oksit elde etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın ve işlemi tekrarlayın.

Ü Piyasada çeşitli markalarda Petrol Jelly bulunmaktadır. Bir merhem yapmak için kil veya çinko oksit ile karıştırmak için orijinal "Vazelin" markasını tavsiye ederim. Vazelin (%100 saf olması için üç kez saflaştırılmış orijinal), çoğu yağdan daha uzun süre cildi ıslatma ve nüfuz etme ve saatlerce yerinde kalma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bazen hindistancevizi yağı, zeytinyağı ve diğer yağlar çeşitli tıbbi maddeleri cilde taşımak ve orada tutmak için kullanılabilir. Ancak hiçbir şey Vase hattının şifalı maddeleri saatlerce cilt ile temas halinde tutma ve aynı zamanda bir iyileştirici madde olarak hareket etme yeteneği ile boy ölçüşemez.

Diğer çeşitli yağları sadece Vazelini elde edemiyorsanız kullanın.

Ü Yukarıdaki çinko oksitli prosedürün, Brown Recluse örümcek ısırığını dört saat içinde rahatlattığı bilinmektedir.

Varyasyon: Ülkenizde varsa, Desitin Bebek Bezi Döküntü Merhemi—Ekstra Güç, Brown Recluse Spider ısırıklarını iyileştirmede de başarılı olmuştur. Bu formül çinko oksit içerir. Ekstra Güç Formülü olan %40 çinko oksit içereni aldığınızdan emin olmak için malzemeleri kontrol edin. içeren formüller

Machine Translated by Google

%20 ila %25 çinko oksit işe yarayabilir, ancak %40 formülünün işe yarayacağı daha kesindir.

Kara Dul Protokolü

Bu bir masal değil; Kara Dul'un gerçekten de karnında parlak kırmızı bir kum saati şekli var. Her yıl birçok insan Kara Dul örümceği tarafından ısırılır, ancak çok azı onun ısırmasından ölür. Çoğu web sitesine göre muhtemelen ABD'de her yıl 5'ten az insan ölüyor.

Not: 40 yıl California ve Nevada çöllerinde yaşadım, bu süre zarfında Black Widow örümceği tarafından ısırılan 20'den fazla kişiye aşağıda verilen protokolle bizzat yardım ettim. Her zaman işe yaradı. Ayrıca, bir Kara Dul örümceği tarafından iki kez ısırıldım ve bu benim için işe yaradı. Aloe vera'nın bu protokolde kullanılması, 20 yaşlarında genç bir adamken eski bir çareler kitabında bulduğum bir şey. Bu yüzden insanlar uzun yıllardır Black Widow ısırıklarıyla başa çıkmak için protokolün bu bölümünü kullanıyorlar! O zamandan beri MMS1'i ekledim ve ikisinin kombinasyonunun iyi sonuçlar verdiğini gördüm. Ancak bu prosedürü takip etme kararı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Kara Dul'un ısırığı, Brown Recluse örümceğinden farklıdır.
Normalde bu ısırık ile hemen ağrı olur, ardından bir dizi olası reaksiyon gelir. Kas krampları, karın ağrısı (mide ağrısı), halsizlik, titreme, vücutta ağrı olabilir ve daha şiddetli vakalarda bulantı, kusma, bayılma, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk olabilir.

Kara Dul ısırığı için bir antivenin mevcuttur.
Sana şu ya da bu şekilde antivenin almanı söylemiyorum. Bir Kara Dul tarafından ısırıldığımda kendim kullanmadım ama birçok kişi kullandı. Bununla birlikte, çoğu farmasötik ilaç gibi, uzun bir yan etki listesi vardır.

Machine Translated by Google

astım öyküsü olanlar için olası ölüm de dahil olmak üzere bu ilaçtan. Diğer reaksiyonlar arasında döküntü, kurdeşen, kaşıntı, nefes almada zorluk, yutma güçlüğü, göğüste sıkışma ve ağız, yüz, dudaklar ve dilin şişmesi sayılabilir. İsterseniz antivenin almaya bir alternatif, MMS1 ve Aloe vera'dır.

Kara Dul Isırığı için Talimatlar

Aşama 1

q Yapılacak ilk şey, Protokol 6 ve 6'nın küçük bir varyasyonunu başlatmaktır (bkz. sayfa 169).

q 6 damlalık MMS1 dozu alın, ancak Kara Dul ısırığı durumunda ikinci 6 damlalık dozu bir saat yerine sadece yarım saat sonra alın.

Adım 2

q Eşzamanlı olarak, MMS1'in ilk 6 damlalık dozunu yukarıdaki adıma göre aldıktan hemen sonra ve ikinci 6 damlalık dozu almayı beklerken aşağıdakileri yapın:

q Büyük bir taze Aloe vera yaprağı elde edin.

q Tırtıklı kenarları kesin ve ardından yaprağı uzunlamasına kesin. Ardından yaklaşık 2 inç x 2 inç (5 cm x 5 cm) bir parça kesin ve taze Aloe vera'yı (etli tarafı aşağı bakacak şekilde) ısırığın üzerine koyun. Parçayı yerinde tutun ve gazlı bezle kapatın ve yapışkan bantla sıkıca sabitleyin. Aloe vera yaprağı ile derideki ısırık arasına hava girmediğinden emin olun .

q Acil bir durumda, uygun olanı elde edene kadar Aloe vera'yı yerinde tutmak için ne varsa kullanın.

Machine Translated by Google

(ör. gazlı bez/yapışkan bant) kullanın, ancak ısırığa hava girmemesi için iyice sabitleyin.

q Bunu 12 saat boyunca bırakın ve ısırık tamam olacaktır.
Ancak emin olmak için bu işlemi taze bir Aloe vera parçasıyla bir kez daha tekrarlayın. 12 saat daha bantlayın ve gereken tek şey bu olmalı.

Aşama 3

• İlk 6 damlalık dozu aldıktan ve Aloe vera'yı uyguladıktan yarım saat sonra , ikinci 6 damlalık dozu alın.

4. Adım

İkinci 6 damlalık dozu aldıktan yarım saat sonra (umarım ilk Aloe vera uygulamasını bu süre içinde uygulamış olursunuz) Protokol 1000'e başlayın. Ancak ilk saatte 1/2 damla doz alarak başlayın ve dozu artırın. Protokol 1000'in gerektirdiği gibi, saatte bir 3 damla doz oluşturacak şekilde, her saatte 1/2 damla miktarı.

q İki hafta boyunca Protokol 1000 ile günde sekiz ardışık saat MMS1 alarak devam edin. Gerekirse, Protokol 1000'de üçüncü hafta veya gerektiği kadar devam edin.

Yılan Isırığı Protokolü

Bu protokol, bize gelen yılan ısırığı vakalarının olmaması nedeniyle yaygın olarak kullanılmamış veya kanıtlanmamıştır. Küçük bir köpeği ısıran bir çıngıraklı yılanla ilgili bir test vakam vardı. MMS ile, ısırmadan iki gün sonra köpek iyiydi. Ancak gerçek şu ki, MMS1 çoğu zehir türünü etkisiz hale getirir. zehiri

Machine Translated by Google

yılan türü çok karmaşık bir moleküldür ve MMS1 (klor dioksit) karmaşık molekülleri oksidasyon yoluyla yok eder. Bu yüzden acil bir durumda, hiçbir şey yapmaktansa bir şeyler yapmak daha iyidir. Ve her durumda, kullanılan tıbbi tedaviye ek olarak bu protokolü uygulamak iyi bir fikir olacaktır, ancak kimsenin yılan ısırığınızı kesmesine izin vermeyin çünkü durumu daha da kötüleştirebilir.

daha kötüsü.

Talimatlar—Yılan Isırığı

Dikkat: Yılan ısırığı ile zaman kaybetmek istemezsiniz! Aşağıda verilen dozajlara göre MMS1'i mümkün olduğunca çabuk vücuda almaya başlamanız çok önemlidir.

Aşama 1

q Derhal 12 damlalık bir MMS1 dozu alın.

Adım 2

q Aynı anda, MMS1 dozlarının alınmasıyla birlikte, ısırık bölgesine Yılan Isırığı Yaması uygulayın. Bunu, yukarıdaki Adım 1'e göre ilk MMS1 dozunu aldıktan hemen sonra yapın. Yılan ısırığı yamasının bu kitabın 135. sayfasındaki MMS1/DMSO Yamasından önemli ölçüde farklı bir formül olduğunu lütfen unutmayın .

Asla ama asla bir yılan ısırığına DMSO koymayın, çünkü bu zehri dışarı çekmez, vücuda daha da götürür.
Bu protokolün 6. Adımını takip eden Yılan Isırığı Yaması Yapma bölümüne bakın, sayfa 221.)

Aşama 3

q Yarım saat sonra, ilk 12 damlalık MMS1 dozundan sonra, ikinci bir MMS1 dozu alın, bu sefer 6 damlalık bir doz.

Machine Translated by Google

4. Adım

q Yarım saat sonra, ikinci MMS1 dozundan sonra üçüncü bir doz alın.
Üçüncü doz, 6 damlalık MMS1 dozu olacaktır.

Özet: Birisi bir yılan tarafından ısırıldığında, derhal 12 damlalık bir MMS1 dozu almalıdır. Yarım saat sonra 6 damla MMS1 dozu almalıdırlar.
Bundan yarım saat sonra, 6 damlalık bir MMS1 dozu daha alın. Bu, yarım saat arayla alınan 3 MMS1 dozudur.
İlk 12 damla MMS1 dozundan sonra, bir yılan ısırığı için yamayı uygulamalıdırlar.

Adım 5

q Yarım saat sonra (yukarıdaki Adım 2, 3 ve 4'te belirtilen 3 doz MMS1 aldıktan sonra) Protokol 1000'e başlayın. Yani, günde sekiz ardışık saat boyunca her saat başı 3 damla MMS1 dozu alın. Yılan ısırması durumunda Başlangıç Prosedürünü atlayabilirsiniz.

6. Adım

q Yılan ısırığının hala sorun yarattığına dair herhangi bir belirti varsa, Protokol 1000'e en az iki hafta veya daha uzun süre devam edin. Mide bulantısı, ishal veya rahatsızlık hissi varsa, saatlik damla sayısını yarı yarıya azaltın.
Azaltın, ancak saatlik almayı bırakmayın.

3. Adımda Gerektiği gibi Yılan Isırığı Yaması Yapma Üstünde

Not ve Dikkat: Yılan ısırığı için yamanın tarifi, bu kitabın 135. sayfasındaki MMS1/DMSO Yama Protokolünde açıklanandan farklıdır. Yılan ısırığı için yama DMSO içermez. Yılan ısırığı için bir yamada DMSO kullanmayın. Bu ciddi bir hata olabilir.

Machine Translated by Google

DMSO, zehri yayacak ve dokuların daha derinlerine götürerek sorunu daha da kötüleştirecektir.

Aşama 1

q 10 damla MMS'i 10 damla %50 sitrik asit veya %4 HCl ile etkinleştirin. 30 saniyeye kadar sayın ve ardından 20 damla su ekleyin.

q Bu karışımı hemen yaklaşık 2 inç x 2 inç (5 cm x 5 cm) ve en az iki kat kalınlıkta bir gazlı bezin üzerine dökün. Bu karışım yamayı tamamen ıslatmak için yeterli değilse, tarifi ikiye katlayın. 10 damla daha MMS etkinleştirin ve yamayı karışıma batırabilmek için yukarıdaki noktada aynı formüle göre 20 damla su ekleyin.

q Ekstra büyük bir yılan ısırığı durumunda, yamayı 10 damladan fazla aktif MMS içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz. (Snake Bite Patch'in her 1 damla etkin MMS için 2 damla su eklemeyi gerektirdiğini lütfen unutmayın.)

Adım 2

q Islatılmış gazlı bezi yılan ısırığının üzerine bantlayın, bırakın 15 ila 20 dakika - artık yok!

q Unutmayın, yılan ısırığı yama DMSO içerir.

Aşama 3

q Bir saat içinde yeni bir yama (ikinci bir yama) uygulayın. Bu, ısırıldıktan sonraki ilk iki saat içinde iki MMS1 yaması uygulamış olacağınız anlamına gelir. Cildin tahriş olduğunu fark ederseniz yamaya daha fazla su ekleyin.

Machine Translated by Google

4. Adım

q İlk iki yamadan sonra, üç saat bekleyin ve yeni bir yama daha uygulayın ve her üç saatte bir yeni yama uygulamaya devam edin.

Notlar

Ü Toplamda, bu talimatlara göre yamaları 24 saat boyunca üç saatte bir uygulamaya devam etmelisiniz. (Uyku saatlerinde alarm kurun ve yamayı uygulayın.) Unutmayın, bu süre içinde Protokol 1000'i de yapıyorsunuz.

Ü MMS1 yaması cildinizi yakıyorsa, yama yanmayana kadar biraz daha su ekleyerek devam edin, ancak gereğinden fazla su eklemeyin.

Gıda Zehirlenmesi Protokolü (veya Ağızdan Alınan Herhangi Bir Zehir)

CDC'ye (Hastalık Kontrol Merkezleri) göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 5.000'den fazla insan gıda kaynaklı zehirler veya hastalıklardan ölmektedir ve dünya çapında benzer rakamlara sahiptir. Buradaki nokta, gıda zehirlenmesi konusunda ne yapılması gerektiğini bilmek avantajlıdır.

Bir arkadaşım bir keresinde kendimle ve başkalarıyla yemek yerken zehirlendi. Masadan kalktı ve hemen yere yığıldı. Kalkmasına yardım ettim. Bana iyi olduğunu ve tuvalete gitmek istediğini söyledi. Hiçbir şekilde sarhoş değildi. Tuvaleti kullanmak için gitti ve bir dakika sonra onu kontrol ettim ve onu yerde sırtüstü yatarken buldum. Tek dirseği üzerinde doğrulmayı başardı ve bana baktı ve bir şeyler söylemeye çalıştı ama konuşamadı.

Machine Translated by Google

Hızlıca 15 damla MMS1 dozunu karıştırdım (her zaman yanımda küçük şişeler taşımaya çalışırım) ve ona verdim.
Hemen içti. Beş dakika içinde, "Oğlum, bu çılgıncaydı" dedi. Sonra oturdu. Dozu almadan önce her şeyin siyaha döndüğünü söyledi. 10 dakika içinde kendini iyi hissediyordu ve ben de ayağa kalkmasına yardım edebildim. Yeni bir tabak yemek istediği masaya döndük ve o iyiydi.

Bu, MMS1'in bazı zehirleri anında nasıl yok edebileceğinin harika bir örneğidir.

Gıda Zehirlenmesi Protokolünün ilk adımı, Sıtma Protokolü ile aynı hatlar boyunca güzel ve büyük bir MMS1 dozudur. Zehirlenme ile ilk dozda sert vurmak istersiniz. Ancak her zaman hemen temizlenmesini beklemeyin; biraz ısrar etmeniz gerekebilir. Birçok gıda zehirlenmesi vakasına yardım ettik. Her zaman arkadaşımda olduğu kadar hızlı düzelmez, ancak MMS1'in bu gibi durumlarda genellikle başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Her zaman yanınızda iki küçük şişe (MMS ve aktivatör) taşımalısınız. Hazır olun—gıda zehirlenmesinden veya başka türden bir zehirlenmeden şüpheleniyorsanız, vücuda mümkün olduğunca çabuk bir miktar MMS1 alın.

Gıda Zehirlenmesi Protokolü Talimatları

Bir kişi zehirlenmeden şüphelendiğinde:

Aşama 1

q 15 damlalık bir MMS1 (aktive edilmiş MMS) dozu alın. MMS1 dozunun nasıl hazırlanacağını öğrenmek için sayfa 32'ye bakın.

Adım 2

q İlk 15 damla dozdan sonra 15 dakika bekleyin ve ardından 6 damlalık bir MMS1 dozu alın.

Machine Translated by Google

Aşama 3

q 15 dakika daha bekleyin ve 6 damlalık bir doz daha alın, bu üçüncü doz olacaktır. (Bu, 30 dakikalık bir süre içinde, başlangıç noktasından itibaren, kişinin 3 doz MMS alması gerektiği anlamına gelir. İlk ve başlangıç dozu—15 etkinleştirilmiş damla. 2. ve 3. doz—6 etkinleştirilmiş MMS damlası.)

Not: Bu süre zarfında kişi kusmaya kışkırtılırsa - hoş geldiniz, onunla savaşmayın, çünkü bu zehrin vücuttan atılmasına yardımcı olacaktır. MMS1 vücuttaki tüm zehri nötralize ederse kusma meydana gelebilir veya gelmeyebilir. Kusmaya gerek kalmadan dışarı atabilir.

4. Adım

q İlk 3 dozu alırken kusma olmazsa endişelenmeyin. Ancak en az 2 doz daha (4. ve 5. dozlar) alınız; bunlar, 15 dakikalık aralıklarla MMS1, 3 damla doz olmalıdır.

Adım 5

q Normalde yukarıdaki MMS1 miktarı işi halleder, ancak zehirlenme nedeniyle hala çok hastaysanız, daha fazla MMS1 almanız ve kendinizi kusturmanız gerekebilir. Bunu yapmanız gerekiyorsa kendinizi kusturmakta yanlış bir şey yoktur. Zehirlenme durumunda, bazı durumlarda kusma gerekli olabilir, bu nedenle gerekirse tereddüt etmeyin - en iyisi zehri dışarı atmak.

• Kişi, kusturmak için parmağını boğazına sokma şeklindeki eski numarayı kullanmak zorunda kalabilir. Bu, bir acil servise gidip midenizi pompalatmak kadar agresif değildir. Hala ne kadar hasta olduğunuza göre kusma ihtiyacını hesaplayabilirsiniz. Eğer sen

Machine Translated by Google

Hala hastaysanız, biraz mide bulantısı ve ardından muhtemelen kusma, ishal veya baş ağrısı dışında daha fazla MMS1 almanın olumsuz bir tarafı olmadığından, kusmanız ve/veya daha fazla MMS1 almanız gerekebilir.

Not: Zehirlenme ile, rahatsız edici olsa da, kusma ve ishal, toksinleri vücuttan atmanın etkili yollarıdır.

6. Adım

q Yukarıdakilerin hepsini yaptıktan sonra hala çok hastaysanız, midenizi pompalatmanız gerekebilir. Bu durumda tereddüt etmeyin; bir kliniğe git. Bununla birlikte, normalde çoğu zehirlenme koşulunda, yukarıdaki protokolü aldıysanız, bu zamana kadar iyi olacaksınız.

sarsıntı Protokolü

Birçok kişi bir sarsıntının üstesinden gelmek için DMSO'yu kullandı. Spor sahalarının bazı yöneticileri DMSO'yu her zaman el altında tutar. Dünyaca ünlü DMSO araştırma doktoru Dr. Stanley W.

Jacob, tüm sarsıntı vakalarında DMSO'yu önerir.
Diğer sağlık pratisyenleri ve spor yöneticileri de bir sarsıntı tedavisi için DMSO'yu tavsiye ediyor.

Bir sarsıntı genellikle hafif bir travmatik beyin hasarı olarak kabul edilir, ancak beyin sarsıntıları değişen derecelerde ciddiyette meydana gelir. Bazı sarsıntı belirtileri şunlardır:

- Yorgunluk
- Baş ağrısı •
- Uyku Bozuklukları • Baş dönmesi ve dengesizlik • Görme Sorunları/Işığa Aşırı Hassasiyet

Machine Translated by Google

• İşitme ve Gürültü Sorunları • Kas ve Motor Sorunları • Duyusal ve Metabolik Bozukluklar • Kronik Ağrı Sorunları • Cinsel İşlev Bozukluğu • Nöbetler

Birkaç yıldır, bu ikisi birbirini tamamladığı için, protokollerimizin birçoğuna MMS1 ile birlikte DMSO'yu dahil ettim. Beyin sarsıntısı durumunda aşağıdaki acil İnme Protokolünü yapmanızı öneririm.

Strok Protokolü

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 700.000 felç meydana gelir ve bu sayıdan yaklaşık 150.000 ölüm meydana gelir. Yani vuruşlar göz ardı edilecek bir şey değildir. Bir felç geldiğinde, aşağıdaki protokolü izleyin. DMSO ve MMS1'i kullanmak, onu raylarında durdurabilir. Hem DMSO hem de MMS1, beyin de dahil olmak üzere vücuttaki kan pıhtılarını çözecektir. DMSO, 1955'ten beri ABD'de kullanılmaktadır ve birçok kişi, felçlerin üstesinden gelmeye nasıl yardımcı olduğu konusunda tanıklık etmiştir. Benzer şekilde, DMSO ve MMS1, binlerce kişiye daha fazla fayda sağlamak için birlikte kullanılmıştır.

Not: 20 yıldır MMS kullanıyorum. 2012'nin başında, dünya çapında 50.000'den fazla kişiye MMS kullanarak kişisel olarak yardım etmiştim (ve o zamandan beri daha fazla puan aldım, ama sayımı kaybettim). Sadece felç geçiren bir kişiye yardım ettim ve bu başarılı oldu.

Burada verdiğim tavsiye, felç geçiriyor olsaydım ve bana uygun bir hastane olmasaydı kendim ne yapardım.
Eğer bir hastane müsait olsaydı yine de şunu yapardım: Protokole evdeyken başlardım ve ne kadar uzun sürerse sürsün hastaneye giderken devam ederdim.
Hastaneden döndüğümde devam edecektim.

Machine Translated by Google

protokol. Benim düşünceme göre, DMSO ve MMS1 kullanmak, yaşam ve ölüm arasındaki fark veya uzun vadeli yan etkilere sahip olup olmama arasındaki fark anlamına gelebilir. Yine de bu protokolü yapmak veya yapmamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

İnme belirtileri şunlardır:

- Yüz Sarkması–Yüzün bir tarafı sarkıyor mu yoksa uyuşmuş mu? Kişiden gülümsemesini isteyin. Kişinin gülümsemesi düzensiz mi?
- Kol Zayıflığı– Bir kol zayıf mı yoksa uyuşmuş mu? Kişiden iki kolunu da kaldırmasını isteyin. Bir kol aşağı doğru kayıyor mu?
- Konuşma Zorluğu– Konuşma bulanık mı? Kişi konuşamıyor veya anlaşılması zor mu? Kişiden "Çim yeşildir" gibi basit bir cümleyi tekrarlamasını isteyin. Cümle doğru bir şekilde tekrarlandı mı?

Birisi bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa, semptomlar kaybolsa bile, aşağıdaki protokolü başlatmanın veya seçimi buysa kişiyi hemen hastaneye götürmenin zamanı gelmiştir. İlk semptomların ne zaman ortaya çıktığını bilmek için zamanı kontrol edin. Tıbbi yardım almanız durumunda, yine de ilk DMSO dozları ile başlayabilir, ardından aşağıdaki talimatlara göre MMS1 ile devam edebilirsiniz. DMSO ve MMS1'i hemen vücuda almak bir hayat kurtarabilir. Ve bunu yaparsanız, siz hastaneye gidene kadar kişi iyileşebilir. Hastaneye gitmeye karar verilirse, her zaman bir ambulans çağırmak veya başka birinin sürmesini sağlamak en iyisidir. Bir kişi felç geçirirse asla kendini hastaneye götürmeye çalışmamalıdır.

Machine Translated by Google

MMS1 ve DMSO ile İnmenin Üstesinden Gelme Talimatları

Kan pıhtıları felçlere neden olabilir. DMSO kan pıhtılarını çözebilir. MMS1 ayrıca pıhtıları çözmek için de çalışır. DMSO'yu MMS1 ile birlikte kullanmak, hem felçten kurtulmada hem de felçten kaynaklanan hasarı onarmada çok etkili olabilir. Bir kan pıhtısı beynin herhangi bir bölgesine kan akışını engellediğinde, bir felç meydana gelebilir ve beynin o belirli bölgesinin kapanmasına neden olabilir. Ancak kan pıhtısı DMSO ve MMS1 kullanılarak çözülebilirse, oksijen bir kez daha beynin o bölgesine akabilecek ve böylece beynin o bölgesi düzgün çalışmaya başlayabilir.

Aşağıdaki talimatlar bir felç başlangıcında ne yapılması gerektiğini açıklasa da, bir kişi zaten felç geçirmiş olsa ve birkaç saat ila bir veya iki gün sonra olsa bile, yine de başlanıp takip edilebileceğini bilmek önemlidir. ilk günden başlayarak bu talimatlara uyun (1. Gün İnme Protokolü için Dozaj Kılavuzundaki tabloya bakın). Hasarın önlenebileceği veya tersine çevrilebileceği konusunda hala umut var. Bir inmeden sonra aylar veya birkaç yıl geçmesine rağmen, düzenli bir DMSO rejimine MMS1 ile birlikte devam edilirse, hasarın bir kısmını veya tamamını tersine çevirebileceği bildirilmiştir.

DMSO'nun tadı zevkli olmaktan uzaktır. Ancak, onu kullanmanın yararı, kötü tadından çok daha ağır basar. Farmasötik sınıf DMSO'nun neredeyse hiç kokusu veya kötü tadı olmadığı tarif edilmiştir. İnternette ve bazı eczanelerde bulunabilir. Maliyet önemli ölçüde daha yüksektir.

1. Gün—İnmenin Başlangıcında

Aşağıdaki talimatlar çok ayrıntılıdır. yardımcı olması için bu bölümün sonuna bir Dozaj Kılavuzu Tablosu ekledik.

Machine Translated by Google

Bu protokolü takip eden birini kolaylaştırın. Ancak, lütfen köşeleri kesmeyin ve doğrudan tabloya ilerleyin; prosedürü iyi bir şekilde anlamak için aşağıdaki talimatların tümünü baştan sona okuyun.

İlk saat

q Bir vuruşun başlangıcında, ilk önce, 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde seyreltilmiş 2 dolu yemek kaşığı (30 ml) DMSO'yu karıştırın. Hemen iç.
Bu, İnme Protokolünün başlangıç noktasıdır .

q Ayrıca bir felç başlangıcında, Protokol 6 ve 6'ya başlayın. Bu, bir saat arayla alınan iki 6 damlalık aktive edilmiş MMS (MMS1) dozudur. (Protokol 6 ve 6'nın tüm ayrıntıları için sayfa 169'a bakın) MMS1 ve DMSO birbiriyle bağlantılı olarak çalışır, bu nedenle inme için ilk 6 damla MMS1 dozu, ilk dozdan iki dakika sonra alınmalıdır. DMSO. MMS1, ikinci bir 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde karıştırılmalıdır. (DMSO dozundan hemen sonra alınmalıdır, ancak DMSO ile karıştırılmamalıdır). Herhangi bir zamanda iki dakikalık sınırı kaçırırsanız, her zaman devam edin ve üç, beş, on dakika veya daha fazla geçmiş olsa bile dozu alın. İki dakika sınırını kaçırmamaya çalışın.

q Bu protokolün başlangıç noktasından on beş dakika sonra, ikinci doz 2 yemek kaşığı (30 ml) DMSO 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

• Başlangıç noktasından otuz dakika sonra, 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde üçüncü bir 2 yemek kaşığı (30 ml) doz DMSO alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

q Başlangıç noktasından kırk beş dakika sonra, 1/2 fincan dördüncü 2 yemek kaşığı (30 ml) DMSO dozu

Machine Translated by Google

(4 ons/120 ml) alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

İkinci saat

q Bu vuruş protokolüne başladıktan bir saat sonra (ki bu ikinci saatin başlangıcıdır), her 15 dakikada bir DMSO almaya devam edin, dozajı 1/4 fincan (2 ons/60) içinde 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO'ya azaltın. ml) su.

q Ayrıca bu inme protokolünü başlattıktan bir saat sonra , DMSO dozunu aldıktan sonraki iki dakika içinde, 6 damlalık başka bir MMS1 dozu alın. Bu, ilk 6 damlalık dozdan bir saat sonra alınan ikinci 6 damlalık dozdur.
Parça başına bir saat olmak üzere ikiden fazla 6 damla MMS1 dozu almayın.

Üçüncü saat

q Başlangıç noktasından (üçüncü saatin başlangıcı olacak) iki saat sonra başka bir DMSO dozu alın. Üçüncü saatte her 15 dakikada bir 1/4 fincan (2 ons/60 ml) su içinde 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO almaya devam edin.

q Ayrıca başlangıç noktasından iki saat sonra, üçüncü saatin başında Protokol 1000'i almaya başlayın.
Bu, günde sekiz saat boyunca her saat başı 3 damla MMS1 dozudur. Bu 3 damla MMS1 dozu, üçüncü saatin başında ilk DMSO dozunun iki dakikası içinde alınmalıdır.

q Genellikle Protokol 1000'e başlarken kademeli olarak 3 damla doza kadar çalışmayı öneriyorum. İnme Protokolü için saatte 3 damlaya doğru gitmek, kuralın bir istisnasıdır. Bununla birlikte, kişi bir Herxheimer reaksiyonu yaşar ve mide bulantısı hissederse, ishal veya kusarsa,

Machine Translated by Google

MMS1 dozunu yarıya indirin. Gerekirse, bu semptomlar azalıncaya kadar yarı yarıya azaltmaya devam edin. Semptomlar geçtiğinde, kademeli olarak saatte bir 3 damla doza veya Herxheimer reaksiyonuna neden olmadan sizin için rahat olan yüksek bir doza kadar tekrar çalışın. Ancak Protokol 1000'deyken saatte 3 damlayı aşmayın.

Notlar

Ü Unutmayın, bir kişi MMS1 dozunu düşürmeye yönlendirilirse, onu düşürmesi gerekir, ancak tamamen almayı bırakmamalıdır.

Ü Bu noktaya kadar, bu protokoldeki kişi 15 dakikada bir DMSO alarak toplam üç saati tamamlamış olacaktır.

Ü Lütfen dozunuzdaki DMSO miktarını azalttığınızda, karıştırdığınız su miktarını da azaltmanın önemli olduğunu unutmayın.

Dördüncü ila Sekizinci Saat

q Yukarıda açıklanan farklı dozajlarda her 15 dakikada bir DMSO aldıktan sonra ilk üç saat sonra, ilk günün geri kalan kısmı boyunca DMSO almaya devam edin, ancak dozlarınızın sıklığını azaltın. Her saat başı 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO'yu 1/4 fincan (2 ons/60 ml) suya alın. Kişi, saatlik 3 damla MMS1 dozu olan Protokol 1000'i almaya başlamış olmalıdır. Saatlik DMSO dozu ve saatlik MMS1 dozu her zaman (maksimum) arayla iki dakika içinde alınmalıdır.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü MMS1 dozunu DMSO karışımı ile karıştırmayın. Bunu, MMS1 dozuna DMSO damlalarının eklenmesini gerektiren diğer protokollerle karıştırmayın. Bu durumda DMSO'nun dozu diğer protokollere göre çok daha yüksektir, bu nedenle DMSO'nun MMS1 ile aynı dozda karıştırılmaması önerilir. MMS1 dozunu , DMSO dozundan sonra iki dakikadan daha kısa bir süre içinde alın, ancak aynı su bardağında değil, ayrı olarak.

Ü Burada felç başlangıcında "birinci gün" yapılması gerekenlerden bahsettik. Bununla birlikte, herhangi bir zamanda bir felç gelebilir ve örneğin akşam bir felç geldiğini hissederseniz, örneğin yukarıda belirtilen dozu geceye kadar takip etmek akıllıca olacaktır. Başka bir deyişle, felçler insanları uykularında etkileyebileceğinden, dozlarınızı almak için ayakta kalın veya gerekirse bir alarm kurun.

2. Gün ile 7. Gün

q İnmeden sonraki ikinci gün ve yukarıdaki birinci gün için prosedür uygulandıktan sonra, Protokol 1000'e göre MMS1 almaya devam edin. Bu, art arda sekiz saat boyunca her saat başı 3 damla MMS1 dozu almaktır. Önlem olarak, kişi kendini daha iyi hissetmeye başlasa bile, önerilen üç tam hafta Protokol 1000'i tamamlamayı öneriyorum.

q İnmeden sonraki ikinci gün, DMSO alımı sabah 1 yemek kaşığı (15 ml) ve akşam 1 yemek kaşığı (15 ml)'ye düşürülebilir. Bu miktarda DMSO 1/4 fincan (2 ons/60 ml) suya alınmalıdır. Bu DMSO dozajları, MMS1 dozajı ile koordineli olarak alınmalıdır. Biri Protokol 1000'de olmalıdır, bu yüzden DMSO dozunu günün ilk MMS1 dozundan ve günün son MMS1 dozundan sonraki iki dakika içinde almalarını öneririm.

Machine Translated by Google

8. Gün - 21

q 21 günlük süreyi tamamlayana kadar Protokol 1000'e devam edin.
dönem.

q Kalan 21 gün boyunca günde sadece 1 kez (MMS1 dozlarınızdan
birinin iki dakikası içinde) 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO alarak
DMSO alımınızı azaltın.

q İyileşmenizde ilerleme kaydetmediğinizi düşünüyorsanız, İnme
Protokolünün ilk gününe geri dönmenizi ve yukarıda belirtildiği
gibi tüm sürece yeniden başlamanızı öneririm. Başka bir deyişle,
baştan başlayın ve 21 günü tamamlayana kadar tekrar devam
edin.

Notlar

Ü Bir inme geçirmiş ve tamamen iyileşmişse, yine de günlük idame dozu MMS1 (6-damla doz) ve 1/4 fincan (2 ons/60ml) su içinde 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO öneriyorum. Herhangi bir zamanda felç belirtileri tekrar ortaya çıkarsa, yukarıda özetlenen tüm prosedür izlenmelidir.

Ü İyileştirme için yer olup olmadığını görmek için diyet ve egzersiz alışkanlıklarınıza bir göz atın.

Ü Ne yazık ki, felçten tam olarak kurtulma garantisi yoktur. Ancak birçok kişi DMSO kullanarak felçten kurtuldu ve MMS1 de bu alanda yardımcı oldu.

Aşağıda, bu protokol boyunca size rehberlik edecek iki çizelge bulunmaktadır. Gerektiğinde 00:00 saatini hemen başlatmanız ve başlangıç noktanızdan itibaren 15 dakikalık aralıklarla devam etmeniz önemlidir (örneğin, saat 12:20'de bir felç gelirse, hemen DMSO ve MMS1 almaya başlayın, 15 dakika sonra 12 olacaktır. :35 pm ve benzeri).

Machine Translated by Google

İnme Protokolü 1. Gün için Dozaj Rehberi				
Gerektiğinde hemen 00:00 saatini başlatmak, gerçek zamandan bağımsız olarak. Beklemeyin.				
Adım	Saat	Saat/ Min.	MMS1	DMSO/ su
1	Başlangıç Saati 1	00:00	6 Damla	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
2		00:15	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
3		00:30	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
4		00:45	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
5	2. saat	01:00	6 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
6		01:15	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
7		01:30	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
8		01:45	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
9	3. Saat	02:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
10		02:15	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
11		02:30	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
12		02:45	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
13	4. saat	03:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
14	5. saat	04:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
15	6. Saat	05:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
16	7. Saat	06:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
17	saat 8	07:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)

Machine Translated by Google

İnme Protokolü için Dozaj Rehberi
2. Gün – 7.

Adım	Saat	Saat/ Min.	MMS1	DMSO/ su
1	Başlangıç Saati 1	00:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
2	2. saat	01:00	3 Damla	0
3	3. Saat	02:00	3 Damla	0
4	4. saat	03:00	3 Damla	0
5	5. saat	04:00	3 Damla	0
6	6. Saat	05:00	3 Damla	0
7	7. Saat	06:00	3 Damla	0
8	saat 8	07:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)

8. Gün – 21

l 21 günlük süreyi tamamlayana kadar Protokol 1000 ile devam edin.
l DMSO dozunuzu 2 yemek kaşığından (30 ml) 1'e düşürün.
Kalan 21 gün boyunca günlük yemek kaşığı (15 ml) DMSO.
l İlerleme kaydedemiyorsanız 1. Gün'e dönün. Tüm süreci başlatın.
yeniden.
l Ayrıntılar için 227. sayfadaki tam protokole bakın.

Kalp Krizi Protokolü

ABD'de her biri yaklaşık 600.000 kalp krizi ölümü meydana geliyor
yıl. Bir kalp krizi geldiğinde, aşağıdaki
Aşağıdaki birleşik DMSO/MMS1 protokolü, onu durdurabilir
izler. DMSO, 1955'ten beri ABD'de kullanılmaktadır ve
nasıl yardımcı olduğuna dair birçok tanıklık var.
kalp krizlerinin üstesinden gelmek. Ayrıca MMS1 kullanılmıştır.
2000 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde ve DMSO ve MMS1
tarafından artan bir fayda için her ikisi birlikte kullanılmıştır.
binlerce.

Machine Translated by Google

Not: 20 yıldır MMS kullanıyorum. 2012'nin başında, dünya çapında 50.000'den fazla kişiye MMS kullanarak kişisel olarak yardım etmiştim (ve o zamandan beri daha fazla puan aldım, ama sayımı kaybettim). Kalp krizi geçiren sadece üç kişiye yardım ettim, her vaka başarılı oldu. Burada verdiğim tavsiye, kalp krizi geçiriyor olsaydım ve hastane bana müsait olmasaydı ne yapardım. Bir hastane müsait olsaydı, yine de şunu yapardım: Protokole hala evdeyken başlardım ve ne kadar uzun sürerse sürsün hastaneye giderken yapmaya devam ederdim. Hastaneden döndüğümde protokole devam edecektim. Benim düşünceme göre, DMSO ve MMS1 kullanmak, yaşam ve ölüm arasındaki fark veya uzun vadeli yan etkilere sahip olup olmama arasındaki fark anlamına gelebilir. Yine de bu protokolü yapmak veya yapmamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Kalp krizi belirtileri göğüste, kollarda (özellikle solda), sırtta, boyunda, çenede ve üst midede ağrıdır; ve nefes darlığı, mide bulantısı, baş dönmesi ve soğuk terleme.

Bir kalp krizinin yaklaştığından şüpheleniyorsa, protokollere başlamanın veya seçimleri buysa kişiyi hemen hastaneye götürmenin zamanı geldi. İlk semptomların ne zaman ortaya çıktığını bilmek için zamanı kontrol edin. Tıbbi yardım almanız durumunda, yine de ilk doz DMSO ile başlayabilir, ardından aşağıdaki talimatlara göre MMS1 uygulayabilirsiniz.
DMSO ve MMS1'i hemen vücuda almak bir hayat kurtarabilir. Ve bunu yaparsanız, siz hastaneye gidene kadar kişi iyileşebilir. Hastaneye gitmeye karar verilirse, her zaman bir ambulans çağırmak veya başka birinin sürmesini sağlamak en iyisidir. Bir kişi kalp krizi geçirirse asla kendini hastaneye götürmeye çalışmamalıdır.

Machine Translated by Google

Kalp Krizinin üstesinden gelmek için talimatlar MMS1 ve DMSO

Aşağıdaki talimatlar kalp krizinin başlangıcında ne yapılması gerektiğini açıklasa da, bir kişi zaten kalp krizi geçirmiş olsa ve birkaç saat ila bir veya iki gün sonra olsa bile, yine de başlayabileceğinizi bilmek önemlidir. ve birinci günden başlayarak bu talimatları uygulayın (Kalp Krizi Protokolü 1. Gün Dozaj Rehberi, sayfa 244'teki tabloya bakın). Hasarın önlenebileceği veya tersine çevrilebileceği konusunda hala umut var. MMS1 ile birlikte düzenli bir DMSO alma rejimine geçilirse, hasarın bir kısmını veya tamamını tersine çevirebilir.

DMSO'nun tadı zevkli olmaktan uzaktır. Ancak, onu kullanmanın yararı, kötü tadından çok daha ağır basar. Farmasötik sınıf DMSO'nun neredeyse hiç kokusu veya kötü tadı olmadığı tarif edilmiştir. İnternette ve bazı eczanelerde bulunabilir. Maliyet önemli ölçüde daha yüksektir.

1. Gün—Kalp Krizinin Başlangıcında

Aşağıdaki talimatlar çok ayrıntılıdır. Bu protokolü takip etmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bu bölümün sonuna bir Dozaj Rehberi Tablosu ekledik. Ancak, lütfen kısa kesmeyin ve doğrudan tabloya ilerleyin, prosedürü iyi anlamak için aşağıdaki talimatların tümünü baştan sona okuyun.

İlk saat

q Kalp krizinin başlangıcında, ilk olarak, 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde seyreltilmiş 2 dolu yemek kaşığı (30 ml) DMSO'yu karıştırın. Hemen iç.
Bu, Kalp Krizi Protokolünün başlangıç noktasıdır .

Machine Translated by Google

q Ayrıca bir kalp krizinin başlangıcında, Protokol 6 ve 6'ya başlayın. Bu, bir saat arayla alınan iki 6 damlalık aktive edilmiş MMS (MMS1) dozudur. (Protokol 6 ve 6'nın tüm ayrıntıları için sayfa 169'a bakın) MMS1 ve DMSO birbiriyle bağlantılı olarak çalışır, bu nedenle kalp krizi için ilk 6 damla MMS1 dozu, ilk dozdan iki dakika sonra alınmalıdır. DMSO'nun.

MMS1, ikinci bir 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde karıştırılmalıdır. (DMSO dozundan hemen sonra alınmalıdır, ancak DMSO ile karıştırmayın.) Herhangi bir zamanda iki dakikalık limiti kaçırırsanız, her zaman devam edin ve üç, beş, on dakika veya daha fazla olsa bile dozu alın. Geçti. İki dakika sınırını kaçırmamaya çalışın.

q Bu protokolün başlangıç noktasından on beş dakika sonra, ikinci doz 2 yemek kaşığı (30 ml) DMSO 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

• Başlangıç noktasından otuz dakika sonra, 1/2 fincan (4 ons/120 ml) su içinde üçüncü bir 2 yemek kaşığı (30 ml) doz DMSO alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

• Başlangıç noktasından kırk beş dakika sonra, 1/2 fincan (4 ons/120 ml) içinde dördüncü 2 yemek kaşığı (30 ml) DMSO dozu alınmalıdır. Şu anda MMS1 alınmaz.

İkinci saat

q Bu kalp krizi protokolünü başlattıktan bir saat sonra (ki bu ikinci saatin başlangıcıdır), her 15 dakikada bir DMSO almaya devam edin, ancak dozajı 1/4 fincan (2 ons) içinde 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO'ya düşürün. /60 ml) su.

Machine Translated by Google

q Ayrıca bu kalp krizi protokolünü başlattıktan bir saat sonra , DMSO dozunu aldıktan sonraki iki dakika içinde, 6 damlalık bir MMS1 dozu daha alın. Bu, ilk 6 damlalık dozdan bir saat sonra alınan ikinci 6 damlalık dozdur. Parça başına bir saat olmak üzere ikiden fazla 6 damla MMS1 dozu almayın.

Üçüncü saat

q Başlangıç noktasından (üçüncü saatin başlangıcı olacak) iki saat sonra başka bir DMSO dozu alın. Üçüncü saatte her 15 dakikada bir 1/4 fincan (2 ons/60 ml) su içinde 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO almaya devam edin.

q Ayrıca başlangıç noktasından iki saat sonra, üçüncü saatin başında Protokol 1000'i almaya başlayın.
Bu, günde sekiz saat boyunca her saat başı 3 damla MMS1 dozudur. Bu 3 damla MMS1 dozu, üçüncü saatin başında ilk DMSO dozunun iki dakikası içinde alınmalıdır.

q Genellikle Protokol 1000'e başlarken kademeli olarak 3 damla doza kadar çalışmayı öneriyorum. Kalp Protokolü için saatte 3 damlaya doğru gitmek, kuralın bir istisnasıdır. Bununla birlikte, kişi bir Herxheimer reaksiyonu yaşar ve mide bulantısı hissederse, ishal veya kusarsa, MMS1 dozunu yarıya indirin. Gerekirse, bu semptomlar azalıncaya kadar yarı yarıya azaltmaya devam edin. Semptomlar geçtiğinde, kademeli olarak saatte bir 3 damla doza veya Herxheimer reaksiyonuna neden olmadan sizin için rahat olan yüksek bir doza kadar tekrar çalışın. Ancak Protokol 1000'deyken saatte 3 damlayı aşmayın.

Machine Translated by Google

Notlar

Ü Unutmayın, bir kişi MMS1 dozunu düşürmeye yönlendirilirse, onu düşürmesi gerekir, ancak tamamen almayı bırakmamalıdır.

Ü Bu noktaya kadar, bu protokoldeki kişi 15 dakikada bir DMSO alarak toplam üç saati tamamlamış olacaktır.

Ü Lütfen dozunuzdaki DMSO miktarını azalttığınızda, karıştırdığınız su miktarını da azaltmanın önemli olduğunu unutmayın.

Dördüncü ila Sekizinci Saat

q Yukarıda açıklanan farklı dozajlarda her 15 dakikada bir DMSO aldıktan sonra ilk üç saat sonra, ilk günün geri kalan kısmı boyunca DMSO almaya devam edin, ancak dozlarınızın sıklığını azaltın. Her saat başı 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO'yu 1/4 fincan (2 ons/60 ml) suya alın. Kişi, saatlik 3 damla MMS1 dozu olan Protokol 1000'i almaya başlamış olmalıdır. Saatlik DMSO dozu ve saatlik MMS1 dozu her zaman (maksimum) arayla iki dakika içinde alınmalıdır.

Notlar

Ü MMS1 dozunu DMSO karışımı ile karıştırmayın. Bunu, MMS1 dozuna DMSO damlalarının eklenmesini gerektiren diğer protokollerle karıştırmayın. Bu durumda DMSO'nun dozu diğer protokollere göre çok daha yüksektir, bu nedenle DMSO'nun MMS1 ile aynı dozda karıştırılmaması önerilir. MMS1 dozunu , DMSO dozundan sonra iki dakikadan daha kısa bir süre içinde alın, ancak aynı su bardağında değil, ayrı olarak.

Machine Translated by Google

Ü Kalp krizi başladığında “birinci gün” yapılması gerekenlerden burada bahsettik. Bununla birlikte, kalp krizi her an gelebilir ve örneğin akşam bir kalp krizinin geldiğini hissederseniz, geceye kadar yukarıda belirtilen dozu takip etmek akıllıca olacaktır. Başka bir deyişle, kalp krizi insanları uykularında etkileyebileceğinden, dozlarınızı almak için ayakta kalın veya gerekirse alarm kurun.

2. Gün ile 7. Gün

q Kalp krizinden sonraki ikinci gün ve yukarıdaki birinci gün için prosedür uygulandıktan sonra, Protokol 1000'e göre MMS1 almaya devam edin. Bu, art arda sekiz saat boyunca her saat başı 3 damla MMS1 dozu almaktır. Önlem olarak, kişi kendini daha iyi hissetmeye başlasa bile, önerilen üç tam hafta Protokol 1000'i tamamlamayı öneriyorum.

q Kalp krizinden sonraki ikinci gün, DMSO alımı sabah 1 yemek kaşığı (15 ml) ve akşam 1 yemek kaşığı (15 ml) azaltılabilir. Bu miktarda DMSO 1/4 fincan (2 ons/60 ml) suya alınmalıdır. Bu DMSO dozajları, MMS1 dozajı ile koordineli olarak alınmalıdır. Biri Protokol 1000'de olmalıdır, bu yüzden DMSO dozunu günün ilk MMS1 dozundan ve günün son MMS1 dozundan sonraki iki dakika içinde almalarını öneririm.

8. Gün - 21

q 21 günlük süreyi tamamlayana kadar Protokol 1000'e devam edin. dönem.

q Kalan 21 gün boyunca günde sadece 1 kez (MMS1 dozlarınızdan birinin iki dakikası içinde) 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO alarak DMSO alımınızı azaltın.

Machine Translated by Google

q İyileşme sürecinizde ilerleme kaydetmediğinizi düşünüyorsanız, Kalp Krizi Protokolünün ilk gününe geri dönmenizi ve yukarıda belirtildiği gibi tüm sürece yeniden başlamanızı öneririm. Başka bir deyişle, baştan başlayın ve 21 günü tamamlayana kadar tekrar devam edin.

Notlar

Ü Kalp krizi geçirmiş ve tamamen iyileşmişse, yine de günlük idame dozu MMS1 (6-damla doz) ve 1 yemek kaşığı (15 ml) DMSO'yu 1/4 fincan (2 ons/60ml) su içinde tavsiye ederim. . Herhangi bir zamanda kalp krizi belirtileri tekrar ortaya çıkarsa, yukarıda özetlenen prosedürün tamamı izlenmelidir.

Ü İyileştirme için yer olup olmadığını görmek için diyet ve egzersiz alışkanlıklarınıza bir göz atın.

Ü Ne yazık ki, kalp krizinden iyileşme garantisi yoktur, ancak binlerce kişi DMSO kullanarak kalp krizinden kurtulmuştur ve MMS1 de bu alanda yardımcı olmuştur.

Aşağıda, bu protokol boyunca size rehberlik edecek iki çizelge bulunmaktadır. Gerektiğinde saat 00:00'a hemen başlamanız ve başlangıç noktanızdan itibaren 15 dakikalık aralıklarla devam etmeniz önemlidir (örneğin, saat 12:20'de bir kalp krizi olursa, hemen DMSO ve MMS1 almaya başlayın, ardından 15 dakika sonra 12:35 vb.).

Machine Translated by Google

Kalp Krizi Protokolü 1. Gün için Dozaj Rehberi

Gerektiğinde hemen 00:00 saatini başlatmak,
gerçek zamandan bağımsız olarak. Beklemeyin.

Adım	Saat	Saat/ Min.	MMS1	DMSO/ su
1	Başlangıç Saati 1	00:00	6 Damla	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
2		00:15	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
3		00:30	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
4		00:45	0	2 yemek kaşığı (30 ml) 4 oz (120 ml)
5	2. saat	01:00	6 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
6		01:15	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
7		01:30	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
8		01:45	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
9	3. Saat	02:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
10		02:15	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
11		02:30	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
12		02:45	0	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
13	4. saat	03:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
14	5. saat	04:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
15	6. Saat	05:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
16	7. Saat	06:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
17	saat 8	07:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)

Machine Translated by Google

Kalp Krizi Protokolü için Dozaj Rehberi
2. Gün – 7.

Adım	Saat	Saat/ Min.	MMS1	DMSO/ su
1	Başlangıç Saati 1	00:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)
2	2. saat	01:00	3 Damla	0
3	3. Saat	02:00	3 Damla	0
4	4. saat	03:00	3 Damla	0
5	5. saat	04:00	3 Damla	0
6	6. Saat	05:00	3 Damla	0
7	7. Saat	06:00	3 Damla	0
8	saat 8	07:00	3 Damla	1 yemek kaşığı (15 ml) 2 oz (60 ml)

8. Gün – 21

- 21 günlük süreyi tamamlayana kadar Protokol 1000 ile devam edin.
- DMSO dozunuzu 2 yemek kaşığından (30 ml) 1'e düşürün.
  Kalan 21 gün boyunca günlük yemek kaşığı (15 ml) DMSO.
- İlerleme kaydedemiyorsanız 1. Gün'e dönün. Tüm süreci başlatın.
  yeniden.
- Ayrıntılar için 236. sayfadaki tam protokole bakın.

Yakma Protokolü

Yanıklar ciltte ve dokularda asit oluşmasına neden olur
hangileri yakıldı. Etkinleştirilmemiş MMS (%22.4'lük çözüm
sudaki sodyum klorit) oldukça alkali ve alkalidir
su asidi iptal eder, bu nedenle aktif olmayan MMS'i yanık
üzerine hafifçe sürttüğünüzde asidin çoğu nötralize olur
bu acının çoğunu ortadan kaldıracak. Yanıktaki asit
MMS'deki sodyum kloritin bir kısmını aktive edebilir,
böylece bazı yanık zehirlerini oksitler ve ayrıca azaltır
acı. Normalde ağrı anında veya birkaç dakika içinde geçer.
dakika, etkinleştirilmemiş MMS kullanırken , ancak bazen açık

Machine Translated by Google

çok kötü yanıklar daha uzun sürebilir. Etkinleştirilmemiş MMS kullanıldığında yanıkların iyileşme süresi normalden 4 kata kadar daha hızlı olabilir. Birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıklar için aşağıdaki protokol kullanılabilir.

Lütfen bu protokolün, MMS'yi gıda sınıfı bir asitle etkinleştirme kuralının bir istisnası olduğunu unutmayın. Etkinleştirilmemiş MMS'i çok küçük bir miktarda, doğrudan sivrisinek ısırığı ve diğer bazı böcek ısırıkları üzerinde kullanmanızı öneririm (bkz. sayfa 196, 206-208). Aynı şekilde yanıklar için etkinleştirilmemiş MMS kullanmanızı öneririm (miktar yanık boyutuna bağlıdır). Yanık için etkinleştirilmemiş MMS kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki açık talimatları izleyin. Genel olarak, bu kitaptaki diğer tüm protokoller için, MMS'i gıda sınıfı bir asitle etkinleştirmenizi ve ardından kullanımdan önce belirtilen miktarda su eklemenizi öneririz.

Yakma Talimatları—Etkinleştirilmemiş MMS Kullanma

Aşama 1

q Vücudun herhangi bir yerinde yanık olması durumunda, hemen veya mümkün olan en kısa sürede, yanık bölgeye bol miktarda aktif olmayan MMS koyun. (Yüzde yanık varsa, gözlerden uzak durmaya özen gösterin.) Yanmamış ciltte biraz aktif olmayan MMS'in oluşması konusunda endişelenmeyin. (Aşağıya bakın: Beş dakika içinde yıkayacaksınız.)

q Parmak uçlarınızla MMS'i doğrudan yanığa hafifçe ovalayın (yanığa zar zor dokunarak, ancak temas ettiğinden emin olmak için yeterli). Ağrı hemen azalmaya başlayacaktır.

Adım 2

q Etkinleştirilmemiş MMS'in cildinizde beş dakikadan fazla kalmasına izin vermeyin! Temiz, soğuk veya soğuk su ile durulanmalıdır. unutursan ve

Machine Translated by Google

MMS'in yanık üzerinde kalmasına izin verin, yanmayı şiddetlendirecek ve iyileşme normalden daha uzun sürecektir.

Aşama 3

q Yanığın şiddetine bağlı olarak ağrı normalde beş dakika içinde duracaktır. Beş dakikanın sonunda ağrı tamamen geçmemişse, ikinci bir miktar etkinleştirilmemiş MMS uygulayabilirsiniz, ancak yalnızca ilk uygulamayı duruladıktan sonra. Yukarıdaki Adım 1 ve 2'de özetlenen prosedürü tam olarak izleyin.

Notlar

Ü Şiddetli yanıklarda 2 defa aktive edilmemiş MMS uyguladıysanız ve ağrı devam ediyorsa iki saate kadar yarım saatte bir aktive edilmemiş MMS uygulayabilirsiniz. (Ancak, her uygulamanın beş dakika sonra durulanması gerektiğini unutmayın.)

Ü Bu iki saatlik sürenin ardından ağrı hala devam ediyorsa, aktif olmayan MMS'i bu sefer birer saat arayla iki kez daha uygulayabilirsiniz. Bu uygulamaların her biri yukarıdaki Adım 1 ve 2'ye göre yapılmalıdır.

Ü Genel olarak ağrı dört saat içinde geçecektir, ancak geçmezse Adım 1 ve 2'de belirtilen işleme dört saatte bir devam edebilirsiniz.

Ü Ağrı azaldıktan sonra, taze Aloe vera'ya erişiminiz varsa, bu yanıkların iyileşmesine yardımcı olabilir. Taze bitkinin bir yaprağını (uzunlamasına) dilimleyin ve taze jeli yanık bölgesine uygulayın. Bu, gerektiği kadar sık tekrarlanabilir.

Dikkat! Unutmayın, aktif olmayan MMS'i cildinizde asla beş dakikadan fazla bırakmayın, daima soğuk suyla durulayın.

Machine Translated by Google

Güneş Yanığı için Talimatlar—Etkinleştirilmemiş MMS Kullanma

Aşama 1

q Şiddetli veya çok hafif güneş yanığı durumunda, etkinleştirilmemiş MMS'i doğrudan yanmış alana püskürtmek en iyisidir.

q Püskürtmeden sonra, etkinleştirilmemiş MMS'i yanmış cilt üzerine çok nazikçe ovalayın.

Adım 2

q MMS'i beş dakika veya daha kısa sürede temiz soğuk veya soğuk suyla duruladığınızdan emin olun. Ciltte beş dakikadan fazla kalmasına izin vermeyin, aksi takdirde cildinizin soyulmasına neden olur.

Aşama 3

q Güneş yanığı ile, birkaç saat sonra biraz ağrı başlayabilir, bu durumda etkinleştirilmemiş MMS'i tekrar uygulayın, ancak beş dakikadan uzun sürmeyin, ardından temiz, soğuk veya soğuk suyla durulayın.

Notlar

Ü Güneş yanığı daha çok cilt yüzeyinde olduğu için diğer yanıklardan farklıdır, bu nedenle farklı tedavi edilir. Aktif olmayan MMS'i güneş yanığına toplamda 5 defadan ve saatte birden fazla uygulamayın. Cildinizde beş dakikadan fazla kalmasına asla izin vermeyin.

Ü Genel olarak güneş yanığı bir saate kadar bir gün içinde geçer.

Machine Translated by Google

Protokolü Yaşamak için Bir Hafta

Doktor sadece bir veya iki hafta ömrün kaldığını söylüyorsa, MMS'i denemeye değer derim. Neden?
Tıp bilimi işe yaramadı ve kaybedecek bir şey kalmadı. Doktorlara göre sadece bir ya da iki haftaları kalmışken, pek çok kişiden ölüme yakın bir yerden dirildiklerini belirten e-postalar aldım. Hayatta hiçbir garanti yoktur. Ama ne kendinizden ne de bir başkasından vazgeçmeyin. Bir kişinin yalnızca bir saati kalsa bile, vücuda biraz MMS alın.

Bir kişinin yaşamak için bir ila iki haftası varsa, HRP'yi aşağıdaki gibi hızlı bir şekilde izlemenizi öneririm:

Başlatma Prosedürü

Başlatma Prosedürüne başlayın, ancak bu durumda tüm durakları kaldırın. Başlatma Prosedürünü son derece hızlı bir şekilde takip edin—bunu bir günde yapın, her adımı gözden geçirin.

q İki saat boyunca 1/4 damlalık bir doz alın.

Sonraki iki saat boyunca 1/2 damla dozu artırın.

Sonraki iki saat boyunca 3/4 damla dozuna yükseltin.

q Son olarak, iki saat daha 1 damla dozu artırın.

Notlar

Ü Bu, MMS1 almak için toplam sekiz saattir ve bu süre zarfında alımı 1/4 damladan 1 damlaya çıkarır.

Ü Bu işlem sırasında herhangi bir zamanda ek bir hastalık hissi yaşarsanız, dozu son dozunuzun 1/2 oranında azaltın. Örneğin, 1/2 damlalık bir doz kendinizi hasta hissetmenize neden oluyorsa, tekrar 1/4 damlaya kadar kesin. Başlamak

Machine Translated by Google

vücudunuzun daha fazla tolere edebildiğini hissettiğinizde damlaları tekrar artırın. Bu durumda, Başlangıç Prosedürünü tamamlamak bir günden uzun sürebilir.
Vücudun nasıl tepki verdiğine dikkat edin ve dozu buna göre ayarlayın.

Protokol 1000, 1000 Plus ve 2000

Başlangıç Prosedürünü hızlı bir şekilde izledikten sonra, fikir, Protokol 1000'e geçmek ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Protokol 1000 Plus'a ve Protokol 2000'e geçmektir, ancak kendinizi hastalığınızdan daha kötü hissetmenize izin vermeden zaten kendinizi hissettiriyor. .

q Yukarıda özetlenen hızlı Başlangıç Prosedürünü tamamladıktan sonra, Protokol 1000'e geçin. İlk saat 1 damlalık bir dozla başlayın ve 3 damlaya ulaşana kadar vücudunuzun tolere edebileceğine göre damlaları her dozda artırın. doz başına.

3 damlalık bir doza ulaştığınızda, her şey yolunda gidiyorsa ve herhangi bir ek hastalık yaşamıyorsanız, üç ila dört 3 damlalık MMS1 dozundan sonra dozlarınıza DMSO eklemeye başlayabilirsiniz (Protokol 1000 Plus uyarınca Talimatlar).

q DMSO eklenmiş 2 ila 3 doz MMS1 aldıktan sonra, vücudunuzun kaldırabileceği kadar hızlı bir şekilde Protokol 2000'e geçin. Bu, vücudunuzun tolere edebileceğine göre her saatlik dozda MMS1 damlası ve DMSO miktarını artırmaya devam etmek anlamına gelir. (DMSO'nun MMS1'e oranı, her 1 damla MMS1'e 3 damla DMSO'dur.) Eğer DMSO'nuz yoksa bunun sizi durdurmasına izin vermeyin, her saat başı MMS1 damlalarını artırmaya devam edin.

Machine Translated by Google

q MMS1 ve DMSO düşüşlerini iki gün artırdıktan sonra, yine her şey yolunda gidiyorsa, Protokol 2000'deki talimatlara göre MMS2'yi ekleyin.

q Bu işlem sırasında herhangi bir zamanda, ek bir hastalık yaşarsanız, dozu son dozunuzun 1/2 oranında azaltın. Vücudunuzun daha fazlasını tolere edebildiğini hissettiğinizde damlaları tekrar artırmaya başlayın.
Halihazırda hissettiğinizden daha kötü hissetmeden tahammül edebileceğiniz doğru miktarda damlayı bulmak istiyorsunuz.

Notlar

Ü MMS'in Altın Kurallarını hatırlayın (bkz. sayfa 83-84), özellikle de her gelişme gördüğünüzde hiçbir şeyi değiştirmez diyen kuralı; yaptığın şeye devam et. Bu protokol hızlı ilerlemeyi önerse de, yine de iyileşiyorsanız, yaptığınız şeye bağlı kalın. Gelişmekte olduğunuz sürece, hangi noktada olursanız olun, o MMS1, DSMO ve MMS2 dozajında kalın - dozaj ne olursa olsun gelişmeyi sağlarsa, yapmaya devam edin. Bir veya iki günlük bir süre boyunca herhangi bir iyileşme görmediğiniz bir noktaya geldiğinizde, bir sonraki seviyeye geçerek alımınızı artırın.

Ü Bu süre zarfında vitamin veya takviye almayınız.
Hastalık patojenleri yok edilene kadar bekleyin, ardından beslenmenizi geliştirmeye çalışabilirsiniz.

Protokol 3000

q Halihazırda iyileşme göstermiyorsanız, yukarıda bahsedilen oral dozları alırken mümkün olan en kısa sürede Protokol 3000'i ekleyebilirsiniz, bu durumda Protokol 3000'e gitmek gerekli değildir.

Machine Translated by Google

q Ancak bir ila iki günlük bir süre için herhangi bir gelişme görmezseniz, halihazırda yaptığınız şeye Protokol 3000'i ekleyin.

Destekleyici Protokoller

q Destekleyici Protokollerden herhangi birini birer birer ekleyin, özellikle de hastalığınıza yardımcı olmaya uygunsa. Örneğin, sorun kolon kanseriyse, lavman ekleyin. Sorun yumurtalık kanseri ise, duş ekleyin. Sorun cilt kanseriyse, sprey şişesini vb. kullanın.

q Yardım ediyor gibi görünüyorlarsa Destek Protokolleri ile devam edin, ancak yardım etmiyor gibi göründüklerinde geri çekilin.

Bilinçsiz veya Yutamıyor

Bilinci yerinde olmayan veya yutamayan birine MMS vermeyin. MMS'i IV damla yoluyla uygulamak mümkündür. Kalifiye bir kişi prosedürü denetlemiyorsa, bunu veya aşağıdaki tüp yöntemini önermiyorum. IV damla için 250 ml'lik bir torba IV salin veya glikoz solüsyonu kullanın. Çözeltiye 20 damla aktif MMS koyun. Damlamayı, bir saatlik bir süre boyunca vücuda girecek şekilde düzenleyin. Bu, günde birkaç kez tekrarlanabilir, ancak diğer uygulanabilir destekleyici ve ek protokoller de kullanılmalıdır.

Kişinin beslenme tüpü varsa, ona tüpten MMS dozları verebilirsiniz. Uygun MMS1 dozunu (kişinin kullandığı protokole göre) karıştırın ve dozu tüpe dökün. Bu saatlik olarak yapılabilir. Bu protokolde yukarıda belirtildiği gibi Başlatma Prosedürünü izleyin ve talimat verildiği şekilde diğer protokollere devam edin.

Machine Translated by Google

Duruma bağlı olarak, bilinci yerinde olmayan veya yutkunamayan biri durumunda, MMS'i vücuda almanın başka yolları da vardır: Protokol 3000 (DMSO ve MMS1'in harici uygulaması). Torba Protokolü, bilinci yerindeyse ancak yutkunma sorunu varsa başka bir seçenektir. Torbayı kullanıyorsanız, kişinin gaza nefes alamadığından kesinlikle emin olun, bu zarar verebilir. Koşullara bağlı olarak MMS banyosu da yapılabilir. (Kişi küvete giremiyorsa ayak banyosu da yardımcı olabilir.) Hasta olan sizseniz, size yardım edecek birine, tercihen MMS konusunda bilgili birine ihtiyacınız olacaktır. Ancak herhangi bir nedenle o kişi müsait değilse, size yardımcı olabileceğinden emin olduğunuz birini işe alın ve bu kitabı okumasını sağlayın.

MMS Savunucusu: Kesinlikle, ben MMS'in devasa, büyük bir savunucusuyum. 30 yıl boyunca doktor bakımı altında yoğun bir şekilde acı çektim ve neredeyse iki kez beni öldürüyorlardı çünkü dürüst olmak gerekirse ne yapacaklarına dair hiçbir fikirleri yoktu ve yirmi yıl boyunca antidepresanlardan beta blokerlere ve metadonlara kadar yaklaşık 15 farklı reçeteyi zorladılar. , dikkatsizlikleri ve dikkatsizlikleri yüzünden organlarımı kaybettim. [Yapabilseydim] tüm lisanslarını, bana sağlık hizmeti verdiği varsayılan 80 doktorun hepsini elinden alırdım. Yani, MMS, en ufak bir soğuk algınlığı bile alırsam ve öksürükten titremeye ve titremeden idrar enfeksiyonuna (uva uva ile birlikte) vücutta tanınan enfeksiyon türlerini alırsam, şu anda aldığım tek şey oldukça iyi. idrar... vücudunuzu tedavi etmenin en iyi ve en ucuz, verimli ve etkili yoludur. 2 yıldır doktora gitmiyorum! —Mel,

Machine Translated by Google

AIDS: Birkaç yıl önce tam gelişmiş olgun bir kadın
Kilisemize dua için AIDS getirildi. papazım sordu
ona yardım etmem için. Zaten almayı reddettiği için
kendi isteğiyle anti retroviral ilaç, onu koydum
Protokol 1000. Ona yumuşak zıplamalı mini trampo ipimi de
verdim. Kendi başına yürüyemediği için talimat verdim.
akrabalarının trambolinde ona yardım etmesi için
kendi kendine zıplayabilir. Ayrıca birkaç şifası vardı
olduğu gibi günde 8 kez okumak zorunda olduğu kutsal yazılar
MMS ve trambolin kullanımı.

İki hafta sonra bir spor salonunun tarifine uyan bir kadın
eğitmen dua toplantımıza girdi. Bunun AIDS'e yakalanmış bir
kadının gölgesi olduğunu doğrulamak için biraz ikna etmek
gerekti! Şaşırdık: DOĞRU!
MMS gerçek anlaşma! MMS'in işe yaradığını biliyordum ama bu değil
hızlı - ve çok kapsamlı. O gün atladı
1 1/2 saat boyunca trambolin! Bunu açıklarken
1. hafta son derece zorluydu, azimli ve
2. ayın başında çok daha iyi hissettim
hafta... ve saatte sadece 2 damlaydı! MMS bir
bağımsız bir güç merkezidir ve diğer protokollerin çalışmasını sağlar
inanılmaz derecede daha iyi! —Stephen, Trinidad/Tobago

eğer

Grip: Size hazırlayabileceğiniz bir anti-viral olduğunu söyleseydim
Mutfağınızda bir günde gripten korunmak için bana inanır
mısınız? Kızım dün sabah ağlayarak uyandı.
104 derecelik bir ateş ve titremeyle, deniz ve baş ağrısından
bahsetmiyorum bile. Zavallı kız. İyileşmeye başlama zamanıydı
onun için mod. Dün ikimiz de yaklaşık 5 doz MMS aldık. Yirmi
dört saat sonra ateşi yok ve ben asla
hastalandı.—HP, Arizona

Machine Translated by Google

13. Bölüm

Çocuklar İçin Protokol Dozlarının Ayarlanması

Ebeveynlere Bir Söz

Bu kitapta, her ebeveynin çocuklarının sağlığından tamamen sorumlu olduğunu varsayıyoruz. İdeal olarak, bir çocuğa MMS verecekseniz, MMS'i ilk önce kendiniz kullanacak kadar deneyime sahip olmalısınız. Bu kitabı bütünüyle okuyun ve daha fazla bilgi ve tanıklık için kitabın arkasındaki bağlantılardan bazılarına göz atın.

Ancak, çocuğunuzla ilgili acil bir durum varsa, MMS kullanmamış olsanız bile, isterseniz bu sayfalardaki bilgilere güvenmeniz ve bu yönergeleri izlemeniz yeterli olabilir.

Bu kitabı sizin için anlaşılır kılmak için son derece dikkatli bir şekilde yazdık, ancak herkesin verilerin kullanımı konusunda tam sorumluluk almasını bekliyoruz. Size MMS ile ilgili en son bilgileri sunmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu kitaptaki protokoller, dünya çapındaki binlerce MMS kullanıcısından alınan geri bildirimler sonucunda ince ayar yapılmıştır.

Çocuklara MMS protokolleri verilirken, yetişkinlerle aynı prensipler onlar için de geçerlidir. Örneğin, bir protokol bir yetişkin için saatlik dozları gerektiriyorsa, bir çocuk için de saatlik dozları gerektirir. Saatlik MMS almak önemlidir.

Machine Translated by Google

Ayrıca çocuğun midesi bulanırsa veya ishal olursa,
kadar dozu %50 (veya gerekirse daha fazla) azaltın.
sorun azalır ve daha sonra tekrar uygun seviyeye yükselir
çocuğun olduğu belirli protokol için belirtilen miktar
üzerinde.

Çocuklara göre değişen şey dozaj boyutudur.
Verdiğiniz damla sayısı veya kapsülün boyutu . bu
çocuğa vereceğiniz MMS1 ve MMS2 miktarı çocuğun ağırlığına göre
belirlenir. Aşağıda MMS1 miktarının nasıl belirleneceği ve

Çocukların çeşitli protokollerdeyken almaları için MMS2
bu kitap.

Çocuklar için Başlatma Prosedürü

Başlatma Prosedürü her zaman bir
çocuk Protokol 1000'e geçer. Daha fazla bilgi için
Bir düşüşün bir kısmının nasıl ölçüleceği de dahil olmak üzere Başlatma
Prosedürü, 80-81. sayfalara bakın ve ayrıntıları takip edin
orada verildi.

Çocuklar için Başlangıç Prosedürü MMS1 Dozaj Rehberi				
Saat Başına Damla Gün 1	Gün 2	Gün 3	Gün 4	
Bebekler daha az 7 libre (3,2 kg)	1/8 damla	1/8 damla	1/4 damla	1/2 damla
7-24 libre çocuklar (3,2-11 kg)	1/8 damla	1/4 damla	1/4 damla	1/2 damla
Çocuklar 25-49 lbs (11-23 kg)	1/4 damla	1/4 damla	1/2 damla	3/4 damla
50-74 libre çocuklar (23-34 kg)	1/4 damla	1/2 damla	1/2 damla	3/4 damla
75-100 libre çocuklar (34-45 kg)	1/4 damla	1/2 damla	1/2 damla	3/4 damla

Machine Translated by Google

Çocuklar için Protokol 1000

Protokol 1000, günde sekiz ardışık saat boyunca her saat başı bir doz MMS1 alıyor. Protokol 1000 için maksimum yetişkin dozu saatte 3 damla MMS1'dir; ancak lütfen unutmayın, bu protokol için 86. sayfada başlayan talimatlara göre 3 damla doza kadar çalışılmalıdır. Aynı ilke çocuklar için de geçerlidir.

Çocuklara MMS1 dozunun verilmesi için temel kural, çocuk 25 librenin (11 kg) üzerindeyken, her ek 25 libre için 1 damla MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) vermektir.
Ancak, dozajı belirlemek için çizelgeler sağladık. Lütfen bu çizelgeleri kullanın. Ve yine, MMS'in altın kuralını hatırlayın - bir çocuk (veya bu konuda herhangi biri) midesi bulandığında, ishal olduğunda veya hastalığın neden olduğu rahatsızlığın ötesinde bir rahatsızlık hissettiğinde, dozu %50 veya gerekirse daha fazla azaltın, Semptomlar azalıncaya kadar ve daha sonra çocuğun ağırlığı için uygun doza kadar çalışın. Genellikle bu bir ila üç gün içinde olur.

Protokol 1000'deyken, çocuğun kendi ağırlığına göre asla saatte bu damla miktarlarının ötesine geçmeyin.

Not: 1/4, 1/2 veya 3/4 damla dozun nasıl yapılacağı hakkında Başlangıç Prosedürüne bakın (sayfa 80-81). 1-1 / 2 damlalık bir doz yapmak için, 1/2 bardak (4 ons/120 ml) suya 2 damla MMS1 dozu yapın. 1 ons sıvıyı (veya 1/2 bardağın 1/4'ünü) dökün ve 1-1 / 2 damlaya eşit bir doz elde edeceksiniz.

Machine Translated by Google

Çocuklar için Protokol 1000 MMS1 Dozaj Rehberi	
Ağırlık	MMS1 Saat Başına Düşme
7 libreden (3,2 kg) daha hafif bebekler	Protokol 1000'in ilk gününde saatte 1/2 damla, daha sonra kalan 21 günlük protokol süresi için saatte 3/4 damlaya kadar çalışır. Başlangıç için saatte 1/2
Çocuklar 7-24 libre (3,2-10 kg)	damla ve kalan 21 günlük süre için saatte 1 damlaya kadar çalışın.
Çocuklar 25-49 lbs (11-22 kg)	Saatte 3/4 damla ile başlayın ve kalan 21 günlük süre için saatte 1-1 / 2 damlaya kadar çalışın.
Çocuklar 50-74 libre (22-33 kg)	Saatte 1 damla ile başlayın ve kalan 21 günlük süre için saatte 2 damlaya kadar çalışın.
75 lbs (34 kg) ve üzeri çocuklar	Saatte 1 damla ile başlayın ve kalan 21 günlük süre boyunca saatte 3 damlaya kadar çalışın.

Çocuklar için Protokol 1000 Plus

Çocuklar için Protokol 1000 Plus, DMSO eklenirken yetişkin dozuyla aynı orandır. Yani, bir çocuğa verdiğiniz her 1 damla MMS1 (aktif MMS) için 3 damla DMSO ekleyin. Dozu doğru şekilde karıştırdığınızdan ve DMSO'yu doğru zamanda eklediğinizden emin olmak için Protokol 1000 Plus, sayfa 87 bölümünü dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Çocuklar için Protokol 2000

Bir çocuk için Protokol 2000, bir yetişkin için Protokol 2000 ile aynı şekilde çalışır, ancak yine, bir çocuk için MMS1 ve MMS2 miktarı bir yetişkininkinden farklı olacaktır.

Lütfen Protokol 2000, sayfa 89 ile ilgili bölümü ve ayrıca sayfa 274'teki MMS2 Ayrıntıları bölümünü okuyun.

Machine Translated by Google

Protokol 2000'deyken, bir çocuğa , hastalığın neden olduğu hastalığa eklemeden tolere edebileceği kadar MMS1 verin (ancak aşağıdaki çizelgedeki maksimum miktarları aşmayın) . Bu, çocuğun çok dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini gerektirir. Herhangi bir mide bulantısı veya ishal belirtisi varsa (yine, hastalığın neden olduğu şeyin ötesinde) dozu azaltmaya hazır olun. MMS1 dozunu çocuğun tolere edebileceği seviyeye yükseltmek isteseniz de, bir durma noktası vardır. Çocuğa asla aşağıda listelenen ve çocuğun ağırlığına göre hesaplanan maksimum MMS1 miktarlarından fazlasını vermeyin.

Lütfen unutmayın, MMS1 için ağırlık ölçeği Protokol 1000'dekinden farklı hesaplanır, çünkü MMS1 miktarları Protokol 2000'deyken önemli ölçüde daha yüksektir.

Çocuklar için Protokol 2000 MMS1 için Maksimum Dozaj Rehberi Saat Başına	
Ağırlık Düşüşü 10 lbs veya daha az (4,5 kg) veya	daha fazla 10-20 lbs
(5-9 kg)	Saatte en fazla 3 damla alın.
	Saatte 5 damladan fazla almayın.
20-40 libre (9-18 kg)	Saatte 5 damladan fazla almayın.
40-60 libre (18-27 kg)	Saatte 6 damladan fazla almayın.
60-80 libre (27-36 kg)	Saatte 7 damladan fazla almayın.

Çocuklar için Protokol 2000—MMS2 Dozları

Protokol 2000, MMS1'i alırken MMS2'yi kapsül şeklinde almayı gerektirir. 75 librenin altındaki çocuklara MMS2 verilmesini önermiyorum. Çocuğun ağırlığı 75 lb'nin üzerindeyse ve yaşamı tehdit eden bir hastalığı varsa, özellikle MMS1 mevcut değilse, ona MMS2 vermeyi düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, çocuk kapsülleri nasıl alacağını bilmiyorsa ve onu hemen yutması güvenilir değilse, MMS2'yi çocuklar için kullanmayın .

Machine Translated by Google

ısırmayın, çiğnemeyin veya ağzınızda açmayın, çünkü bu hoş bir deneyim olmayacaktır.
Lütfen dikkatli kullanın.

Protokol 2000 ile ilgili bölümde, sayfa 89 ve MMS2—Ayrıntılar, sayfa 274 bölümündeki talimatları iyice okuyup incelemeden bir çocuğa MMS 2 (yalnızca 75 libre [34 kg] ve üzeri için) vermeyin. MMS2 kapsüllerinin nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar ve MMS2 ve DMSO hakkında uyarılar.

Çocuklar için Protokol 2000 MMS2 için Dozaj Rehberi	
Ağırlık	MMS2 Kapsülünün Boyutu
75 librenin (34 kg) altındaki çocuklar	75 lb'nin altındaki çocuklar için MMS2 kullanmayın.
75-100 lbs (34- 45 kg) ve üzeri çocuklar	İlk başta 1/8 oranında doldurulmuş bir #3 kapsül kullanın, ardından artışlarla 3/4 dolu kapsüle kadar çalışın.

Çocuklar için Protokol 3000

Bu, çocuklar için kullanılabilecek orijinal Protokol 3000'in bir uyarlamasıdır. Burada kullanılan MMS1 ve DMSO miktarları, yetişkinler için Protokol 3000'deki ile aynıdır. Ancak farklı olan karışımı çocuğun cildine uygulama yöntemidir. Aşağıdaki yöntem daha uygundur. Lütfen bu protokolü kullanmadan önce DMSO'yu ve nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenin. (DMSO'nun nasıl ele alınacağı hakkında daha fazla ayrıntı için Bölüm 4'e bakın.)

Machine Translated by Google

Çocuklar için Protokol 3000 Talimatları

Hazırlık

q Üç sprey şişesine ihtiyacınız olacak, tercihen 2 veya 4 ons/60 veya 120 ml'lik şişeler. Onları alabilirseniz, cam sprey şişeleri DMSO için en iyisidir. Cam yoksa, DMSO ile uyumlu plastik sprey şişeleri aldığınızdan emin olun. Şişenin altındaki üçgenin içinde #1 veya #2'yi arayın. Bu, PETE veya HDPE plastiktir. (DMSO için uygun uyumlu sprey şişesini bulamıyorsanız, DMSO'yu püskürtmek yerine DMSO'yu elinizle patlatmak en iyisi olacaktır .)

q Sprey şişelerinin tamamen temiz olduğundan emin olun.

q Her şişeyi , içindekilerin yanılmaması için net bir şekilde etiketleyin.

q Temiz, kuru şişeleri aşağıdaki gibi hazırlayın:

Şişe 1: Standart MMS1 sprey şişesi— ons su başına 10 damla MMS1 (bkz. sayfa 76).

Şişe #2: Şişeyi DMSO ile doldurun. Çocuğun hassas cildi varsa, saf suyla biraz seyreltmek isteyebilirsiniz. Ancak DMSO ne kadar güçlü olursa, kaşıntı veya yanma ile ilgili kesinlikle bir sorun olmadığı sürece o kadar iyidir.

Şişe #3: Temiz bir sprey şişesini arıtılmış suyla (şişelenmiş, damıtılmış veya ters ozmoz) doldurun. Açıkça su olarak işaretlendiğinden emin olun.

Machine Translated by Google

Cilde MMS1/DMSO Uygulaması

Bu protokolü kullanmadan önce, çocuğu herhangi bir olası DMSO alerjisi için test etmek en iyisidir (sayfa 59'daki alerji testine bakın). Herhangi bir alerji belirtisi yoksa, bu işleme başlamadan önce çocuktan, hissettiği anda acıdığını, soktuğunu veya yandığını söylemesini isteyin.

Aşama 1

Cildi Test Et

q Çocuğun kolunun çıplak bir kısmına, yaklaşık el büyüklüğündeki bir alana tek bir sprey #3 (su şişesi) püskürtün.

q Ardından şişe #1 (MMS1) ile tek bir sprey püskürtün aynı alanın hemen üstünde.

q Hemen aynı alanın üzerine 2 numaralı şişeyi (DMSO) tek bir sprey püskürtün.

q Ardından çıplak elinizi alın ve hafifçe ovun. Malzemeler dairesel bir hareketle.

q Herhangi bir batma, yanma veya kaşıntı olup olmayacağını görmek için yaklaşık beş dakika verin. Bunlardan herhangi biri varsa, bölgeye biraz daha su püskürtün ve hafifçe ovalayın.

q Test herhangi bir yanma, batma veya kaşıntıya neden olmazsa Adım 2'ye geçin.

q Herhangi bir yanma, batma veya kaşıntı devam ederse, test alanını iyice durulayın, DMSO sprey şişesine %20 kadar saf su ekleyin ve testi cildin yeni bir bölgesinde tekrarlayın.

Machine Translated by Google

q İkinci kez tahriş olursa, DMSO'yu daha fazla seyreltin. Cilt tahrişi kalmayana kadar bu işlemi tekrarlamaya devam edin.

Adım 2

MMS1 ve DMSO'yu uygulama

q Çocuğun kollarından birinin üst tarafına çok hafif bir su püskürtün. Bölgeyi nemlendirmek için elinizle suyu hafifçe yayın. Çok fazla su kullanmayın, ancak cildi nemlendirecek kadar su kullanın.

q Suyu uyguladıktan sonra, kolun üstündeki aynı alana MMS1 püskürtün ve ardından bunun üzerine DMSO püskürtün. Karışımı çıplak elle bölgeye nazikçe yayın. (Lastik veya lateks eldiven kullanmayın.)

q Püskürtme yaptığınız cilt çok kuru görünüyorsa, ilave bir MMS1 ve DMSO spreyi ekleyebilir ve tekrar nazikçe ovalayabilirsiniz.

q Karışımı yaydıktan sonra herhangi bir tahriş yoksa kol üzerinde kurumasını bekleyin. Yıkamadan önce birkaç saat ciltte bırakın.

Aşama 3

q Bir saat içinde aynı adımları diğer kol için de tekrarlayın.

4. Adım

q Her seferinde vücudun farklı bir bölgesini kaplayarak bu adımlarla saat başı devam edin. Bir bacağa, sonra diğer bacağa gidin ve sonra her şey yolundaysa, diğer bacağa gidin.

Machine Translated by Google

geri ve sonra mide. Nazik olun ve gerekirse ağrı, kaşıntı veya yanmayı önlemek için bol su kullanın.

Güvenlik önlemleri

Çocuğa kesinlikle bir zarar gelmediğinden emin olmak için, özellikle bu prosedürü çocuklar için kullanırken aşağıdakileri vurgulamak istiyorum:

- MMS1/DMSO karışımı cildi yakıyor veya tahriş ediyorsa, bu DMSO'nun çok güçlü olduğunu gösterir (çeşitli cilt tipleri, DMSO'nun farklı güçlerini kaldırabilir).

- DMSO şişeniz çok güçlüyse, yanma veya ağrı sorunu olmayana kadar saf veya saf su ile toplam %50'ye kadar su ile seyreltmeye devam edin.

- Tahriş olursa, çocuk artık acı olmadığını söyleyene kadar biraz daha su püskürtün.

- Yanma durumunda, DMSO'yu bol su ile durulayın (cildi durulamak için musluk suyu kullanmayın, bu durumda saf su en iyisidir). Bölgeyi çok iyi durulamadan sabun kullanmayın, çünkü DMSO cilde az miktarda sabun taşıyabilir.

- MMS1 ve DMSO'yu uyguladıktan sonra ellerinizi saf suyla iyice durulayın.

Çocuklar için Protokol 6 ve 6

Protokol 6 ve 6, bir saat arayla ayrı ayrı alınan iki 6 damlalık MMS1 dozundan oluşur. Bu protokol özellikle soğuk algınlığı, grip, ağrılar, alerjiler ve yeni başlamış gibi görünen diğer hastalıklar için etkilidir. Çok çeşitli şeyler için yararlıdır. Daha fazla ayrıntı için sayfa 169'a bakın ve

Machine Translated by Google

Protokol 6 ve 6 ile ilgili tüm talimatlar; bununla birlikte,
Aşağıdaki tabloya göre çocuklar için dozaj.

Çocuklar için Protokol 6 ve 6	
Ağırlık	MMS1 Saat Başına Düşürme
Bebekler 12 lbs (5.5 kg) ve daha az	1 ve 1 damla doz
Çocuklar 12-24 libre (5,5-11 kg)	2 ve 2 damla doz
Çocuklar 25-49 lbs (11-23 kg)	3 ve 3 damla doz
Çocuklar 50-74 lbs (23-34 kg)	4 ve 4 damla doz
Çocuklar 75-100 lbs (34-45 kg)	5 ve 5 damla doz
100-lbs ve üstü insanlar. (45 kg ve üzeri)	6 ve 6 damla doz

Bebekler için MMS1/DMSO Yama Protokolü, Hassas Ciltli Çocuklar ve İnsanlar

Lütfen standart MMS1/DMSO Yama Protokolü talimatlarını okuyun ve
iyice anlayın.
sayfa 135. Bu temelde aynı prosedürdür, ancak
MMS1 damla/su miktarları ve yamanın uygulanma zamanlaması bebekler,
çocuklar için ayarlanır.
ve hassas cilde sahip insanlar.

q 5 damla MMS1 (etkinleştirilmiş MMS) ile başlayın, 5 damla
damla DMSO ve ilave 10 damla su
çözeltiyi seyreltin.

q İlk uygulama için yamayı uygulamayın.
beş dakikadan fazla.

q Yama kaldırıldığında, varsa not alın.
tahriş. Beş dakika sonra tahriş olmazsa
ilk yama, iki saat içinde başka bir yama uygulayın. Bu
15 dakika boyunca açık bırakabilirsiniz.

Machine Translated by Google

q Sonraki 15 dakikalık uygulamada herhangi bir cilt tahrişi veya yanması yoksa bu uygulamalara devam edilmesinde bir sakınca yoktur.

q Herhangi bir zamanda ciltte tahriş veya yanma olursa, son uygulamada kullanılanın üzerine ilave su miktarını iki katına çıkarın.

Çocuklar İçin Günlük MMS1 Bakım Dozu

Çocuklar, kural olarak, gün boyunca çok çeşitli toksinlere maruz kalırlar; yerde veya toprakta oynarlar, kirli ellerini ağızlarına sokarlar, vb. Bu, çocuğunuz için günlük bir MMS1 idame dozunun önemli olmasının birçok nedeninden biridir. MMS1 Bakım Dozu (yetişkinler ve çocuklar için) ile ilgili tüm ayrıntılar için lütfen sayfa 200-201'e bakın.

Sık Hastalığı Olmayan Çocuk: Oğlum (4 yaşında) astım ve diğer kronik bronşiyal problemlerden muzdaripti ve iki yıldan fazla bir süredir ortalama iki haftada bir hastalanıyor. MMS'i keşfettiğinden beri, yalnızca solunum problemlerinden arınmış olmakla kalmıyor, aynı zamanda başka şeyler "etrafta dolaşırken" de günlük MMS1 ana kullanım dozu sayesinde sağlıklı kalıyor. –Veronica, Meksika

Destekleyici Protokoller Nasıl Ayarlanır ve Çocuklar için Ek Protokoller

Aşağıdaki çizelgeler, çocuklar için diğer tüm Proto col'ların nasıl ayarlanacağını açıklar.

Machine Translated by Google

Bebekler 12 lbs (5,5 kg) ve Daha Az	
Protokol	Dozaj
Çanta Tedavisi	Kullanmayın.
Banyolar ve Ayak Banyoları	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 143.
kara dul ısırığı	Yetişkinlerle aynı — sayfa 217.
Brown Recluse Spider Bite	Yetişkinlerle aynı —sayfa 213.
yanıklar	Yetişkinlerle aynı —sayfa 245.
Lavman	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 148.
Gözler/Kulaklar/Burun	Ons başına 1/8 damla MMS1 kullanın gözler için damıtılmış su; ve Damıtılmış ons başına 1/4 damla kulaklar ve burun için su - sayfa 136.
Gıda zehirlenmesi	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz — sayfa 223.
Küf/Mantar	1/8 çay kaşığı kil dozu kullanın/ayarlayın MMS1'den ağırlığa—sayfa 99.
Kalp krizi	1/8 damla ve 1/8 damla kullanın DMSO bir yetişkin kullanırdı. Ayrıca 6 ve 6'yı yap ama çocuklar için aslında bu ağırlığın 1 ve 1—sayfa 236.
Hint otu	Kullanmayın.
Ağız ve Dişler	Her ons için 1 damla MMS1 kullanın. su —sayfa 73.
Protokol 4000	Bebekler için kullanmayınız.
Sprey şişesi	Her ons için 3 damla MMS1 kullanın su —sayfa 76.
vuruşlar	1/8 miktarda DMSO kullanın ve 6 ve 6 (ancak bebekler için bkz. yukarıdaki dozaj, aslında 1 ve 1) olun ve hepsini takip edin 227. sayfadaki talimatlar.

Machine Translated by Google

12-24 lbs (5,5-11 kg) çocuklar	
Protokol	Dozaj
Çanta Tedavisi	Kullanmayın.
Banyolar ve Ayak Banyoları	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 143.
kara dul ısırığı	Yetişkinlerle aynı — sayfa 217.
Brown Recluse Spider Bite	Yetişkinlerle aynı —sayfa 213.
yanıklar	Yetişkinlerle aynı —sayfa 245.
Lavman	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 148.
Gözler/Kulaklar/Burun	Ons başına 1/8 damla MMS1 kullanın gözler için distile su ve 1/2 ons başına düşen MMS1 kulaklar ve burun için damıtılmış su —sayfa 136.
Gıda zehirlenmesi	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz — sayfa 223.
Küf/Mantar	1/4 çay kaşığı kil dozu kullanın/ayarlayın MMS1'den ağırlığa—sayfa 99.
Kalp krizi	1/8 damla ve 1/8 damla kullanın DMSO bir yetişkin kullanırdı. De yap 6 ve 6 ama bunun çocukları için aslında 2 ve 2 olan ağırlık —sayfa 236.
Hint otu	Kullanmayın.
Ağız ve Dişler	Her ons için 1 damla MMS1 kullanın. su —sayfa 73.
Protokol 4000	Bunun bir çocuğu için kullanmayın ağırlık.
Sprey şişesi	Her ons için 3 damla MMS1 kullanın su —sayfa 76.
vuruşlar	1/8 damla ve 1/8 damla kullanın DMSO bir yetişkin kullanırdı. De yap Protokol 6 ve 6, ancak çocuklar için bu ağırlığın 2 ve 2 olur —sayfa 227.

Machine Translated by Google

Çocuklar 25-49 lbs (11-23 kg)	
Protokol	Dozaj
Çanta Tedavisi	Kullanmayın.
Banyolar ve Ayak Banyoları	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 143.
kara dul ısırığı	Yetişkinlerle aynı — sayfa 217.
Brown Recluse Spider Bite	Yetişkinlerle aynı —sayfa 213.
yanıklar	Yetişkinlerle aynı —sayfa 245.
Lavman	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 148.
Gözler/Kulaklar/Burun	Her birinde 1/4 damla MMS1 kullanın gözler için su ons ve 1/2 ons su başına MMS1 damlası kulaklar ve burun için —sayfa 136.
Gıda zehirlenmesi	1/4 adet yetişkin damlası kullanın doz — sayfa 223.
Küf/Mantar	1/2 çay kaşığı kil dozu kullanın/ayarlayın MMS1'den ağırlığa—sayfa 99.
Kalp krizi	1/4 damla ve 1/4 Bir yetişkinin kullanacağı DMSO. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ancak bu kilonun çocukları aslında 3 ve 3 —sayfa 236.
Hint otu	Kullanmayın.
Ağız ve Dişler	Her ons için 1 damla MMS1 kullanın. su —sayfa 73.
Protokol 4000	Bunun bir çocuğu için kullanmayın ağırlık.
Sprey şişesi	Her ons için 5 damla MMS1 kullanın su —sayfa 76.
vuruşlar	Damlaların 1/4'ünü ve 1/4'ünü kullanın. bir yetişkinin yapacağı DMSO kullanmak. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ancak bu boyuttaki çocuklar için aslında 3 ve 3 —sayfa 227.

Machine Translated by Google

Çocuklar 50-74 libre (23-34 kg)	
Protokol	Dozaj
Çanta Tedavisi	1/2 damla sayısını kullanın ve yetişkin kullanırdı —sayfa 156.
Banyolar ve Ayak Banyoları	1/2 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 143.
kara dul ısırığı	Yetişkinlerle aynı — sayfa 217.
Brown Recluse Spider Bite	Yetişkinlerle aynı —sayfa 213.
yanıklar	Yetişkinlerle aynı —sayfa 245.
Lavman	1/2 adet yetişkin damlası kullanın doz —sayfa 148.
Gözler/Kulaklar/Burun	Her birinde 1/4 damla MMS1 kullanın gözler için su ons ve 1/2 ons su başına MMS1 damlası kulaklar ve burun için —sayfa 136.
Gıda zehirlenmesi	3/4 adet yetişkin damlası kullanın doz — sayfa 223.
Küf/Mantar	3/4 çay kaşığı kil dozu kullanın/ayarlayın MMS1'den ağırlığa—sayfa 99.
Kalp krizi	1/2 damla ve 1/2 damla kullanın Bir yetişkinin kullanacağı DMSO. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ancak bu kilonun çocukları aslında 4 ve 4, bkz. sayfa 236.
Hint otu	gelen talimatları izleyin Hint Bitkisi ile—sayfa 165.
Ağız ve Dişler	Her ons için 2 damla MMS1 kullanın su —sayfa 73.
Protokol 4000	Bunun bir çocuğu için kullanmayın ağırlık.
Sprey şişesi	Ons başına 10 damla MMS1 kullanın su —sayfa 76.
vuruşlar	1/2 damla ve 1/2 damla kullanın Bir yetişkinin kullanacağı DMSO. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ancak bu kilonun çocukları aslında 4 ve 4 —sayfa 227.

Machine Translated by Google

75-100 lbs (34-45 kg) ve Üzeri Çocuklar	
Protokol	Dozaj
Çanta Tedavisi	1/2 damla sayısını kullanın ve yetişkin kullanırdı —sayfa 156.
Banyolar ve Ayak Banyoları	Aynı sayıda damla kullanın bir yetişkin kullanırdı —sayfa 143.
kara dul ısırığı	Yetişkinlerle aynı — sayfa 217.
Brown Recluse Spider Bite	Yetişkinlerle aynı —sayfa 213.
yanıklar	Yetişkinlerle aynı —sayfa 245.
Lavman	Aynı sayıda damla kullanın ve yetişkin kullanırdı —sayfa 148.
Gözler/Kulaklar/Burun	Ons başına 1/4 damla MMS1 kullanın gözler için su ve 1 damla Kulaklar için su ons başına MMS1 ve burun —sayfa 136.
Gıda zehirlenmesi	Yetişkinlerle aynı — sayfa 223.
Küf/Mantar	1 çay kaşığı kil dozu kullanın/MMS1'i ayarlayın ağırlığa—sayfa 99.
Kalp krizi	MMS1 ve DMSO'yu aynı şekilde kullanın yetişkinler. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ama bu ağırlıktaki çocuklar için aslında 5 ve 5 —sayfa 236.
Hint otu	gelen talimatları izleyin Hint Bitkisi ile—sayfa 165.
Ağız ve Dişler	Ons başına 2,5 damla MMS1 kullanın su — sayfa 73.
Protokol 4000	1/4'e kadar doldurulmuş 4 boyutlu bir kapsül kullanın ilk başta ve sonra 3/4'e kadar çalışın iki gün içinde tam kapsül ve bundan sonra—sayfa 171.
Sprey şişesi	Ons başına 10 damla MMS1 kullanın su —sayfa 76.
vuruşlar	ile aynı MMS1 ve DMSO'yu kullanın. yetişkinler. Ayrıca Protokol 6 ve 6'yı da yapın, ama bu ağırlıktaki çocuklar için aslında 5 ve 5 —sayfa 227.

Machine Translated by Google

Anal Fistül: Kardeşimi kurtardığını söylemek için yazıyorum. Bu yıl Mayıs ayında kardeşim dördüncü kez anal fistül geçirdi. 2001'den beri anal fistül hastası. Bu yıl Mayıs'ta dördüncü kez oldu ve çok hastaydı, yürüyemiyordu, bacakları ağrıyordu, ayakları ağrıyordu ve gerçekten endişeliydi, hiç bu kadar kötü hissetmediğini söyledi. tüm hayatında. Onu protokol 1000 ile tedavi etmeye başladım, yani her saat başı 3 aktif MMS damlası ve her kuruduğunda etkilenen bölgeye sürekli olarak püskürtmek için 40 aktif MMS damlası içeren bir sprey şişesi hazırladım. Bir gün MMS aldıktan sonra bacakları ve ayakları daha iyi hissetmeye başladı ve dik durabilir ve yavaşça yürüyebildi. Üçüncü gün hiç acı hissetmedi ve hepimiz bundan memnunduk. Dördüncü gün karısıyla alışverişe gitti. O gerçekten iyiydi. Beşinci gün işe geri döndü, kendini her zamankinden daha güçlü, enerji dolu hissettiğini söyledi. Tıpkı benim gibi şimdi bakım için her gün 6 damla aktif MMS damlası alıyor. Şimdi bana daha önce yapamadığı şeyleri yaptığını çünkü hareket ederken veya etraftaki nesneleri kaldırırken sırtının ağrıdığını söyledi. Şimdi o sağlıklı bir insan. —Vincent, İtalya

eğer

Diyabet: Şeker hastası arkadaşımı getirdim ve kan şekeri 500'e yakın olduğu için her saat başı 5-6 saat tedavi ettim. O kısa saatlerde kan şekeri 91'e düştü. HAKİKAT! —CP Amerika Birleşik Devletleri

Machine Translated by Google

14. Bölüm

Ek Önemli Bilgi

biyofilmler

Biyofilm, ıslak yüzeylerde oluşan ve bunları kaplayan ince, dirençli bir mikroorganizma tabakasıdır. Mikro koloniler oluşturmak için bir araya toplanmış iyi organize edilmiş bakteri kolonileridir. Biyofilmler tek bir bakteri türü tarafından oluşturulabilir, ancak biyofilmler çoğunlukla birçok bakteri türünün yanı sıra mantar, alg, protozoa, döküntü ve korozyon ürünlerinden oluşur. Esasen, bakterilere ve bir miktar suya maruz kalan herhangi bir yüzeyde bir biyofilm oluşabilir.
Endüstride su boruları, su depoları ve soğutma kuleleri gibi birçok yerde biyofilmler oluşur. Biyofilmler ayrıca insan vücudunun içinde veya üzerinde oluşabilir ve bu nedenle birçok hastalıktan sorumludur.

Bu bakteri kolonileri bir araya geldiğinde, onları film benzeri bir karışım halinde bir araya getiren özel bir mukus salgılarlar. Bu olduğunda, diğer patojenler içlerinde ve altlarında saklanabilir. Biyofilmler vücutta iyileşmeyi daha zor veya çoğu zaman imkansız hale getirebilir.
Antibiyotiklere karşı oldukça dirençlidirler. Tıbbi ilaçların, eğer varsa, onlar üzerinde çok az etkisi var gibi görünüyor. Ancak MMS, vücudun hem içinde hem de dışında biyofilmin üstesinden gelebilir.

MMS alıyorsanız ve gelişiyorsanız, ancak çok yavaş bir oranda, bu, MMS'iniz olduğuna dair bir gösterge olabilir.

Machine Translated by Google

sisteminizde bir yerde biyofilm. Cevap, kendinizi iyi hissedene kadar protokole devam etmektir.
Bu, biyofilm tamamen öldürülmeden önce birkaç günden birkaç haftaya ve bazı durumlarda birkaç aya kadar olabilir. Kendinizi iyi hissedene kadar devam edin.

MMS'i sorunsuz bir şekilde alıyorsanız ve aniden aynı dozda önemli bir Herxiemer reaksiyonu yaşarsanız, muhtemelen bir biyofilmden kurtulmuşsunuzdur. Patojenlerin yok olması sizi büyük bir patlamayla vurur ve bu da Herxheimer reaksiyonuna neden olur. İyi haber şu ki, o zaman size sorun çıkaran toksinlerden kurtulabilirsiniz ve vücudunuz iyileşebilir.

Vücudun dışındaki biyofilmler normalde yalnızca sürekli nemin olduğu yaralarda veya yaralarda meydana gelir.
Yarada veya yarada bulunduklarında genellikle iyileşmenin çok daha uzun sürmesine veya iyileşmenin tamamen engellenmesine neden olurlar. Bunun için 76. sayfada belirtildiği gibi MMS1 sprey şişesini kullanmanızı öneririm. Biyofilmin 30 ml su başına 10 damla MMS1 içeren normal mukavemetli sprey şişesine dirençli göründüğü durumlarda, diğer bir deyişle, yara veya yara iyileşmiyor, sprey şişesindeki damla miktarını artırmanızı öneririm. Önce şişeye 1 ons (30 ml) suya 20 damla MMS1 koymayı deneyin. Ons başına 20 damla ile hala iyi sonuçlar görmüyorsanız, sprey şişesindeki damlaları kademeli olarak artırın. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, ons (30 ml) su başına 50 MMS1 damlaya kadar gidebilirsiniz.

MMS2—Ayrıntılar

MMS2, kalsiyum hipoklorit, bazen Havuz Şoku olarak bilinir. Dünya çapında havuz mağazalarında ve marketlerde satılmaktadır. Yüzme havuzları olduğu sürece, üreticiler havuzlara yüzücülere zarar verecek kötü şeyler koyamazlar ve bu nedenle zararlı şeyler koyamazlar.

Machine Translated by Google

kalsiyum hipoklorit içinde. Paket, %45 ila %85 arasında mevcut klor içerdiğini söyleyecektir.

Bu doğru değil. Kalsiyum hipoklo ritiniz olduğu sürece (klor üreten sodyum hipoklorit değil) mevcut klor yoktur. Kalsiyum hipoklorit suda çözündüğünde hipokloröz aside (HOCl) dönüşür ve mevcut klor yoktur.

HOCl, vücudunuzun doğal olarak hastalıkları öldürmek ve zehirleri yok etmek için ürettiği asitle aynıdır. MMS2 aldığınızda, vücudunuza hastalıklara karşı kendi mühimmatından daha fazlasını vermiş olursunuz. Bir yüzme havuzundaki mikroorganizmalar, HOCl'ye dönüşen kalsiyum hipoklorit tarafından öldürülür. Üreticiler, yalnızca kalsiyum hipokloriti satmak için "mevcut klor" olduğunu söylüyorlar, çünkü dünyadaki birçok kişi maalesef hala klorun mikroorganizmaları öldürmek için güvenli ve etkili bir ürün olduğunu düşünüyor - ve bu terimleri karıştırmak yaygın bir hatadır. Sodyum hipoklorit olan klor mikroorganizmaları öldürür, ancak insan vücuduna da zararlıdır. Suya eklendiğinde hipokloröz asit üreten kalsiyum hipoklorit, mikroorganizmaları da öldürür, ancak insan vücuduna zararlı değildir ve “klor” kimyasalını içermez.

Talimatlar

Aşama 1

qq MMS tedarikçilerinden kalsiyum hipoklorit satın alın: http:// waterpurificationsuppliers.is/ — Ayrıca havuz mağazalarında, marketlerde ve bazen de büyük mağazalardan temin edilebilir.

Adım 2

q 1 veya 0 boyutunda boş jel veya sebze kapsülleri satın alın. Bunları bulamazsanız, normal bir satın alın.